

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 05

Datum: 20. marec 2020

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk je zaporedje zadnjih toplih dni močno pospešilo razvoj. Jablana hiti v stadij rožnatih popkov (57 po lestvici BBCH), med tem, ko so hruške po razvoju še zgodnejše (rana sorta 'Carmen' je na stopnji balona).

Za naslednja zaščitna tretiranja svetujemo preventivne dotikalne fungicide: **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira), **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira) ali **DELAN PRO** (2,5 l/ha).

Hkrati je z razvojem cvetnih nastavkov potrebno poskrbeti tudi za varstvo pred **listnimi ušmi**. Pripravek **NEEMAZAL T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje; tudi za ekološko pridelavo) zatira poleg slednjih še nekatere druge vrste sesajočih in grizočih vrst žuželk. Primeren je zlasti v nasadih dovzetnih na napade **gosenic pedicev** in na površinah, ki jih prizadene **listni miner**. Za uspešno delovanje ga je potrebno nanesti prvič v obdobju pred cvetenjem in drugič po zaključenem cvetenju. Pri hruški ne pride v poštev, saj povzroča ožige! Proti **mokasti jablanovi uši** je potrebno ukrepati pravočasno in napadene predele zaščititi preden se populacije okrepijo. Priporočamo **TEPPEKI** (0,14 kg/ha) ali v mladih nasadih jablane **SIVANTO PRIME** (0,4 l/ha – oz. 0,2 l/ha na meter višine krošnje; le enkrat v rastni dobi; predviden tudi proti **jablanovi travni uši**). Teh dveh sistemskih pripravkov se v času cvetenja ne uporablja, kajti predstavljata nevarnost za čebele!

Na predelih nasadov, kjer je v preteklosti prihajalo do prerazmnožitev **rdeče sadne pršice** bodite pozorni na izleganje ličink in sledite njihovo gostoto.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

