

Obvestilo za POLJEDELSTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravila: Karmen Rodič, e-pošta: karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 7

Datum: 06. maj 2019

OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI

Fenološki razvoj posevkov koruze

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je setev koruze že izvedena. Pred izbiro pripravka za zatiranje herbicidov preglejte posevke, ocenite zapleveljenost in razvojno fazo rastlin. Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Kot prvi ukrep priporočamo uporabo česal, kasneje pa lahko za korekcijo uporabite herbicide. Najbolj optimalen čas za uporabo herbicidov je, ko ima korusa dva do štiri liste (BBCH 12 – 14). Zaradi antirezistenčne strategije je priporočljivo s herbicidi "kolobariti", kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi.

Uporaba herbicidov

V razvojni fazi od vznika do dveh listov so registrirani naslednji pripravki: **ADENGO** (0,44 L/ha), **CALLARIS PRO** (2 – 2,3 L/ha), **CALLISTO 480 SC** (0,15-0,3 L/ha), **DUAL GOLD 960 EC** * (1-1,5 L/ha, do 1 lista), **EFICA 960 EC** (1 – 1,5 L/ha), **LUMAX** (0,25-4 L/ha), **LUMAX H 537.5 SE** (), **MERLIN FLEXX** (0,4 L/ha), **PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC** * (2,5 4,5 L/ha, do 1 lista), **SHARPEN 40 SC** (2,5-4 L/ha, do 1 lista), **SHARPEN 33 EC** (3-5 L/ha, do 1 lista), **STOMP AQUA** (3,3 L/ha), **SUCCESSOR 600** * (2 L/ha).

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: **AKRIS** * (3 L/ha, do 6 listov), **ALISEO PLUS** * (70 g/ha, do 6 lista), **ARIGO** * (330 g/ha, do 8 listov), **ARRAT** * (0,2 kg/ha, do 6 lista), **BASAGRAN** * (1,5-2 L/ha, do 7 lista), **BASAGRAN 480** * (1,5-2 L/ha, do 7 lista), **BANDERA** * (1 L/ha, do 8 listov), **BANVEL 480 S** (0,6 L/ha, od 3-6 listov), **CALLAM** (300 g/ha), **CAMBIO** * (2-3 L/ha, do 7 lista), **CAPRENO** (0,3 L/ha, do 6 listov), **CLIOPHAR 600 SL** (0,16-0,2 L/ha, do 6 listov), **ELUMIS** *(1,5 L/ha, do 8 listov), **ENTAIL** * (170 ml/ha, od 3 do 5 listov), **ESTERON** (1 L/ha, od 4 do 5 listov), **EQUIP** (2-2,5 L/ha, do 6 listov), **FOCUS ULTRA** (1-4 L/ha, do 8 listov), **DICASH** * (0,6 L/ha, do 8 listov), **HARMONY 50 SC** (22,5 g/ha, do 8 listov), **KALIMBA** (0,6 L/ha, do 8 listov), **KAMBA 480 SL** (0,6 L/ha), **KELVIN MAX** (0,75 L/ha), **KELVIN** * (1 L/ha, od 3 listov naprej), **KELVIN OD** * (1 L/ha, od 4 do 7 listov), **LAUDIS** (1,15-2,25 L/ha, do 8 listov), **LAUDIS WG 30** (0,25-0,5 kg/ha, do 8 listov), **LONTREL 100** * (1-1,2 L/ha, do 5 lista), **LONTREL 72SG** (0,17 kg/ha), **MILAGRO EXTRA 6 OD** * (0,75 L/ha, do 8 listov), **MILAGRO 240 SC** * (170 ml/ha, od 3 do 6 listov), **MOTIVELL** * (1 L/ha, od 3 do 7 lista), **MONSOON ACTIVE** (1-2 L/ha, do 6 listov), **MURAL** (0,6 – 0,75 L/ha), **MUSTANG 306 SE** (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov), **NICOSH** * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), **NAGANO** (0,5 – 1,0 L/ha), **NIKITA** (0,45 kg/ha), **OSORNO** (1,5 L/ha, do 8 listov), **PEAK 75 WG** (20-30 g/ha, do 7 lista), **PRIMERO** * (1 L/ha, do 8 listov), **SAMSON 4 SC** * (1 L/ha, do 8 listov), **SAMSON EXTRA 6 OD** * (0,75 L/ha, do 8 listov), **SPANDIS** (0,4 kg/ha), **STARANE FORTE** (0,54 L/ha, od 2 do 6 listov), **TALISMAN** (1,125 L/ha), **TAROT 25 WG** * (50-60 g/ha, do 8 listov), **TEMSA** (1,5 L/ha, do 8 listov) ali **TANDUS 200 EC** (1 L/ha, od 3 do 6 listov).

Natančen opis pripravkov si lahko pogledate na: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin> , (herbicidi v koruzi 2019).

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmaceutskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V SOJI



MKGP-UHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto

Posevki soje imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom, zato je strategijo uporabe herbicidov potrebno ustrezno prilagoditi. Najbolje se obnese kombinacija talnih herbicidov uporabljenih po setvi pred vznikom in kasneje korekcija z enim od primernih pripravkov (preglednica spodaj).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2019 v soji po setvi in pred vznikom.

PRIPRAVEK	ODMEREK (L/ha)	PLEVELI
DUAL GOLD 960 EC *	1,0 – 1,3 L/ha	enoletni širokolistni in ozkolistni
EFICA 960 EC *	1,0 – 1,3 L/ha	enoletni širokolistni in ozkolistni
SHARPEN 33 EC, SHARPEN 40 SC	3 – 5 L/ha	enoletni širokolistni in ozkolistni
STOMP AQUA	2,6 L/ha	enoletni širokolistni in ozkolistni
CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS, DR. METROB KLOMAZON (manjše uporabe)	0,25 L/ha	enoletni širokolistni

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2019 v soji po vzniku.

PRIPRAVEK	ODMEREK (L/ha)	PLEVELI
BASAGRAN *, BASAGRAN 480 *	1,5 – 2 L/ha	širokolistni
FOCUS ULTRA	1,5 – 2 L/ha	ozkolistni
FUSILADE FORTE	0,8 – 2 L/ha	enoletni in večletni ozkolistni
HARMONY 50 SX	2 x 7,5 g/ha	enoletni širokolistni

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNIH BUČAH

Plevele v *oljnih bučah* se zaradi slabe tekmovalne sposobnosti vzniklih rastlin zatira takoj po setvi. V ta namen lahko uporabite naslednje herbicide: **CENTIUM 36 CS** (0,25 L/ha), **COMMAND 36 CS** (0,25 L/ha), **DR. METROB KLOMAZON** (0,25 L/ha) ali **SUCCESSOR 600 *** (2 L/ha). Po vzniku oljnih buč pride v poštev samo pripravek **FUSILADE FORTE** (za manjše uporabe 0,8 – 1,7 L/ha).

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

