

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 17.

Datum: 06. avgust 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta pričenja z zorenjem; jagode začenjajo s sortno značilnim barvanjem (79 – 81 po lestvici BBCH). Posameznim ranim sortam se jagode tudi že mehčajo.

S prehodom v zorenje in s tem zaključna tretiranja vinogradov pred *peronospora vinske trte* svetujemo dotikalno delujoče pripravke na osnovi aktivnih snovi folpet, mankozeb ali baker: FOLLOW 80 WG (1,25 kg/ha; do mehčanja jagod), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), SOLOFOL (1,6 kg/ha; do 79 po BBCH), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; do mehčanja jagod), DITHANE M-45 (2 kg/ha; do mehčanja jagod), AVTAR 75 NT (2 kg/ha; do mehčanja jagod), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; do 79 po BBCH), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; do 79 po BBCH), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha; do mehčanja jagod), BADGE WG (2,5 kg/ha, do obarvanja jagod), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha; do začetka zorenja), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; do začetka zorenja).

Za varstvo pred *oidijem vinske trte* pridejo v poštev: **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; do začetka barvanja), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha; do začetka zorenja), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha; do začetka zorenja), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; do začetka zorenja), **SERCADIS** (0,15 l/ha; do začetka barvanja), **TALENDO** (0,25 l/ha), **PROSPER CS 300** (1 l/ha; do mehčanja jagod), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha; do mehčanja jagod), **CUSTODIA** (0,525 l/ha; do začetka zorenja), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha; do začetka zorenja), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha; do začetka zorenja), **DYNALI** (0,65 l/ha; do 87 po BBCH),... Uporabite lahko še **PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA**. Sredstva **VITISAN** (9 kg/ha), **SONATA** (5 l/ha) in **AQ-10** (35 g/ha) so možna za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri odstiranju listov iz okolice grozdja pazite, da ga opravljate postopno in ne povzročite *sončnih ožigov*.

V primeru *neurja s točo*, prednostno zaščitite trse s pripravki v kombinaciji z bakrom ali na osnovi aktivne snovi folpet.

Razmiki med tretiranjem naj bodo do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

