

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 27

Datum: 04. november 2020

VARSTVO KOŠČIČARJEV

V nasadih breskev in nektarin priporočamo jesensko varstvo pred *breskovo kodravostjo*. Primeren termin za nanos pripravkov na osnovi bakra je v času odpadanja listja. S tem tretiranjem boste hkrati poskrbeli še za zaščito lesa pred *drugimi glivičnimi* in *bakterijskim obolenji*. Izbirate lahko med: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičarjev (*breskev, marelica, češnja, sliva*), kot so *listne luknjičavosti, monilinijska obolenja, listne pegavosti* in *ožigi*, lahko opravite tudi s **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha; le za marelico, češnjo, višnjo in slivo) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Za nanos je priporočljivo uporabiti večjo količino vode.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da z zaključevanjem rastnega obdobja v nasadih ob odpadanju listja poskrbite za preventivno varstvo ran, ki nastanejo zaradi defoliacije ali drugih poškodb na skorji.

Za zmanjšanje možnosti okužb lesa z *glivičnimi* (*jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,...*) in *bakterijskimi obolenji* (*hrušev ožig*) svetujemo ob začetku odpadanja listja nanos bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial *jablanovega* in *hruševega šklupa*. Izbirate lahko med pripravki: **CUPRABLAU Z 35 WG** (za zatiranje *jablanovega šklupa* 3 kg/ha, oz. *gnilobe koreninskega vratu*: tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15 – 35 g na 100 l vode, ob porabi 0,1 do 0,15 l vode na drevo), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; proti *jablanovemu šklupu*) ali **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; le proti *jablanovemu raku*).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.

