



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90
e-mail: domen.bajec@gov.si

Številka obvestila: 37.
Datum: 13. avgust 2013

OBVESTILO ZA SADJARJE

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK

Za varstvo pred glivičnimi obolenji načrtujte uporabo pripravkov, ki imajo poleg učinkovanja na *jablanov škrlup* tudi delovanje na *skladiščne bolezni*: **BELLIS** (7 dni karence; smiselna 2× zaporedna uporaba), **ZATO PLUS** (35 dni karence; le za jablano), **ZATO 50 WG** ali **FLINT** (oba 21 dni; le za jablano), **MERPAN 80 WDG**, **MERPAN 50 WP** (oba 21 dni karence), **ORTHOCIDE 80 WG** (28 dni karence), **THIRAM 80 WG** (35 dni),...

Dodate lahko enega od pripravkov na osnovi žvepla: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **PEPELIN**, **VINDEX 80 WG** (vsi 7 dni karence) ali **MOČLJIVO ŽVEPLO** (14 dni karence), ki delujejo omejujoče tako na *jablanovo pepelovko* kot pršice.

Prerazmnožitve *navadne* in *rdeče sadne pršice* nadzorujte s sredstvi: **MASAI** (7 dni), **MILBECKNOCK** (14 dni), **VERTIMEC 1,8% EC** (28 dni),...

Ob zmernejših temperaturah ozračja, bo v zadnji tretjini avgusta in prvih dneh septembra pričakovati večjo izpostavljenost pridelka na napade *jabolčnega* in *breskovega zavijača*. Na poznih sortah je za zaščito pridelka pred *zavijači* smiselno predvidovati uporabo pripravkov s kratko, oz. brez karence: **AFFIRM** (7 karence; le jablana) ali **CORAGEN** (14 dni karence; jablana in hruška), **MADEX** ali **LEPINOX PLUS** (oba brez karence).

Za kvalitetnejše razporejanje zaščitnega sredstva priporočamo dodatek močil kot so: **BREAK THRU S 240**, **SILWET L-77** ali **ETALFIX-PRO**.

Pozorni bodite na karencu uporabljenih sredstev!

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Po močnejših pozno pomladanskih okužbah z *listno luknjičavostjo koščičarjev*, sedaj (po spravi pridelka) intenzivnim pridelovalcem priporočamo izvedbo zaščitnega tretiranja s pripravkom **MERPAN 80 WDG** ali **MERPAN 50 WP**. Aplikacijo opravite v obdobju dneva z najnižjo temperaturo ali počakajte na ustrezne pogoje. Prezgodnja defoliacija v trenutnih vremenskih razmerah lahko vodi v porušenje fenološkega ravnovesja dreves.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

Trenutne vremenske razmere ne nakazujejo potrebe po kemičnem varstvu pred *peronospora vinske trte*.

Na legah, kjer so okužbe z *oidijem vinske trte* še vedno aktualne, lahko uporabite pripravke **VITISAN – KALIJEV HIDROGEN KARBONAT** (8-10 kg/ha; do mehčanja jagod) ali sredstva na osnovi žvepla (vsi imajo 28 dni karence), kot je npr.: **COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, PEPELIN, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MOČLJIVO ŽVEPLO**, oz. izvedete prašenje z žveplom v prahu.

V ekoloških vinogradih svetujemo proti *oidiju vinske trte* pripravke: **VITISAN – KALIJEV HIDROGEN KARBONAT** (v poštev pride tudi proti *sivi plesni*), **KOMARČKOV EKSTRAKT** in **AQ – 10**.

VINOGRADI V PRIMERU NEURJA S TOČO

Okoljske razmere z visokimi temperaturami omogočajo hitro sušenje in celjenje ran, zato je potrebno pri odločanju o izvedbi tretiranja upoštevati stopnjo poškodb, nadaljnjo vremensko prognozo in razvoj trte. Če se odločite za tretiranje, počakajte da se listje osuši, nato lahko opravite zaščito z enim od pripravkov na osnovi a.s. folpet ali baker. V času mehčanja grozdnih jagod bodite pozorni na karencu uporabljenih sredstev. S prehodom v stopnjo zorenja, se povečuje dovzetnost na okužbe s *sivo plesnijo*. V primeru poškodovanih jagod, je v predelu grozdja smiselno uporabiti pripravke z botriticidnim delovanjem kot so: **TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, MYTHOS, ROVRAL AQUAFLO** (vsi 21 dni karence), **CANTUS** (28 dni), **PYRUS 400 SC** (35 dni) ali **BOTECTOR** (karenca zagotovljena s časom uporabe; deluje na osnovi *Aureobasidium pullulans*). Za kvalitetnejše razporejanje zaščitnega sredstva priporočamo dodatek močil kot so: **BREAK THRU S 240, SILWET L-77** ali **ETALFIX-PRO**.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.