










## KROMPIR

### Prikaz uporabe pripravkov v primerni razvojni fazi krompirja

								
	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>89</b>
klitje	vznik	razvoj stebel in listov	začetek rasti v višino	konec rasti v višino	zapiranje grmov do tvorbe popkov	sedem in več listov razgrnjenih	začetek formiranja gomoljev	sušenje cime

<b>BOXER</b>
<b>BUZZIN</b>
<b>CHALLENGE</b>
<b>METRIC</b>
<b>PLATEEN WG 41,5</b>
<b>PROMAN</b>
<b>ROUNDUP</b>
<b>POWERMAX *</b>
<b>SHARPEN 33 EC</b>
<b>SHARPEN 40 SC</b>
<b>STALLION SYNC</b>
<b>TEC</b>
<b>STOMP AQUA</b>
<b>SENCOR SC 600</b>
<b>TAROT 25 WG</b>
<b>BASAGRAN 480</b>
<b>BASAGRAN</b>
<b>AGIL 100 EC</b>
<b>FUSILADE FORTE</b>
<b>ZETROLA</b>
<b>FOCUS ULTRA</b>
<b>TARGA SUPER</b>

<b>BELOUKHA</b>
<b>QUAD-GLOB 200</b>
<b>SL</b>
<b>REGLONE 200 SL</b>
<b>DESSICASH 200</b>
<b>SL</b>

## Abecedni seznam herbicidov primernih za uporabo v krompirju

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ACTIVUS 40 WG	5 kg/ha	tretira se po saditvi, vendar pred vznikom krompirja (BBCH 00 – 10)	dresni, enoletna latovka, enoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel, jetičnik; metlike, navadna kostreba, navadna zvezdica, navadni plešec, navadni srakoperec, njivska vijolica, njivski lisičji rep, pasje zelišče, plezajoča lakota, ščiri	
AGIL 100 EC	1 – 2 L/ha	po vzniku	njivski lisičji rep, navadni srakoperec, navadna kostreba, muhviči, proso, latovke, divji sirek, plazeča pirnica, gluhi oves, plazeča šopulja, prstasti pesjak	Sredstvo se <u>ne sme</u> uporabljati v zgodnjem krompirju, uporaba dovoljena 1x/leto, se <u>ne sme</u> mešati s herbicidi na osnovi a.s.: aculfurufen in imazetapir.
BASAGRAN * in BASAGRAN 480 *	1,5 – 2 l/ha	ko je krompir visok največ 10 cm	<u>Sredstvo dobro zatira</u> : njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico. <u>Sredstvo slabše zatira</u> : navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto. <u>Sredstvo ne zatira</u> zadovoljivo poljskega maka in jetičnika.	Priporoča se, da se s sredstvom tretira v zmerno toplem in jasnem vremenu, pri temperaturah od 10 do 25 °C. Za poln učinek sredstva naj vsaj nekaj ur po tretiranju ne dežuje.
BELOUKHA	16 l/ha poraba vode: 200 do 400 L/ha	najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja		Za sušenje krompirjevke!
BOXER	5 L/ha poraba vode: 300 – 400 L/ha	po sajenju, tik pred vznikom (BBCH 00 – 09)	<u>Sredstvo dobro zatira</u> : enoletno latovko, ščir, pasje zelišče, navadno zvezdico, njivsko spominčico, pravo kamilico, enoletni golšec, krvomočnico, škrlatnordečo mrtvo koprivo in jetičnike. <u>Sredstvo delno zatira</u> : navadni srakoperec, belo metliko, plezajočo lakoto, dresni in njivsko vijolico.	Da ne bi prekinili herbicidnega filma, ne obdelujte več tal, dokler krompir ne vznikne in plevel ne propade.
BUZZIN	0,75 kg/ha poraba vode: 200 do 400 L/ha	po sajenju in pred vznikom	<u>Dobro zatira</u> : srakonjo, navadno kostrebo, enoletno latovko, škrlatnordečo mrtvo koprivo, ogrščico, belo metliko, nedišečo trirobko, enoletni golšec, breskovo dresen, njivski mošnjak, navadni grint, navadno zvezdico, perzijski jetičnik in njivsko vijolico. <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> z: navadnim zebrotom in laško ljulko. <u>Omejeno deluje</u> na: navadni ščir, navadno rosnico, plezajočo lakoto, navadni slakovec in pasje zelišče.	1x v rastni sezoni
CHALLENGE	4 L/ha poraba vode: 100 do 300 L/ha	po sajenju in pred vznikom	<u>Zatira</u> : njivski lisičji rep, bela metlika, dvoredec, žabje ločje, jajčastolistna lazica, kamilice, enoletni golšec, njivna gorjušica, hrapava škrbinka, njivski jetičnik <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> z: navadni ščir, njivska zavratnica, kopjastolistna lazica, ptičja dresen, navadni slakovec, breskova dresen, vijolica,	1x v rastni sezoni
DESSICASH 200 SL	4 L/ha poraba vode: 200 – 600 L/ha	najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja		<u>Za sušenje krompirjevke!</u>

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
<b>FOCUS ULTRA</b>	a) 1,5 – 2 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha  b) 3 – 4 L/ha Poraba vode: 180 – 200 L/ha	a) po vzniku  b) pred cvetenjem	enoletni ozkolistni plevel; samonikla žita; večletni ozkolistni plevel	
<b>FUSILADE FORTE</b>	0,8 – 1,5 L/ha		divji sirek; enoletni ozkolistni plevel; plazeča pirnica; prstasti pesjak; večletni ozkolistni plevel	Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Ne sme se ga mešati s sredstvi na osnovi aktivne snovi bentazon. Ne sme se uporabljati v deljenih odmerkih (split aplikaciji), zaradi podaljšanja perzistentnosti.
<b>METRIC *</b>	1 – 1,5 L/ha  poraba vode: 200 – 400 L/ha	pred vznikom krompirja (BBCH 00)	<u>Dobro zatira:</u> navadni plešec, belo metliko, plezajočo lakoto, mrtvo koprivo, črni razhudnik ali pasje zelišče, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir, navadno zvezdico, navadno kostrebo, muhviče in srakonjo	Ne sme se ga uporabljati v tleh, kjer je več kot 10 % organske snovi.
<b>PLATEEN WG 41,5 *</b>	2,0 – 2,5 kg/ha	pred vznikom krompirja (BBCH 00)	enoletno latovko, krvavordečo srakonjo, navadno ogrščico, navadni plešec, kamilic, enoletni golšec, njivsko redkev, njivsko gorjušico, navadno zvezdico in njivsko vijolico, navadno kostrebo, njivski lisičji rep, plezajočo lakoto, navadno lobodo, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivsko škrbinko, malo koprivo in drobnocvetni rogovilček, belo metliko, pasje zelišče, breskovo dresen, navadni slakovec in ostale vrste dresni	
<b>PROMAN</b>	3 L/ha	pred vznikom krompirja (BBCH 00)	<u>zatira:</u> navadni plešec, škrlatnordeča mrtva kopriva, nedišča trirobka, navadna zvezdica, perzijski jetičnik, njivska vijolica, bela metlika, breskova dresen in pasje zelišče, ter enoletne ozkolistne pleveli, kot so: enoletna latovka, zeleni muhvič in gluhi oves. <u>Zmanjšuje zapleveljenost z:</u> srhkodlakavi ščir	
<b>ROUNDUP POWERMAX</b>	1 kg/ha	Pred saditvijo!	navadni rman, plazeča pirnica, orjaška šopulja, navadni pelin, ozkolistno ciprje, njivski osat, navadni osat, pisana čužka, robida, navadna kislica, topolistna kislica, njivska škrbinka, navadni regrat, plazeča detelja, enoletni njivski in gozdni pleveli, njivski lisičji rep, jalova stoklasa, bela metlika, dvoletni dimek, naceplenolistna krvomočnica njivska zavratnica, prava kamilica, poljski mak, enoletna latovka, navadna zvezdica, njivska vijolica, samosevna žita	Sredstvo ROUNDUP POWERMAX je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele.
<b>QUAD-GOLD 200 SL</b>	2 L/ha  poraba vode: 200 – 600 L/ha	najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja		<u>Za sušenje krompirjevke!</u>
<b>REGLONE 200 SL</b>	4 L/ha  poraba vode: 300 – 400 L/ha	14 dni pred izkopom krompirja		<u>Za sušenje krompirjevke!</u>

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
<b>SENCOR SC 600 *</b>	a) <b>0,75 L/ha</b> b) <b>0,15 L/ha</b>	a) po sajenju pred vznikom b) po vzniku do 9 listov (BBCH 10-19)	metlike, njivski slak, rogovilčke, dresni in navadni grint	Sencor SC 600 se ne sme uporabljati pri sortah Jaerla, SV 77/40 in 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran in Wineta.
<b>SHARPEN 33 EC in SHARPEN 40 SC</b>	<b>3-5 L/ha</b>	pred vznikom (BBCH 0-08)	<u>Zatira:</u> lisičji rep, srakoprec, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič. zmanjševanje zapleveljenosti širokolistne plevele: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica. <u>Slabo zatira:</u> slak in njivska preslica	
<b>TARGA SUPER</b>	<b>1,2 – 2,0 L/ha</b>	razvita dva lista, do začetka cvetenja (BBCH 12 do 61)	njivski lisičji rep, navadno kostrebo, ljulke, muhviče, navadno proso, stoklase, navadni srakoprec, samosevna žita in plazečo pirnico	
<b>STALLION SYNC TEC</b>	<b>3 L / ha</b> <b>poraba vode:</b> <b>200 - 400 L</b>	po sajenju vendar pred vznikom	<u>Dobro deluje:</u> plazečo pirnico, navadno kostrebo, navadni plešec, belo metliko, navadno rosnico, enoletni golšec, njivsko spominčico, ptičjo dresen, navadni slakovec, pasje zelišče, njivski mošnjak ter malo koprivo. <u>Srednje dobro deluje:</u> enoletno latovko, shrhkodlakavi ščir, oljno ogrščico, plezajočo lakoto, koprivo, kamilico, breskovo dresen, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, jetičnik ter njivsko vijolico.	
<b>STOMP AQUA</b>	<b>2,9 L/ha</b> <b>poraba vode:</b> <b>100 – 200 L/ha</b>	pred vznikom krompirja (BBCH 00)	<u>Dobro zatira:</u> enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno ogrščico. <u>Slabše zatira:</u> navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico	Sredstva se ne sme zadelati (inkorporirati) v tla.
<b>TAROT 25 WG *</b> (potrebno dodajanje močila)	<b>40 – 50 g/ha</b>	po vzniku od 3 listov do sklepanja vrst (BBCH 103 – 301)		Sredstva se ne sme uporabljati pri temperaturi nad 25 °C oziroma če je temperatura ponoči pred tretiranjem pod 6 °C.
<b>ZETROLA</b>	<b>0,75-1,5 L/ha</b>	ko so gojene rastline v razvojni fazi od treh pravih listov do konca rasti stebela oz. do popolne razraščeniosti (BBCH 13-39)	enoletnih ozkolistnih plevelov, plazeče pirnice se tretira v razvojni fazi plevela od drugega do četrtega lista, njivnega lisičjega repa, navadnega srakoperca, gluhega ovsa, angleške ljuljke	



\* Označeni pripravki niso dovoljeni za uporabo v Ukrepu 'Uporaba fitofarmaceutskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (POZ\_FFSV) – izbina zahteva'. Več si lahko prebere na povezavi: <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin>

Pripravila:  
mag. Karmen Rodič  
Specialistka za varstvo rastlin  
Služba za varstvo rastlin na KGZS Novo mesto