

# Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@gov.si](mailto:domen.bajec@gov.si)

ISSN

št. 16.

Datum: 23. junij 2017

## OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta v vinorodni deželi Posavje je v razvojni stopnji razvoja grozdičev, ki se povešajo in imajo jagode velikosti 2-4 mm (73-74 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred *peronospora vinske trte* svetujemo sredstva kot so: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA EDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (2-3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **PROFILER** (3 kg/ha), **MELODY COMBI** (1,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha),... Pri sortah z bujno rastjo, je za umiritev rasti po zaključenem cvetenju smiselno uporabiti tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4-5 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **GALBEN C** (0,4-0,5 % konc.),...

Soparno vreme omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z *oidijem vinske trte*. Okužbe je pričakovati na listju in grozdičih. Za varstvo svetujemo sredstva: **DYNALI** (0,65 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **CRYSTAL** (0,2 l/ha), ali **CABRIO TOP** (2 kg/ha),...

Razmike med tretiranjimi prilagodite priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Zaščitno oblogo obnovite na 7 do 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m<sup>2</sup> padavin ali več.

Pri pripravi škropilne brozge bodite v dneh z visokimi temperaturami ozračja in sončno pripeko pozorni na pojav morebitnih ožigov. Zaželeno je priprava mešanic z manjšim številom pripravkov.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet (Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F). Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev **tudi bakrovi pripravki**. Vročna vreme s sončno pripeko pozitivno vpliva na uspešno celjenje ran.

V zadnjih dneh beležimo okrepljen nalet II. rodu *grozdnih sukačev*. Zatiranje gosenic predvidevamo v začetku meseca julija.

Zatiranje *ameriškega škržatka*, prenašalca *zlate trsne rumenice*, je v vinorodni deželi Posavje obvezen ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice za vse imetnike vinske trte. Služba za varstvo rastlin napoveduje termin tretiranja z insekticidi v obdobju zadnje dekade meseca junija (med 20.06. in 01.07.2017). V vinogradih za pridelavo grozdja, brajda in ohišnicah je na razmejenem območju (celotno območje Vinorodne dežele Posavje; žarišča okužbe in varovalni pasovi žarišč okužbe) **obvezno opraviti najmanj 1**



**tretiranje.** Priporočamo sredstvo **ACTARA 25 WG** (v odmerku 200 g/ha), ki učinkovito zatira ameriškega škrdatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Možna je tudi uporaba pripravkov: RELDAN 22 EC, PYRINEX M22, oz. DECIS 2,5, DECIS, GAT DECLINE 2,5 EC, oz. pripravkov na podlagi piretrina (FLORA VERDE in BIOTIP FLORAL), ki pridejo v poštev tudi v ekološki pridelavi. S slednjimi pripravki je zaradi manjšega učinka posledično treba opraviti dodatna, naknadna tretiranja. Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno drugo sredstvo kot ACTARA 25 WG, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita. V tem primeru za drugo tretiranje proti amerškemu škrdatku uporabimo ACTARA 25 WG ali RELDAN 22 EC. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škrdatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škrdatkov.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na razmejenem območju:

*V matičnih vinogradih* uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha), RELDAN 22 EC (1,6 l/ha), PYRINEX M22 (1 l/ha) ali pripravke na podlagi piretrina. Drugo tretiranje boste izvedli okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija) s sredstvi: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 kg/ha; s tem tretiranjem lahko zajamete tudi grozdne sukače), RELDAN 22 EC (1,6 l/ha; s tem tretiranjem lahko zajamete tudi grozdne sukače), pripravki na podlagi piretrina (proti grozdnim sukačem sta registrirani sredstvi Flora verde in Biotip floral). Tretje tretiranje bo sledilo konec julija, prva dekada avgusta, s sredstvi ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 kg/ha) ali pripravki na podlagi piretrina, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škrdatki.

*V matičnjakih* uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha). Drugo tretiranje opravite okoli 2 do 3 tedne po prvem tretiranju (do 15. julija) s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha). Tretje tretiranje sledi (konec julija, prva dekada avgusta), če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škrdatki; s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha).

*V trsnicah* uporabite: ACTARA 25 WG (200 g/ha), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali DECIS (0,5 l/ha). Drugo tretiranje opravite do 3 tedne po prvem, do 15. julija s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha) ali DECIS (0,5 l/ha). Nadaljnja tretiranja sledijo 2 do 3 tedne kasneje, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škrdatki; s sredstvom ACTARA 25 WG (200 g/ha) ali DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha).

***Opozorjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).***

***Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.***

