



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto  
tel: 07/373 05 70, fax: 07/373 05 90  
e-mail: [domen.bajec@gov.si](mailto:domen.bajec@gov.si)

Številka obvestila: 39.

Datum: 03. avgust 2012

## OBVESTILO ZA SADJARJE

### Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk

V nasadih jablan in hrušk pri izvajanju varstva pred glivičnimi obolenji izbirajte med preventivnimi sredstvi. Proti *jablanovemu* in *hruševemu škrlupu* v 10 do 14 dnevni razmiki uporabite: **MANFIL 75 WG**, **MANFIL 80 WP**, **THIRAM 80**, **WG MERPAN 80 WDG**, **MERPAN 50 WP**, **DITHANE DG NEOTEC**, **DITHANE M-45**, **ANTRACOL WG 70**, **ANTRACOL**, **POLYRAM DF**, **PENNZEB 75 DG**, **PINOZEB M-45** ali **DELAN 700 WG**,... Pripravek **BELLIS** (7 dni karence) je predviden tudi za *skladiščne bolezni* in ga je smiselno uporabiti dvakrat zaporedoma.

Proti *jablanovi pepelovki* dodajte enega od žveplovih pripravkov: **COSAN**, **KUMULUS**, **MOČLJIVO ŽVEPLO**, **PEPELIN**, **THIOVIT JET** ali **VINDEX 80 WG**,... , ki delujejo zaviralno tudi na *pršice*. Razmiki med tretiranjimi naj bodo prilagojeni tudi pojavu padavin. Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo obnoviti, če pade več kot 30 l/m<sup>2</sup> padavin.

Na površinah, kjer je v preteklih letih *jabolčni zavijač* delal težave, uporabite sredstva kot so **AFFIRM**, **CORAGEN** ali **MOSPILAN 20 SG**, oz. **CALYPSO SC 480**,... Svetujemo dodajanje pripravka **MADEX**, ki se v ekološki pridelavi uporablja samostojno. Aplikacijo opravite v večernih urah, saj je aktivni virus granuloze občutljiv na UV svetlobo.

**V primeru toče** priporočamo pripravke kot je merpan, delan,...

**Opozorjamo tudi na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje opravevalcev ter vodnih virov.**

## OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

Vinogradnikom za varstvo pred *peronosporo vinske trte* priporočamo uporabo preventivnih sredstev: **DELAN 700 WG** (0,5-0,75 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,24-1,5 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), ... ali *strobilurinske pripravke*, ki učinkujejo tudi proti oidiju vinske trte: **QUADRIS** (0,75-1 l/ha), **UNIVERSALIS** (2 l/ha) ali **CABRIO TOP** (2 kg/ha). V primeru bujne rasti lahko uporabimo tudi sredstva na osnovi ali v kombinaciji z bakrom: **BAKRENI ANTRACOL** (2,5-3,5 kg/ha, le preventivno), **CURZATE R** (2-3 kg/ha), **GALBEN C** (4-5 kg/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha, le preventivno),...

Proti *oidiju vinske trte* dodajte: **COLLIS** (0,4 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1-1,25 l/ha), **CABRIO TOP** (2 kg/ha), **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha), **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **CRYSTAL** (0,2 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha) ali **VIVANDO** (0,2 l/ha),... ali **PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA**.

**V primeru toče** uporabite za zaščito pred peronosporo preventivne pripravke kot so delan, folpan, manfil,... ali sredstva na osnovi bakra. Za varstvo pred oidijem priporočamo pripravek karathane gold.

*Razmiki med tretiranjimi naj bodo prilagojeni pojavu padavin, v razmikih na 10 – 14 dni. Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo obnoviti, če pade več kot 30 l/m<sup>2</sup> padavin.*

*Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje oprasovalcev ter vodnih virov.*

### **NADZOR ZLATE TRSNE RUMENICE – FITOSANITARNO PREGLEDOVANJE**

Vinogradnike obveščamo, da bo Služba za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, v obdobju med 01. avgustom in 15. septembrom v vinorodni deželi Posavje intenzivno pregledovala vinograde za simptomi trsnih rumenic. Namen fitosanitarnega pregledovanja je vzorčenje trt s simptomi trsnih rumenic in svetovanje pravilnega izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice.

Vzorčene trse bomo označili z barvnim lepilnim trakom in uradno nalepko, lastniki pa bodo naknadno pisno obveščeni o rezultatih laboratorijske analize.

Če ste na posamezne rumene lepljive plošče v obdobju tedna dni ulovili 4 ali več ameriških škržatkov, je v trenutnem obdobju še čas za 3. tretiranje z insekticidom. Priporočen pripravek je **ACTARA 25 WG**, v odmerku 200 g/ha. V ekološki pridelavi so dovoljena le sredstva na podlagi piretrina: **KENYATOX VERDE** v odmerku 0,8 l/ha ali **FLORA VERDE** v 1,6 l/ha.

Spremljanje ameriškega škržatka je obvezno tudi v vseh trsnicah, matičnih vinogradih in matičnjakih. Na omenjenih površinah so za njegovo zatiranje obvezne izvedbe štirih tretiranj.

Podrobnejše informacij o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice so dosegljive na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije: <http://www.fu.gov.si/> .

*Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje vodnih virov. Zaradi varstva čebel in ostalih oprasovalcev je potrebno predhodno odstraniti cvetočo podrast in zaščito opraviti v času, ko čebele ne letajo. Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline.*

### **OBVESTILO ZA VRTNARJE**

#### **Obvestilo za pridelovalce plodovk**

Pridelovalce plodovk opozarjamo na pojave *južne plodovrtke* in *koruzne vešče*. Sovka napada predvsem paradižnik in jajčevce, vešča ima raje papriko. Pridetek lahko zaščitite s pripravki **ALVERDE** (paradižnik, paprika imata 1 dan karence; le proti sovkam, samo v zaščitnih prostorih) ali **AFFIRM** (paradižnik, paprika, jajčevci imajo 3 dni karence),...