

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 19.

Datum: 10. julij 2017

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Grozne jagode se pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združujejo v grozd. Večina jagod se med seboj že dotika (79 po lestvici BBCH).

V obdobju nestanovitnega vremena je za varstvo pred glivičnimi obolenji priporočena uporaba kombiniranih pripravkov, z več aktivnimi snovmi. Proti *peronospori vinske trte* svetujemo v vinogradih s prisotnimi okužbami sredstva: **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA EDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha)... V vinogradih brez zaznanih okužb lahko pristopate tudi z enostavnimi preventivnimi pripravki. Pri sortah z bujno rastjo ('Modra frankinja', 'Žametna črnina') je po zaključenem cvetenju občasno smiselno uporabiti tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4-5 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **GALBEN C** (0,4-0,5 % konc.),...

Soparno vreme omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z *oidijem vinske trte*. Za varstvo svetujemo sredstva: **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **CRYSTAL** (0,2 l/ha), **VITISAN** (16 kg/ha)...

Razmike med tretiranjmi prilagodite razvoju bolezni, priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Kjer je bolezen močnejše prisotna, je potrebno zmanjšati razmik med nanosi. Zaščitno oblogo sicer obnovite na 7 do največ 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m² padavin ali več.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte **prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet**: Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F. Za ta namen pridejo v poštev **tudi bakrovi pripravki**.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Med spremljanjem razvoja *ameriškega škržatka* beležimo v vinorodni deželi Posavje prisotnost ličink na stopnjah L4 in L5 ter tudi odrasle osebkke.

V primeru, da ste v vinogradih za pridelavo grozdja (tudi brajdah in ohišnicah) prejšnje zatiranje opravili s sredstvom **ACTARA 25 WG** in se na rumene lepljive plošče ameriški škržatek ne lovi, drugo tretiranje ni



MKGP-UVHVV

KGZS-Zavod Novo mesto

obvezno. Če se na rumene lepljive plošče ulovi 4 ali več odraslih ameriških škržatkov, je potrebno opraviti tudi drugo tretiranje. Tretiranje je obvezno tudi v primeru, če prvega niste opravili s pripravkom ACTARA 25 WG. Za varstvo prideta v poštev pripravka **ACTARA 25 WG** (200 g/ha) ali **RELDAN 22 EC** (1,6 l/ha; le 1× letno), ki deluje tudi na **grozdne sukače**. Kjer je potrebno, opravite nanos v obdobju druge dekade meseca julija (med 10. in 20.07.2017). V ekološki pridelavi je treba opraviti dve tretiranj, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden (v takem primeru tretiranja ni treba ponoviti). V ekološki pridelavi so na razpolago pripravki na osnovi piretrina: **FLORA VERDE** in **BIOTIP FLORAL** (oba 1,6 l/ha).

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba zatirati ameriškega škržatka povsod po Sloveniji najmanj dvakrat. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba tretiranje ponoviti. V matičnih vinogradih lahko uporabite pripravke **ACTARA 25 WG** (200 g/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha), **RELDAN 22 EC** (1,6 l/ha; le 1× letno), **PYRINEX M22** (1 l/ha; le 1× letno), **FLORA VERDE** ali **BIOTIP FLORAL** (oba 1,6 l/ha). V matičnjakih in trsnicah sta za drugo tretiranje dovoljena **ACTARA 25 WG** (200 g/ha) ali **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

