



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto  
tel: 07/373 05 70, fax: 07/373 05 90  
e-mail: [domen.bajec@gov.si](mailto:domen.bajec@gov.si)

**Številka obvestila: 35.**  
**Datum: 17. julij 2012**

## OBVESTILO ZA SADJARJE

### Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk

Varstvo pred *jablanovim* in *hruševim škrlupom* opravljajte preventivno. Upoštevajoč vremenske razmere so lahko razmiki med tretiranjem tudi na 10 – 14 dni. Priporočamo uporabo pripravkov: **MERPAN 80 WDG**, **MERPAN 50 WP**, **MANFIL 75 WG**, **MANFIL 80 WP**, **DITHANE DG**, **NEOTEC**, **DITHANE M-45**, **ANTRACOL WG 70**, **ANTRACOL**, **POLYRAM DF**, **PENNCOZEB 75 DG**, **PINOZEB M-45**, **THIRAM 80 WG** ali **DELAN 700 WG**,...

Proti *jablanovi pepelovki* dodajajte enega od žveplovih pripravkov: **COSAN**, **KUMULUS**, **MOČLJIVO ŽVEPLO**, **PEPELIN**, **THIOVIT JET** ali **VINDEX 80 WG**,... , ki delujejo zaviralno tudi na *pršice*.

Sicer so zoper prereznožitve *rdeče sadne* in *navadne pršice* predvideni **VERTIMEC 1,8% EC**, **MASAI**, **MILBEKNOCK**, **ORTUS 5 SC**,...

Proti drugi generaciji *jabolčnega zavijača* ukrepajte s **CORAGEN**, **AFFIRM**, **PYRINEX 25 CS** ali **MOSPILAN 20 SG**, **CALYPSO SC 480**, ki delujeta še na listne uši in sadnega listnega duplinarja,...

Prerazmnožitve *listnih uši* lahko drugače nadzorujemo tudi z uporabo sredstev **TEPPEKI**, **CONFIDOR 200 SL**, **KOHINOR SL 200**, **MOSPILAN 20 SG**,... ali **NEEMAZAL -T/S**, ki ga svetujemo zlasti v nasadih napadenih s *sadnim listnim duplinarjem* kot 2. del predvideno deljenega nanosa sredstva.

**Opozorjamo tudi na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje vodnih virov. Zaradi varstva čebel in ostalih oprasovalcev je potrebno predhodno odstraniti cvetočo podrast in zaščito opraviti v času, ko čebele ne letajo. Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

## OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

Vinogradnikom za varstvo pred *peronosporo vinske trte* priporočamo uporabo preventivnih sredstev: **FOLPAN 80 WDG** (1,24-1,5 kg/ha), **DELAN 700 WG** (0,5-0,75 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), ... ali *strobilurinske pripravke*, ki učinkujejo tudi proti oidiju vinske trte: **QUADRIS** (0,75-1 l/ha), **UNIVERSALIS** (2 l/ha) ali **CABRIO TOP** (2 kg/ha). Kjer se še pojavljajo okužbe, jih zaustavite z: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (0,4 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha),...

Proti *oidiju vinske trte* dodajte: **NATIVO 75 WG** (0,18 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha), **FALCON EC 460** (0,3-0,4 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1-1,25 l/ha), **CRYSTAL** (0,2 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), **CABRIO TOP** (2 kg/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha) ali **VIVANDO** (0,2 l/ha),... Prednost dajemo sredstvom s kombinacijo več aktivnih snovi.

*Razmiki med tretiranjmi naj bodo prilagojeni pojavu padavin, v razmikih na 10 – 14 dni. Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo obnoviti, če pade več kot 30 l/m<sup>2</sup> padavin.*

*Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje vodnih virov. Zaradi varstva čebel in ostalih oprasovalcev je potrebno predhodno odstraniti cvetočo podrast in zaščito opraviti v času, ko čebele ne letajo. Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline.*

V ekološki pridelavi priporočamo proti *peronospori vinske trte* uporabo pripravka **FRUTOGARD** (v odmerku 5 l/ha, ne meša se s sredstvi, ki vsebujejo kalcij ali apno, odsvetuje se mešanje s sulfati). Možna je tudi uporaba bakrovih pripravkov: **NORDOX 75 WG**, **FLOWBRIX BLAU SC**, **CUPRABLAU Z**, **CUPRABLAU Z ULTRA**, **CHAMPION 50 WG**, **KOCIDE DF**, **BORDOJSKA BROZGA – CAFFARO WP**,... katere priporočamo v 30% priporočenega odmerka. Dodate še **KOMARČKOV EKSTRAKT** v 0,3% koncentraciji in **VITISAN – KALIJEV HIDROGEN KARBONAT** v 1% koncentraciji. Dodana pripravka delujeta tudi na *oidij vinske trte*. Proti oidiju vinske trte je predviden še **AQ – 10** (35 g/ha, za aktivacijo je potrebna višja zračna vlaga) na osnovi glive *Ampelomyces quisqualis*.

*Opozarjamo vas na upoštevanje navodil za uporabo in načrtovanje sprejemljivih kombinacij priporočenih sredstev z drugimi pripravki.*

#### Nadzor prenašalcev zlate trsne rumenice

V trenutnem obdobju je v vinogradu potrebno obesiti 3 do 5 rumenih lepljivih plošč, s katerimi boste preverjali uspešnost dosedanjih zatiranj *ameriškega škržatka*. Svetujemo, da plošče, ki jih obesite na žico v senčne dele trsov, enakomerno razporedite po vinogradu in jih ne režete na manjše kose. Manjšanje površine plošč ne omogoča primerljivih rezultatov spremljanja. Trenutno se glavnina osebkov nahaja v zadnji razvojni stopnji ličinke (L5), prisotni so tudi posamezni odrasli osebki.

V primeru ulova več kot štirih odraslih ameriških škržatkov na ploščo – v obdobju tedna dni, bo potrebno v zadnji dekadici meseca julija, oz. začetku avgusta opraviti še tretje tretiranje. Priporočen pripravek je **ACTARA 25 WG**, v odmerku 200 g/ha. V ekološki pridelavi so dovoljena le sredstva na podlagi piretrina: **KENYATOX VERDE** v odmerku 0,8 l/ha ali **FLORA VERDE** v 1,6 l/ha.

Podrobnejše informacij o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice so dosegljive na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije: <http://www.fu.gov.si/> .

*Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmaceutskih sredstev in dosledno varovanje vodnih virov. Zaradi varstva čebel in ostalih oprasovalcev je potrebno predhodno odstraniti cvetočo podrast in zaščito opraviti v času, ko čebele ne letajo. Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline.*