

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 13

Datum: 29. maj 2019

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk se nadaljuje razvoj plodičev (72 po lestvici BBCH).

Deževno vreme omogoča širjenje okužb z *jablanovim škrlupom*. V zadnji dekadi meseca so bile možne okužbe 21.05. (24 ur, močna), 22.05. (15 ur, zmerna) in 27.05.2019 (61 ur, močna), ki še traja.

Pege so pogoste na listih, pojavljajo se tudi na plodičih. Preventivni pristop je bil zaradi okoljskih razmer marsikje otežen, zato svetujemo, da ob prenehanju padavin opravite zaščito s kombinacijo zdravilno delujočih pripravkov: **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFENZONE** (0,2 l/ha), **DUAXO KONCETRAT** (3,3 l/ha) ali **DOMARK 100 EC** (0,4 l/ha) in preventivnih: **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG Neotec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha; le jablana), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha; le jablana), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2,5 kg/ha; le jablana), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha; le jablana), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOXIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha) ali **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha). Zdravilno deluje tudi **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na m višine krošnje; uporaba možna le pri registriranih pridelovalcih), ki ni omejen le na *ekološko pridelavo*.

Na površinah z izrazitejšim pojavom *jablanove pepelovke* uporabite **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha), **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **ZATO 50 WG** (0,15 kg/ha), **FLINT** (0,15 kg/ha) ali **TERCEL** (2,5 kg/ha). Slednji pripravki imajo določeno delovanje tudi na škrlup. **ŽVEPLOVE PRIPRAVKE** uporabite za preventivo, v primeru, da okužb na poganjkih še ni zaslediti. Pri ročnem odstranjevanju poganjkov iz nasada bodite pozorni na lastno varnost in ne pozabite uporabiti zaščitne rokavice.

Pri spremljanju temperaturnih pogojev za uspešno odlaganje in razvoj jajčec *jabolčnega zavijača* bodo le ti izpolnjeni po zaključku padavin, v prvih dneh meseca junija. Takrat predvidevamo zaščito nasadov s pripravki **HARPUN** (1 l/ha; deluje zgolj na jajčeca; učinkuje tudi na *ameriškega kaparja*), **INSEGAR 25 WG** (0,6 kg/ha) ali **CORAGEN** (18 ml/hl, oz. največ 270 ml/ha)).

Po koncu deževnih dni namenite pozornost tudi *rdeči sadni* in *navadni pršici*. V primeru opaženih 4 osebkov na list svetujemo pripravke kot so **KANEMITE SC** (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje), **KOROMITE** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), **MILBECKNOCK** (625 l/ha pri porabi vode 500 l na ha na 1 m višine krošnje), **MASAI** (0,5 kg/ha) ali **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha). V *ekološki pridelavi* pride v poštev pripravek **NATURALIS** (1,5 l/ha, pri porabi vode 600-1500 l/ha), oz. za oviranje razvoja **pripravki na osnovi žvepla**.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelarom nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto