

# Obvestilo za POLJEDELSTVO



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
Obvestilo pripravila: Karmen Rodič, e-pošta: [karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si](mailto:karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 9

Datum: 11. maj 2018

## OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU

V nasadih kjer je krompir že začel s strjevanjem vrst priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti *krompirjeve plesni* z enim od *kontaktnih fungicidov*: **ANTRACOL\*** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL WG 70\*** (2,5 kg/ha), **DITHANE DG Neotec\*** (2 kg/ha), **DITHANE M-45\*** (2 kg/ha), **ENERVIN** (2 kg/ha), **FROWNCIDE** (0,4 l/ha), **GETT\*** (2 – 2,5 kg/ha), **MANFIL PLUS 80 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG\*** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (1,7 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **RANMAN TOP** (0,5 l/ha), **REVUS** (0,4 – 0,6 l/ha), **SHIRLAN 500 SC** (0,4 l/ha), **WINBY** (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: **BADGE WG**, **CUPRABLAU Z 35 WP\*** ali **CUPRABLAU Z 35 WG\*** (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Navedene pripravke lahko uporabite tudi na območjih kjer je bila povzročena škoda zaradi *toče*.

V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pripravki označeni z \* so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

*Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pazno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.*

### Koloradski hrošč

V posevkih krompirja smo opazili prve odrasle osebk *koloradskega hrošča*, samice so tudi že začele z izleganjem jajčec. Odraslih hroščev običajno ne zatiramo. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20% grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot 20 ličink na grm. Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **ACTARA 25 WG**, **ALVERDE**, **BISCAYA**, **BULLDOCK EC 25**, **CALYPSO SC 480**, **\*\*CORAGEN**, **DASKOR 440**, **EVURE**, **LASER 240 SC**, **LASER PLUS**, **MAVRIK 240**, **MIDO 20 SL**, **MOSPILAN 20 SG**, **NUPRID 200 SC** ali **SPARVIERO**.

V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek **NEEMAZAL T/S** ali pripravek na osnovi piretrina: **RAPTOL KONCENTRAT**.

Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Če uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemskih sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.

*Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pazno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih oprasovalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmaceutskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.*

**Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2017, registrirani za zatiranje koloradskega hrošča.**

SISTEMIČNI INSEKTICIDI			
Fitofarmaceutsko sredstvo	Aktivna snov	Odmerek, koncentracija/ha	Karenca (dni)

<b>ACTARA 25 WG</b>	tiametoksam	60-80 g	14
<b>BISCAYA</b>	tiaklopid	0,3 l	14
<b>CALYPSO SC 480</b>	tiaklopid	0,1 l	21
<b>MIDO 20 SL</b>	imidaklopid	0,3 l/ha	14
<b>MOSPILAN 20 SG</b>	acetamiprid	100 g	14
<b>NEEMAZAL T/S *</b>	azadirahatin	0,25 %	/
<b>NUPRID 200 SC</b>	imidaklopid	0,3 l/ha	14
<b>DOTIKALNI INSEKTICIDI</b>			
<b>BULLDOCK EC 25</b>	beta-ciflutrin	0,5 l	7
<b>**CORAGEN</b>	klorantraniliprol	0,06 l	14
<b>SPARVIERO</b>	lambda-cihalotrin	0,075 l	7
<b>DASKOR 440</b>	cipermetrin + klorpirifosmetil	0,625 L	21
<b>EVURE</b>	tau-fluvalinat	0,2 L	14
<b>ALVERDE</b>	metaflumizon	0,25 l	14
<b>MAVRIK 240</b>	tau-fluvalinat	0,2 l	14
<b>RAPTOL KONCENTRAT *</b>	olje ogrščice + piretrin	10,0 l	3
<b>LASER 240 SC</b>	spinosad	0,2 l	7
<b>LASER PLUS</b>	spinosad	0,04 l	14
* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.			
** Pripravek ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1) in v ukrepu KOPOP (POS_FFS).			