

# Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@gov.si](mailto:domen.bajec@gov.si)

ISSN

št. 09.

Datum: 06. junij 2019

## OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta je po razvoju tik pred cvetenjem; socvetja so popolnoma razvita, z ločenimi cvetovi (57 po lestvici BBCH).

Deževno vreme omogoča ugodne pogoje za okužbo s *peronosporo vinske trte*. Za varstvo svetujemo kombinirane pripravke kot so: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FOLPAN GOLD** (staro ime **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE**; 2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Sistemsko delujoča priprava na osnovi fosfonatov: **SORIAL LX** in **LBG-01F34** nanese v odmerku 4 l/ha, če ju uporabite samostojno, oz. 3 l/ha v kombinaciji s fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb. **DELAN PRO** (3 l/ha) kot kombinacija fosfonatov in ditianona deluje podobno. S sredstvi na osnovi aktivne snovi fosetil aluminij je potrebno nanos opraviti 3 × zaporedoma, v razmiku 8-10 dni (prilagodite intenzivnosti rasti). V primeru zaznanih bolezenskih znamenj svetujemo: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha) ali **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha) ali **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), sicer zadoščajo **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (1-2 kg/ha).

**V primeru neurja s točo** opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

Nevarnost okužb z *oidijem vinske trte* narašča. Izpostavljeni so kabrniki, katere je potrebno zaščititi s pripravki kot so: **SERCADIS** (0,15 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha),...

Razmike med tretiranjimi prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

**V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto