

TRGATEV 2018 - BIZELJSKO - SREMIŠKI VINORODNI OKOLIŠ

1. VZORČENJE 06.08.2018

Zap. št.	Sorta	Lega	zdravstveno stanje	masa 100 jagod (g)	volumen soka 100 jagod (mL)	sladkor z refraktometrom (°Oe)	sladkor z refraktometrom (°Brix)	skupne tit. kisline (g/L)	pH	vinska kislina (g/L)	jabolčna kislina (g/L)	indeks zorenja
1	Beli pinot	Sremič	poškodbe od toče	174	94	65	15,5	15,6	2,67	8,1	10,4	42
2	Chardonnay	Sremič	poškodbe od toče	163	90	58	13,7	18,6	2,50	8,6	13,1	31
3	Chardonnay	Sremič - Zdole	poškodbe od toče, oidij	165	70	50	11,6	21,7	2,32	8,9	15,7	23
4	Kerner	Sremič - Zdole	poškodbe od toče	206	130	57	13,5	15,6	2,61	9,3	9,3	37
5	Rumeni muškat	Bučerca	zdravo	253	130	58	13,6	11,7	2,86	6,5	7,8	50
6	Sauvignon	Sremič	poškodbe od toče	134	50	58	13,9	17,0	2,54	9,2	10,9	34
7	Sauvignon	Sremič - Zdole	poškodbe od toče	163	100	65	15,5	16,4	2,61	8,5	11,0	40
8	Traminer	Sremič - Zdole	poškodbe od toče	173	100	57	13,4	12,0	2,82	7,8	7,2	47

Po zgodnjem cvetenju vinske trte smo lahko v letniku 2018 pričakovali tudi zgodnejšo trgatvev. Vremenski pogoji v času cvetenja so bili idealni zato smo si lahko obetali dober vinski letnik. Žal je v času dozorevanja grozdja velik del vinorodne dežele Posavje prizadela toča, nekatera območja celo večkrat. Vsakodnevne plohe z veliko dežja so pripomogle k razvoju bolezni vinske trte. Posledica teh dejstev je zelo neenakomerno dozorevanje grozdja tako v istem vinogradu, kakor tudi v primerjavi s posameznimi vinogradi in legami.

Podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2018 v zgornji tabeli kažejo na zmerno dozorevanje grozdja. Sladkorne stopnje so obetajoče, skupne kisline še visoke, pH vrednosti pa nizke, kar predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje dozorevanje grozdja.

Stopnja dozorelosti grozdja je v tem trenutku primerljiva od stopnje dozorelosti grozdja v enakem lanskem časovnem obdobju.

Na podatke spremljanja dozorevanja morajo biti pozorni predvsem pridelovalci vin PTP in penečih vin.

Rezultati opravljenih meritev so merodajni za vzorčene vinograde in jih ne smemo vzeti na splošno, zato naj spomnimo, da je potrebno v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja (sladkorna stopnja, skupne kisline, zdravstveno stanje) in določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto. Zgornji rezultati so nam lahko pri tem v oporo.

Naj omenimo, da je trgatvev odločilno in sklepno opravilo vinogradnikov, ko je potrebno vinarjem prepustiti čimbolj zdravo in dozorelo grozdje. S skupnim trganjem kakorkoli prizadetega in zdravega, kakovostnega grozdja se zniža kakovost celotnega pridelka. V ta namen se odstranjuje poškodovano, neobarvano grozdje, uvele, suhe dele grozdja in tudi grozde, ki so poškodovani bodisi od bolezni, insektov in fizioloških motenj. Vsi ukrepi, ki pripomorejo k večji higieni, oc odstranjevanja starih, suhih rumenih listov do odstranjevanja poškodovanih grozdov, neposredno vplivajo na manjšo okužbo z botrytisom in višjo kakovost pridelanega grozdja. Ob morebitni uporabi botriticida za preprečevanje gnilobe naj vinogradnike opozorimo na nujno upoštevanje karence v izogib težavam pr alkoholnem vrenju mošta.