

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 24

Datum: 19. november 2019

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da v nasadih ob odpadanju listja poskrbite za preventivno varstvo ran, ki nastanejo ob defoliaciji in drugih poškodbah na skorji.

Za zmanjšanje možnosti **okužb lesa z glivičnimi** (*jablanov rak, gniloba koreninskega vratu, ...*) in **bakterijskimi obolenji** (*hrušev ožig*) svetujemo ob začetku odpadanja listja uporabo bakrovih pripravkov. Njihova uporaba bo znižala tudi infekcijski potencial *jablanovega* in *hruševega škr lupu*. Izbirate lahko med pripravki: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha; proti *jablanovemu škr lupu*), **CUPRABLAU Z 35 WG** (za zatiranje *jablanovega škr lupu* v odmerku 3 kg/ha, oz. *gnilobe koreninskega vratu*: tretiranje posamičnih okuženih dreves v odmerku 15-35 g na 100 l vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 l vode na drevo), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (2,5 kg/ha; proti *jablanovemu škr lupu*) ali **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; le proti *jablanovemu raku*).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni številnim glivičnim okužbam.

V nasadih breskev in nektarin priporočamo varstvo pred **breskovo kodravostjo** z uporabo **bakrovih pripravkov**. Tretiranje opravite, ko odpade večina listja. S tem popolnite zaščito lesa pred glivičnimi in bakterijskimi obolenji. Izbirate lahko med: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičastih sadnih vrst (*breskev, marelica, češnja, sliva*), kot so **listne luknjičavosti, monilijska obolenja, listne pegavosti** in **ožigi**, lahko opravite tudi s **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha, le za marelico, češnjo in slivo) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Pri izvedbi nanosa priporočamo večjo porabo vode.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto