

# Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@kgzs-zavodnm.si](mailto:domen.bajec@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 01

Datum: 15. februar 2019

## VARSTVO BRESKEV IN MARELIC

Pridelovalce breskev in marelic obveščamo, da so zadnji sončni dnevi pri obeh sadnih vrstah okrepili pretok rastlinskih sokov, zaradi česar brsti hitro nabrekajo. Breskev ima ponekod luske cvetnih brstov že razprte in tudi opazne svetlo zelene dele brsta (51-53 po lestvici BBCH).

Pospešen razvoj je smiselno umiriti, saj bodo odprti brsti prehitro izpostavljeni pozebi in glivičnim okužbam. Priporočamo beljenje debel z apnenim beležem, oz. kaolinskimi glinami, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje upočasnili.

Temperature, ki zadnji teden sredi dneva dosegajo 8 – 12 °C, so ugodne za razvoj **breskove kodravosti**. V takem stanju bi bili v primeru padavin nasadi breskev in nektarin že izpostavljeni okužbam. Za preventivno varstvo svetujemo uporabo enega od pripravkov na osnovi bakra, ki koščičaste sadne vrste varuje še pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** in **bakterijskim okužbami**. Ob tem opozarjamo na večjo pazljivost, saj se pri nizkih temperaturah (dnevna temperatura zraka pod 8 °C, nočna pod lediščem) in dežju lahko pojavijo ožigi. V poštev pridejo: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha), **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6-2 kg/ha; le za listno luknjičavost koščičarjev), **BADGE WG** (3,5 kg/ha; le za listno luknjičavost koščičarjev).

Za varstvo marelic pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** lahko uporabite: **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6-2 kg/ha), **BADGE WG** (3,5 kg/ha) ali **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha).

Poskrbite za kvaliteten nanos, z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves. **Nanos opravite v toplem vremenu, ko ne bo vetra!**

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

