













HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2019

									
Pred vznikom 0	Pred vznikom 7	Vznik 10	En list 11	Dva lista 12	Trije listi 13	Štirje listi 14	Pet listov 15	Šest listov 16	7 in več listov 17-32
suho seme	koleoptila prodrla iz zrna	prvi list prodrl skozi koleoptilo	prvi list razgrnjen	drugi list razgrnjen	tretji list razgrnjen	četrti list razgrnjen	pet listov razgrnjenih	šest listov razgrnjenih	sedem in več listov razgrnjenih
KYLEO									
ROUNDUP									
POWERMAX									
FRONTIER X2 *									
DUAL GOLD 960 EC *									
EFICA 960 EC									
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC *									
SHARPEN 40 SC, SHARPEN 33 EC									
MERLIN FLEXX	MERLIN FLEXX								
	ADENGO								
	CALARIS PRO								
	LUMAX *								
	LUMAX H 537.5 SE								
CALLISTO 480 SC	CALLISTO 480 SC								
	STOMP AQUA								
	SUCCESSOR 600 *								
	CAPRENO								
	PEAK 75 WG								
	BASAGRAN, BASAGRAN 480 *								
	STARANE FORTE								
	ELUMIS *								
	LONTREL 100 *								
	AKRIS *								
	ALISEO PLUS *								
	ARRAT *								
	CLIOPHAR 600 SL								
	EQUIP								
	MONSOON ACTIVE								
	MURAL								
	CAMBIO *								
	ARIGO *								
	BANDERA *								
	DICASH *								
	FOCUS ULTRA								
	HARMONY 50 SX								
	KALIMBA								
	KAMBA 480 SL								
	KELVIN MAX								
	LAUDIS								
	LAUDIS WG 30								
	LONTREL 72SG								
	MILAGRO EXTRA 6 OD								
	MOTIVEL EXTRA 6 OD *								
	NIKITA								
	OSORNO								
	PRIMERO *								
	SAMSON 4 SC *, SAMSON EXTRA 6 OD *								
	SPANDIS								
	TALISMAN								
	TAROT 25 WG *								
	TEMSA SC								
	BANVEL 480 S *								
	CALLAM *								
	ENTAIL *								

									
Pred vznikom 0	Pred vznikom 7	Vznik 10	En list 11	Dva lista 12	Trije listi 13	Štirje listi 14	Pet listov 15	Šest listov 16	7 in več listov 17-32
suho seme	koleoptila prodrla iz zrna	prvi list prodrl skozi koleoptilo	prvi list razgrnjen	drugi list razgrnjen	tretji list razgrnjen	četrti list razgrnjen	pet listov razgrnjenih	Šest listov razgrnjenih	sedem in več listov razgrnjenih
						MILAGRO 240 SC *			
						NICOSH			
						TANDUS 200 EC			
						MOTIVELL *			
						KELVIN *			
						ESTERON			
						MUSTANG 306 SE			
						NAGANO			
						KELVIN OD *			

LASTNOSTI HERBICIDOV DOVOLJENIH ZA UPORABO V KORUZI V LETU 2018

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ADENGO	0,44 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L vode/ha	pred ali po vzniku koruze do faze 3 listov koruze (BBCH 00 - 13)	<u>Učinkovito zatira:</u> <i>navadno lobodo, navadni plešec, metliko, drobnocvetni rogovilček, kamilico, spominčico, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, pasje zelišče, navadno zvezdico, zeleni muhvič, gluhi oves, enoletno latovko, krvavo rdečo srakonjo, njivsko vijolico, navadni slakovec in navadno kostrebo</i>	MEŠANJE: Sredstvo Adengo se ne meša s sredstvi EC ali OD formulacije, s herbicidi, ki vsebujejo aktivne snovi v obliki estra, s tekočimi gnojili ali z močili.
AKRIS *	3 l/ha Poraba vode: 200 - 400 l/ha	2 - 6 listov (BBCH 12 - 16)	<u>Zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, laški muhvič, enoletno latovko, dresni, navadno lobodo, pasje zelišče, enoletni golšec, kamilico, belo metliko, mnogosemnsko metlika, njivsko vijolico, navadno zvezdico, navadni ščir in drobnocvetni rogovilček.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost s:</u> <i>pirnico, njivskim slakom in navadnim plotnim slakom</i>	
ALISEO PLUS * (dodajanje močila)	350-440 g/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ ha	2 - 6 listov (BBCH 12 - 16)	<u>Dobro zatira:</u> <i>ljudke, proso, enoletno latovko, navadni oves, muhviče in divji sirek; ščire, navadno lobodo, navadno ogrščico, navadni plešec, navadno rosnico, kamilice, slizek, navadni nefrolepsis, ščavjelistno dresen, breskovo dresen, njivsko redkev, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak in jetičnik, srakonje, kostrebo; belo metliko, mnogosemnsko metliko, njivsko vijolico</i> <u>Zadovoljivo zatira:</u> <i>pirnico; baržunasti oslez, navadni plotni slak, njivski osat, plezajočo lakoto, drobnocvetni rogovilček, veliki trpotec, ptičjo dresen, navadni slakovec, navadno solinko, pasje zelišče, škrbinke in bodič</i>	
ARRAT * (dodajanje močila)	0,2 kg/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	2 - 6 listov (BBCH 12 - 16)	<u>Dobro zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec, metlike, plezajoča lakota ali smolenec, kamilice, njivski mak, dresni, navadna zvezdica, njivska gorjušica, bela gorjušica, bršljanastolistni jetičnik, perzijski jetičnik.</i> Sredstvo <u>zaviralno deluje:</u> <i>pasje zelišče in njivski slak.</i> <u>Ne zatira ozkolistnega plevela.</u>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ARIGO * (dodajanje močila)	330 g/ha Poraba vode: 200 – 400 l/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Učinkovito zatira:</u> <i>baržunasti oslez; bela metlika; breskova dresen; bršljanastolistni jetičnik; drobnocvetni rogovilček; enoletna latovka; enoletni ozkolistni plevel; gluhi oves; kamilice; mehka krvomočnica; močvirski čišljak; navadna kostreba; navadna loboda; navadna rosnica; navadna sončnica; navadna zvezdica; navadni grint; navadni kristavec; navadni osat; navadni pelin; navadni plešec; navadni zebrat; njivska gorjušica; njivska pasja kamilica; njivska spominčica; njivska škrbinka; njivska vijolica; njivski čišljak; njivski mošnjak;</i> <u>Zaviralno deluje:</u> <i>njivski osat; oljna ogrščica; pasje zelišče; plazeča pirnica; plezajoča lakota; proso; ptičja dresen; srakonja; srhkodlakavi ščir; ščavjelistna dresen; širokolistni plevel; škrlatnordeča mrtva kopriva; večletni ozkolistni plevel; vejicati rogovilček; velika kopriva; vodna dresen; vretenčasti muhvič; zeleni muhvič</i>	
BANDERA *	1,0 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Zatira:</u> <i>njivski lisičji rep, navadna kostreba, enoletna latovka, ter naslednje širokolistne pleveli: srhkodlakavi ščir, navadna zvezdica, njivska vijolica, navadna ambrozija, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica in navadni slakovec.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>zelenim muhvičem, njivskim mošnjakom, belo metliko in pritlično krvomočnico.</i> <u>omejeno deluje na:</u> <i>ptičjo dresen in pasje zelišče</i>	
BANVEL 480 S *	0,6 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2-8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Zatira:</u> <i>navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen, plotni slak, osat, slak in kislica</i>	Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze! Mešanje sredstva Banvel 480 S z drugimi pripravki ni predvideno. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
BASAGRAN *	1,5 – 2 L/ha	od 1 - 5 lista (BBCH 11 - 15)	<u>Dobro zatira:</u> <i>njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico.</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto.</i> <u>Ne zatira:</u> <i>poljskega maka in jetičnika.</i>	Dovoljen na koruzi za seme!

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
BASAGRAN 480 *	1,5 – 2 L/ha	od 1 - 5 lista (BBCH 11-15)	<p><u>dobro zatira:</u> <i>njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico.</i></p> <p><u>Slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto.</i></p> <p><u>Ne zatira :</u> <i>poljskega maka in jetičnika.</i></p>	
CALARIS PRO *	a) 2,0-2,3 L/ha b) 2,3 L/ha	pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14)	<p>a) <u>dobro zatira:</u> <i>baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, navadni oslez, kamilice, enoletni golščec, navadni slakovec, breskova dresen, navadni tolščak, njivska gorjušica, pasje zelišče in bodič.</i></p> <p>b) <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>krvavordeča srakonja, navadna kostreba, divje proso, golo proso in muhviči.</i></p>	
CALLAM * (dodajanje močila)	300 g/ha	3 – 6 (BBCH 13-16)	<u>Zatiranje:</u> <i>goli ščir, navadni ščir, bela metlika, navadni kristavec, navadni oslez, njivska gorjušica in bodič</i>	
CALLISTO 480 SC (dodajanje močila)	a) 0,25 - 0,3 L/ha b) 0,15 - 0,25 L/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	a) po setvi in pred vznikom koruze in plevela (BBCH 0 – 7) b) po vzniku koruze do faze največ osem listov koruze v odmerku (BBCH 7 – 18)	<p><u>Dobro deluje:</u> <i>njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodic, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevne krompirja, navadni zebnat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec.</i></p> <p><u>Zavira plevela:</u> <i>njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu.</i></p> <p><u>Nezadovoljivo:</u> <i>njivski lisičji rep, muhviče, gluhi oves, stoklaso, navadni srakoperec, enoletno latovko in navadni oslez.</i></p>	
CAMBIO *	2 - 3 l/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	2 - 7 listov (BBCH 12 – 17)	<i>enoletni širokolistni plevel; večletni širokolistni plevel</i>	MEŠANJE: Za razširitev uporabe na zatiranje enoletnega travnega plevela se sredstvo lahko meša s herbicidi na osnovi nikosulfurona.

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
CAPRENO	0,3 L/ha poraba vode: 150 - 400 L/ha	2 – 6 listov (BBCH 12-16)	Učinkovito zatira: <i>belo metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, navadno kostrebo, zeleni muhvič, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir in prosa.</i> Zmanjšuje zapleveljenost: <i>enoletna latovka</i>	1x v rastni sezoni
CLIOPHAR 600 SL	0,16 do 0,2 L/ha	2 do 5 pravih listov (BBCH 12 do 15)	dobro zatira: <i>kamilice, njivsko pasjo kamilico, osate in bodiče.</i>	Optimalen čas tretiranja je, ko imajo pleveli razvite štiri liste. enkrat v eni rastni dobi
EFICA 960 EC	a) pred vznikom koruze - izven vodovarstvenih območij za: <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla v odmerku 1-1,2 L/ha (10-12 ml/100 m²); • srednje težka tla v odmerku 1,2-1,4 L/ha (12-14 ml/100 m²); • težka tla v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m²); b) po vzniku koruze za: <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla v odmerku 1-1,1 L/ha (10-11 ml/100 m²); • srednje težka tla v odmerku 1,1-1,2 L/ha (11-12 ml/100 m²); • težka tla v odmerku 1,2-1,3 L/ha (12-13 ml/100 m²). 		Zatira: <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček.</i> Srednje dobro zatira: <i>užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.</i>	
EQUIP	2 – 2,5 L/ha Poraba vode: 200 – 300 L/ha	2 – 6 listov (BBCH 12 – 16)	<i>njivski lisičji rep, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, ljulke, enoletna latovka, muhviči, baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, metlike, drobnocvetni rogovilček, koprive, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, divji sirek, njivski osat, njivski slak, plazeča pirnica</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
DUAL GOLD 960 EC *	a) izven VVO: <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla 1-1,2 l/ha; • srednje težka tla 1,2-1,4 l/ha; • težka tla 1,5 l/ha Poraba vode: 200 – 500 L/ha	a) pred vznikom koruze	<u>Zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček.</i> <u>Srednje dobro zatira:</u> <i>užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak</i>	Pred vznikom koruze in sirka uporaba tega sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena!
	b) Na VVO <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla 1-1,1 l/ha; • srednje težka tla 1,1-1,2 l/ha; • težka tla 1,2-1,3 l/ha Poraba vode: 150 – 250 L/ha	b) Po vzniku koruze		
DICASH *	0,6 L/ha poraba vode: 200-400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Zatira:</u> <i>navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen, navadni plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislica.</i>	1x v rastni dobi Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
ELUMIS *	1,5 L/ha	1 – 8 listov (BBCH 11 – 18)	<u>Dobro zatira:</u> <i>krvavordeča srakonja, navadna kostreba, gluhi oves, enoletna latovka, muhviči, divji sirek, proso, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebrat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice, njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec.</i> <u>Zaviralno deluje:</u> <i>njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu</i>	
ENTAIL *	170 ml/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 5 listov (BBCH 13 – 15)	<u>Dobro zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec</i> <u>Zadovoljivo zatira:</u> <i>enoletno latovko, navadni zebrat, njivsko vijolico;</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, pasje zelišče, belo metliko, ščavjelistno dresen, breskovo dresen in zeleni muhvič</i>	Sredstva se ne sme nanašati na rastline, ki so bile predhodno tretirane z organofosfatnimi insekticidi.

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ESTERON	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	4 – 6 listov (BBCH 14 – 16)	<i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec, bela metlika, njivski osat, navadni osat, njivski slak, navadna rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče in perzijski jetičnik</i>	
FRONTIER X2 *	1,0-1,4 L/ha	pred setvijo z inkorporacijo v globino do 5 cm ali po setvi pred vznikom plevela (BBCH 0 – 7)	<u>Učinkovito zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, lasasto proso, zeleni muhvič, malo srakonjo, sivozelene muhvič, divji sirek iz semena</i> <u>Dobro deluje na:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna rosnica, plezajoča lakota, kamilice, njivska spominčica, breskova dresen in pasje zelišče</i>	MEŠANJE: FRONTIER X2 se lahko meša s sredstvi na osnovi pendimetalina, izoksaflutola, mezatrina, bentazona, dikambe, nikosulfurona in kloridazona. Mešanje je dovoljeno tudi z listnimi gnojili.
FOCUS ULTRA	a) 2 L/ha ali b) 1 L/ha z dodatkom 1 L/ha močila DASH HC	2 do 9 pravih listov (BBCH 12-19)	<i>enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit</i>	Za koruzo, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksimid.
	c) 4 L/ha ali d) 2 L/ha z dodatkom 2 L/ha močila DASH HC		<i>večletnega ozkolistnega plevela</i>	
HARMONY 50 SX (dodajanje močila)	22,5 h/ga Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Občutljivi pleveli:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, navadni zebnat, prava kamilica, nedišča trirobka, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, njivska redkev, kislica, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in oljna ogrščica.</i> <u>Manj občutljivi pleveli:</u> <i>navadni slakovec, njivska vijolica, perzijski jetičnik in njivski slak.</i>	
KAMBA 480 SL *	0,6 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Zatira:</u> <i>kurjo češnjico, ščire, dresni in metlike, plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislice</i>	Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti. Pri njivskem slaku je optimalen čas zatiranja, ko so poganjki dolgi 5-15 cm, pri njivskem osatu pa, ko ima le-ta 4-6 listov. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
KALIMBA	0,6 L/ha	od 2 do 8 listov (BBCH 12-18)	<i>kurjo češnjico, ščire, dresni in metlike, ter plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislice</i>	Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
KELVIN *	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 8 razvitih listov (BBCH 13 – 18)	<u>Dobro zatira:</u> <i>pirnica, divji sirek, kostreba in muhvič, navadno kostrebo, muhvič, kamilice, ščire in navadno rosnico.</i> <u>Sredstvo slabše zatira:</u> <i>navadno pirnico, divji sirek, škrbinko, breskovo dresen in srakonjo</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
KELVIN OD *	1 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	4 - 7 listov (BBCH 14 - 17)	<u>Plevel</u> Občutljivi pleveli: <i>navadna kostreba, navadni zebnat, plezajoča lakota, kamilica in njivski mošnjak.</i> Manj občutljivi pleveli: <i>plazeča pirnica, bela metlika, ščavjelistna dresen in njivska vijolica.</i> Za izboljšanje delovanja na druge plevelce se sredstvu dodaja ustrezne, v ta namen registrirane herbicide.	
KELVIN MAX *	0,75 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletna latovka in angleške ljulke, srhkodlakavi ščir, navadne zvezdice, kamilic in pasjega zelišča</i> <u>Zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, bela metlika, navadni slakovec, breskova dresen</i>	V primeru propada posevka koruze se sme na površino, ki je bila tretirana s pripravkom KELVIN MAX, sejati le koruzo po predhodni obdelavi tal. Jeseni se sme po predhodni obdelavi tal sejati le ozimno pšenico, naslednjo pomlad pa le koruzo, prav tako po predhodni obdelavi tal.
KYLEO	3-5 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha.	pred setvijo	Sredstvo <u>dobro zatira:</u> - 3.0 L/ha: <i>samosevna ogrščica, enoletna latovka;</i> - 4.0 L/ha: <i>navadni plešec, metlika, njivski osat, njivski slak, obzidni dvoredec, trpotec, kopriva;</i> - 4.5 L/ha: <i>nacepljenolistna krvomočnica, ječmen, dresni, navadna zvezdica;</i> - 5.0 L/ha: <i>navadni rman, plazeča pirnica, kamilica in škrbinka.</i> Sredstvo <u>delno zatira:</u> <i>njivska preslica, jalova stoklasa, navadna šašulica, plezajoča lakota, gozdni slezenovec, ščavje, navadni regrat in detelja.</i>	
LAUDIS	1,15 - 2,25 L/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha.	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Dobro zatira:</u> <i>belo metliko, mnogosemensko metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, tridelni mrkač, navadno kostrebo, zeleni muhvič, enoletna latovka, ptičjo dresen, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir, njivski slak, divji sirek, plezajoča lakota, golo proso</i>	S sredstvom se lahko tretira tudi v deljenih odmerkih (split aplikacija), ki se izvede v presledku 7-14 dni. Pri obeh tretiranjih skupni odmerek ne sme preseči 2,25 L/ha, pri čemer posamezen odmerek ne sme preseči 1,5 L/ha. Priporoča se uporabo 1 L/ha za prvo tretiranje, ter 1,25 L/ha za drugo tretiranje.
LAUDIS WG 30 (dodajanje močila)	0,25 - 0,5 kg/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	Zelo dobro zatira: - 0,25 kg/ha: <i>navadni plešec, drobnocvetni rogovilček, škrlatnordečo mrtvo kopriv, njivsko gorjušico, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez in navadni kristavec,</i> - 0,375 kg/ha: <i>srhkodlakavi ščir, belo metliko, mnogosemensko metliko, navadno lobodo, navadni pelin, plezajoča lakoto, breskovo dresen, ščavjelistno dresen in navadno kostrebo,</i> <u>Zatira:</u> 0,5 kg/ha: <i>njivsko vijolico in muhvič</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
LONTREL 100 *	1 do 1,2 L/ha Poraba vode: 200 – 300 L/ha	2 - 5 listov (BBCH 12 - 15)	<i>bodice, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov</i>	
LONTREL 72SG	0,17 kg/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 - 9 listov (BBCH 12 - 19)	<u>dobro zatira:</u> <i>bodič, pravo kamilico, nedišečo tñirobko, druge vrste kamilic), njivsko pasjo kamilico, njivski osat) in druge vrste osatov.</i> <u>slabše deluje na osate</u>	S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Rastlinski material, tretiran s sredstvom LONTREL 72SG, se ne sme uporabljati za kompostiranje in se ga ne sme mulčiti. Gnoja živali, ki se hranijo s pridelki tretiranimi s sredstvom LONTREL 72SG, se ne sme uporabljati za kompostiranje.
LUMAX *	a) izven VVO: • na lahkih peščenih tleh 3,25-3,5 L/ha; • na srednje težkih tleh 3,5 – 3,75 L/ha; • na težkih tleh v odmerku 3,75 - 4 L/ha b) 3– 4 L/ha, nižji odmerek se uporablja na lahkih tleh	a) pred vznikom b) zgodaj po vzniku (koruza največ 4 liste)	<i>enoletni ozkolistni plevel; enoletni širokolistni plevel</i>	Pred vznikom uporaba tega sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena.
LUMAX H 537.5 SE	3-4 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	4 liste (BBCH 14)	<u>Zatira</u> v odmerku 3,0 L/ha: <i>baržunasti oslez, ščire, navadno ambrozijo, ogrščico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadni čapljevec, drobnocvetni rogovilček, plezajočo lakoto, mrtve koprive, breskovo dresen, njivsko gorjušico, pasje zelišče in navadno zvezdico.</i> <u>Zatira</u> v odmerku 4,0 L/ha (poleg zgoraj navedenih): <i>njivski slak, kamilice, poljski mak, navadni slakovec, ptičjo dresen, navadni tolščak, navadni bodič, njivski mošnjak, jetičnike ter vijolice, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo ter golo proso in navadno proso.</i> Za učinkovitejše zatiranje <i>ptičje dresni</i> se priporoča tretiranje pred vznikom korusze. Za učinkovitejše zatiranje <i>navadnega tolščaka</i> se priporoča tretiranje takoj po vzniku korusze. Za učinkovitejše zatiranje <i>sivozelenega muhviča</i> se priporoča tretiranje pred vznikom korusze. <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> v odmerku 4,0 L/ha: <i>plazeče pirnice in muhvičev.</i> <i>Zelo slabo zatira divji sirek.</i>	Sredstvo se uporablja v korusi za zrnje in silažo. Nižji odmerek se lahko uporablja na lahkih tleh in za plevela kot je navedeno v nadaljevanju. Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in brez skorje

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
MERLIN FLEXX	a) 0,3 L/ha	a) pred vznikom koruze (BBCH 00 – 07)	<p><u>Dobro zatira:</u> <i>baržunasti oslez, belo metliko, pasje zelišče, divji sirek in ščavjelistno dresen.</i></p> <p><u>Slabše zatira:</u> <i>ščire, ptičjo dresen, breskovo dresen, muhviče, navadno kostrebo in mrtve koprive</i></p>	
	b) 0,4 L / ha	b) po vzniku koruze do 2-3 listov (BBCH 09-13)		
	Poraba vode: 200 - 400 L/ha			
MILAGRO EXTRA 6 OD *	0,75 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<p><u>za zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča;</i></p> <p><u>za zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo.</i></p>	
MILAGRO 240 SC *	170 ml/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 5listov (BBCH 13 – 15)	<p><u>dobro zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec</i></p> <p><u>zadovoljivo zatira:</u> <i>enoletno latovko, navadni zebrat, njivsko vijolico;</i></p> <p><u>slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, pasje zelišče, belo metliko, ščavjelistno dresen, breskovo dresen in zeleni muhvič</i></p>	
MOTIVELL *	1 L/ha Poraba vode: 150 - 250 L/ha	3 - 6 listov (BBCH 13 – 16)	<p><u>zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in ljulk, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice in kamilic;</i></p> <p><u>zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, breskovo dresen, navadnim slakovcem in pasjim zeliščem</i></p>	
MONSOON ACTIVE	a) 1,5 L/ha ali b) deljenem odmerku dva krat po 0,75 L/ha, ter c) za zatiranje divjega sirka: 2,0 L/ha ali v d) deljenem odmerku dva krat po 1,0 L/ha. Poraba vode: 200 do 400 L/ha	2 do 6 listov (BBCH 12-16)	<p><u>Sredstvo učinkovito zatira</u> (>86% učinkovitost): krvavordeča srakonja, navadna kostreba, enoletna latovka, muhviči in divji sirek; baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, navadna loboda, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, prava kamilica, dresni, navadni grint, laški bodič in hrapava škrbinka</p> <p><u>Sredstvo zadovoljivo zatira</u> (70-85 % učinkovitost): njivski osat</p> <p><u>Sredstvo delno zatira</u> (<70 % učinkovitost): mala srakonja, njivski slak, navadna rosnica in perzijski jetičnik</p>	
MOTIVELL EXTRA 6 OD *	0,75 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<p><u>za zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča;</i></p> <p><u>za zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo.</i></p>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
MURAL	0,6 - 0,75 L/ha Poraba vode: 200 do 400 L/ha	2 – 5 listov (BBCH 12 – 15)	<u>Zatira</u> v odmerku 0,6 L/ha: <i>srhkodlakavi ščir, bela metlika, mnogosemenska metlika, plezajoča lakota, navadni slakovec, breskova dresen, ščavjelistna dresen, navadna ambrozija, izrodna metlika.</i> <u>Zatira</u> v odmerku 0,75 L/ha: <i>baržunasti oslez, navadni plešec, navadni kristavec, drobnocvetni rogoviček, navadni oslez, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, njivski osat, njivski slak.</i> Slabo zatira v odmerku 0,75 L/ha: <i>ptičja dresen.</i>	V koruzi za zrnje in silažo.
MUSTANG 306 SE	0,5 do 0,6 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	4 – 5 listov (BBCH 14 – 15)	<i>metlike, dresni, navadna zvezdica, navadna kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija, perzijskim jetičnikom, njivski osat, njivski slak</i>	
NAGANO	0,5 - 1,0 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 (BBCH 12-18)	<u>Dobro zatira</u> : <i>srhkodlakavi ščir, navadno ambrozijo, belo metliko, njivski slak, navadni kristavec, navadni oslez, nedišečo trirobko, enoletni golšec, breskovo dresen, navadni slakovec, pasje zelišče in navadno zvezdico.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> : <i>navadno kostrebo.</i> <u>Zatira</u> : <i>srhkodlakavi ščir.</i>	
NICOSH *	1 L/ha	3 – 5 listov (BBCH 13 – 15)	<u>Dobro zatira</u> : <i>škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, njivski mošnjak, navadni plešec, njivsko škrbinko, kamilico, gluhi oves, plezajoča lakota, divji sirek, baržunasti oslez, ščavjelistno dresen, navadni oslez, srhkodlakavi ščir; breskovo dresen, navadno zvezdico, enoletno latovko, navadno kostrebo in krvavordečo srakonjo;</i> <u>Slabše zatira</u> : <i>belo metliko, pasje zelišče, navadni slakovec, ptičjo dresen, plazečo pirnico, navadno lobodo, sivozeleni muhvič, perzijski jetičnik in njivski slak</i>	
NIKITA (dodatek močila)	0,45 kg/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 9 listov (BBCH 12-19)	<u>Dobro zatira</u> : <i>baržunasti oslez, srhkodlakavi ščir, navadno ambrozijo, belo metliko, izrodno metliko, navadni kristavec, enoletni golšec, breskovo dresen, ptičjo dresen, njivsko gorjušico, pasje zelišče, enoletni čišljak, navadno zvezdico, njivski mošnjak in njivsko vijolico.</i> <u>Delno zatira</u> : <i>navadni slakovec, krvomočnico, navadno kostrebo, muhvič, njivski slak, njivski osat in divji sirek</i>	
OSORNO	1,5 L/ha Poraba vode: 300 L/ha.	2 do 8 listov (BBCH 12 do 18).	<i>navadne kostrebe, njivska vijolica, plezajoča lakota in navadni slakovec</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
PEAK 75 WG (dodajanje močila)	20-30 g/ha	po vzniku – 7 listov (BBCH 09 – 17)	<i>enoletni širokolistni plevel; kislice; njivski osat</i>	
PRIMERO *	1,0 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L / ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Zatira:</u> <i>njivski lisičji rep, navadna kostreba, enoletna latovka, ter naslednje širokolistne pleveli: srhkodlakavi ščir, navadna zvezdica, njivska vijolica, navadna ambrozija, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica in navadni slakovci.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>zelenim muhvičem, njivskim mošnjakom, belo metliko in pritlično krvomočnico.</i> <u>Omejeno deluje na:</u> <i>ptičjo dresen in pasje zelišče</i>	
ROUNDUP POWERMAX	1 kg/ha Poraba vode: 150 – 200 L / ha		<u>Zatira:</u> <i>bela metlika, bela plazeča detelja, čužka, dvoletni dimek, enoletna latovka, enoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel, jalova stoklasa, nacepljenolistna krvomočnica, navadna kislica, navadna zvezdica, navadni ječmen, navadni osat, navadni pelin, navadni regrat, navadni rman, njivska škrbinka, njivska vijolica, njivska zavrtnica, njivski lisičji rep, njivski osat, orjaška šopulja, ozkolistni plevel, ozkolistno ciprje, pisana čužka, plazeča pirnica, poljski mak, prava kamilica, robide, širokolistni plevel, topolistna kislica, večletni ozkolistni plevel večletni širokolistni plevel</i> <u>Ne zatira:</u> <i>njivske preslice</i>	7 do 10 dni pred setvijo! S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Ne sme se tretirati v kolikor se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine. Ne sme se uporabljati v vročem, vetrovnem in meglenem vremenu. Sredstvo se mora uporabljati pri temperaturah zraka do 25 °C.
SAMSON 4 SC *	1 L/ha Poraba vode: 150 – 250 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in ljulk, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice in kamilic;</i> <u>zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, breskovo dresen, navadnim slakovcem in pasjim zeliščem</i>	
SAMSON EXTRA 6 OD *	0,75 L / ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>za zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča, plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
SHARPEN 40 SC	2,5-4 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	<u>Zatira: lisičji rep, srakoperec, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozelena muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti širokolistne plevele: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica.</u> Slabo zatira: slak in njivska preslica	Dovoljeni na koruzi za zrnje!
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC *	a) pred vznikom koruze – izven vodovarstvenih območij: • lahka in srednje težka tla 4-4,25 L/ha; • težka tla 4,25-4,5 L/ha. Mešanica s pripravkom Callisto 480 SC: • lahka peščena tla 2,5-2,75 L/ha + 250-300 ml Callista 480 SC; • srednje težka tla 2,75-3,1 L/ha + 200-250 ml Callista 480 SC; • težka tla v odmerku 3,1-3,4 L/ha + 200-250 ml Callista 480 SC. b) po vzniku koruze: • lahka in srednje težka tla 4-4,25 L/ha; • težka tla 4,25-4,5 L/ha. Mešanica s pripravkom Callisto 480 SC (priporočljivo je dodati še močilo): • lahka peščena tla v odmerku 2,3-2,6 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC; • srednje težka tla 2,6-2,9 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC; • težka tla 2,9-3 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC	a) pred setvijo z zadelavo s predsetvenikom na globino 5 cm (največ 14 dni pred setvijo): primerno predvsem za območja, kjer se pričakuje sušno obdobje na začetku razvoja koruze ali po setvi, pred vznikom plevela in koruze b) po vzniku plevela in koruze.	<i>lisičji rep, ščire, njivsko kurjo češnjico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, malo srakonjo, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, navadno rosnico, navadni zebnat, drobnocvetni rogovilček, mrtve koprive, kamilice, proso, ptičjo dresen, breskovo dresen, navadni tolščak, njivsko redkev, muhviče, navadni grint, gorjušice), pasje zelišče, čišljake, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, grašice, divjo vijolico, baržunasti oslez, navadna ambrozija, lobode, ostrice, mlečke, plezajočo lakoto, madronščice, navadni slezenovec, trpotce, škrbinke, pisani sirek in divji sirek</i>	Pred vznikom koruze uporaba sredstva Primextra TZ Gold 500 SC na vodovarstvenih območjih ni dovoljena.

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
SHARPEN 33 EC	3-5 L/ha	pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	<u>Zatira:</u> <i>lisičji rep, srakoperec, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti širokolistne plevele: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica.</i> <u>Slabo zatira:</u> <i>slak in njivska preslica</i>	Dovoljeno v koruzi za pridelavo semena!
SPANDIS	0,4 kg/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Dobro deluje:</u> <i>baržunasti oslez, ščiri, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, drobnocvetni rogovilček, navadni oslez, kamilice, enoletni golšec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska gorjušica, njivska škrbinka, navadna zvezdica, njivski mošnjak in navadni bodič, proso.</i> <u>Dobro deluje:</u> <i>pelinolistna ambrozija, navadni plotni slak, njivski osat, plezajoča lakota, mrtve koprive in vijolice, navadna kostreba, plazeča pirnica, enoletna latovka, zeleni muhvič, sivozeleni muhvič in divji sirek.</i> <u>Deluje:</u> <i>njivni lisičji rep, njivski slak, ptičja dresen, navadni tolščak in pasje zelišče.</i> <u>Slabo deluje:</u> <i>srakonjo</i> <u>Ne deluje:</u> <i>perzijski jetičnik.</i>	
STARANE FORTE	0,54 L/ha poraba vode: 200-400 L/ha	2 - 6 listov (BBCH 12-16)	<u>Zatira:</u> <i>plezajočo lakoto, navadno zvezdico, breskovo dresen, drobnocvetni rogovilček in njivski slak;</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>navadni plotni slak</i>	Pri temperaturah zraka pod 15 °C se priporoča uporabo močila.
STOMP AQUA	3,3 L/ha Poraba vode: 100 – 200 L/ha	Od vznika do 4 listov (BBCH 10 – 14)	<u>Dobro zatira:</u> <i>enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno ogrščico.</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico</i>	Sredstva se ne sme zadelati (inkorporirati) v tla.
SUCCESSOR 600 *	2 L/ha	Od vznika – 4 listov (BBCH 10 – 14)	<u>Zatira:</u> <i>bela metlika; breskova dresen; drobnocvetni rogovilček; enoletna latovka; kamilice; muhvič; navadna kostreba; ozkolistni plevel; pasje zelišče; srhkodlakavi ščir; širokolistni plevel</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
TALISMAN	1,125 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Odlično zatira:</u> <i>srhodlakavi ščir, mnogosemenska metlika, navadni plešec, zeleni muhvič, navadna kostreba, divji sirek</i> <u>Zatira:</u> <i>navadni kristavec, škrlatnordeča mrtva kopriva, bela metlika, navadni oslez, breskova dresen, krvava srakonja, divji sirek.</i> <u>Zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>prava kamilica, njivska vijolica, ptičja dresen, veliki trpotec.</i>	V koruzi za zrnje in silažo. Sredstva se ne sme uporabljati, ko so 6 ur po tretiranju napovedane padavine.
TAROT 25 WG * (dodajanje močila)	50 – 60 g/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<i>navadna zvezdica, srhodlakavi ščir, baržunasti oslez, divji sirek in plazeča pirnica</i>	
TANDUS 200 EC	1 L/ha Poraba vode: 200-300 L/ha	3 do 6 listov (BBCH 13 – 16)	<i>navadna zvezdica, poljski mak, bršljanolistni jetičnik, plezajoča lakota, navadni plešec, perzijski jetičnik, škrlatnordeča mrtva kopriva, njivska spominčica, navadni slakovec, njivska mrtva kopriva, navadna rosnica, navadni grint, kamilica, njivska gorjušica, njivski mošnjak, njivska kurja češnjica in njivska redkev</i>	Sredstvo dovoljeno za uporabo v koruzi za silažo!
TEMSA SC	1,5 L/ha Poraba vode: 300 L/ha	2 do 8 listov (BBCH 12 do 18)	<i>navadne kostrebe, njivska vijolica, plezajoča lakota in navadni slakovec</i>	

Pripravke, ki so označeni z * ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) in v ukrepu POS_FFSV.

Pripravila:
Karmen Rodič, univ.dipl.ing.agr.
 Služba za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto