

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 25

Datum: 23. junij 2017

OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Plodovi jablan in hrušk dosegajo polovico končne velikosti (75 po lestvici BBCH).

Redno varstvo pred *jablanovim škrlupom* izvajajte s preventivnimi sredstvi kot so: **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCLIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha), **DITHANE DG Neotec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha; le jablana), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha; le jablana), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha; le jablana), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha; le jablana), **ANTRACOL** (0,2 % konc.), **ANTRACOL WG 70** (0,2 % konc.), **THIRAM 80 WG** (3 kg/ha), **DELAN 700WG** (0,75 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **CURATIO – ŽVEPLENOAPNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; dovoljenje za izredne primere velja do 01.07.2017) ali **VITISAN** (2,5 kg/ha na meter višine krošnje).

V primeru neurja s točo je potrebno opraviti zaščito poškodovane listne površine in lesa. Varstvo nasadov naj temelji na sredstvih z aktivno snovjo kaptan: **MERPAN 80 WDG**, **ORTHOCLIDE 80 WG** ali **SCAB 480 SC**, **SCAB 80 WG**. V nasadih pečkatega sadja, kjer ni pridelka, se lahko izjemoma za razkuževanje ran uporabi tudi **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (v 0,06% konc.; le v primeru popolnega uničenja pridelka in spravilo pridelka ni predvideno za prehrano, predelavo ali krmo). Vroče vreme s sončno pripeko pozitivno vpliva na uspešno celjenje ran.

Aktualne vremenske razmere so ugodne za razvoj in širjenje različnih povzročiteljev *listnih pegavosti*. Priporočamo uporabo pripravka **MYCO-SIN** (12-15 kg/ha) kateremu potencirate delovanje z dodajanjem **ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV** (3-5 kg/ha) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha/ meter višine krošnje; dovoljenje za nujne primere varstva rastlin velja do 01.07.2017). Na glivo *Marssonina coronaria* je zlasti občutljiva sorta 'Topaz', med tem, ko se *Colletotrichum* sp. najbolj izraža na sorti 'Zlati delišes' in njegovih križancih (npr. 'Goldrush'). Tovrstne bolezni vodijo v prezgodnje odpadanje listja, kar v nasadih ob letos dodanem izostanku pridelka povzroči neravnovesje v razvoju dreves. Za zagotavljanje zdravega listja je uporaben še **VITISAN** (2,5 kg/ha na meter višine krošnje). Vsa navedena sredstva so primerna tudi v ekološki pridelavi.

Proti *jablanovi pepelovki* je tehtno dodajanje **SREDSTEV NA OSNOVI ŽVEPLA**, ki delujejo zaviralno tudi na razvoj *pršic*. Okužene poganjke iz nasada **odstranjajte tudi ročno**.

Nasade napadene z *rdečo sadno* in *navadno pršico* zaščitite s pripravki kot so: **VERTIMEC PRO** (125 l/ha; tudi proti jablanovi rjasti pršici), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha/ 1 m višine krošnje), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha), **KOROMITE** (0,625 l/ha), **MASAI** (0,5 kg/ha). Prvi deluje tudi proti *jablanovi rjasti pršici*.

V nasadih s pridelkom je v 14 dneh po prvem tretiranju proti *jabolčnemu zavijaču* smiselno zaščito ponoviti s pripravkom **CORAGEN** (27 ml/ha), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha) ali **IMIDAN** (1 kg/ha). Če so nasadi napadeni tudi z *listnimi ušmi*, uporabite **MOSPILAN 20 SG** (0,04 % konc.), **MOSPILAN SG** (0,04 % konc.), **MOKSYCAN 20 SC** (0,04 % konc.) ali **CALYPSO** (0,3 l/ha).

Razmike med tretiranjmi prilagodite vremenskim razmeram, na 10-14 dni. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti v primeru 30 ali več mm padavin na /m².

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.



MKGP-UVHVV

KGZS-Zavod Novo mesto

OBVESTILO ZA VARSTVO ČEŠENJ

Nasadi češenj so v poletnem času ob občasnih nevihtah pogosto podvrženi okužbam z *listnimi pegavostmi* in *luknjičavostjo koščičarjev*. Poškodbe listov lahko vodijo v prezgodnjo defoliacijo in posledično tudi slabše sezonsko zaključevanje razvoja dreves. Po spravi pridelka je nasade v ta namen priporočljivo zaščititi s pripravkom **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

