



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90
e-mail: jerne.j.martincic@gov.si
www.kmetijskizavod-nm.si

REDČENJE GROZDJA

V sedanjem času ima ampelotehnični ukrep redčenje grozdja v vinogradniški praksi vse večji pomen. Kakovosti samega pridelanega grozdja ne moremo več prepustiti naključju. Tako v vinogradništvu in vinarstvu, kakor tudi v drugih kmetijskih dejavnostih npr. sadjarstvu, še bolj pa vrtnarstvu, kakovost počasi pridobiva tisto pomembno mesto pred pridelano količino. Sam ukrep redčenja grozdja ni nov. Pri tem ukrepu odstranimo posamezne grozde, če je nastavek na mladiko ali na trs prevelik. S pravočasnim redčenjem zgornjih grozdov na mladiki in grozdov v notranjosti trte ter na slabih mladikah navadno ne zmanjšamo pridelka, ker se poveča masa drugih grozdov. S strokovno pravilnim redčenjem grozdja dosežemo, da se pridelek ne zmanjša, izboljša se pa njegova kakovost. V letih, ko se je vino relativno lažje prodajalo, se ta ukrep ni izvajal, razen redkih izjem. Predvsem tisti vinogradniki, ki so si svojo mesto na trgu vina gradili dlje časa, so si s pomočjo tega ukrepa pomagali dvigati kakovost pridelanemu grozdju in kasneje vinu. Zaradi velikega rodnostnega potenciala novih selekcij, visoke kakovosti sadilnega materiala, boljšega zdravstvenega stanja v vinogradih, dobre oskrbe in založenosti tal s hranili, je velikokrat, kljub manjši obremenitvi trsa pri rezi-predvsem enošparonski vzgojni obliki, nastavek grozdja še vedno preobilan. Regulacija pridelka tako dobi svoj smisel in mesto, če so cilji vinogradnika sledeči: dolgotrajnejše izkoriščanja trsa, prizadevanje za večjo kakovost in upoštevanje zakonskih omejitev 3kg/trto oziroma 8000l/ha kakovostnega ali vrhunskega vina ZGP.

MLAD VINOGRAD:

Najpomembnejše je redčenje pridelka na mladih trsih, da se lahko ti enakomerno in dobro razvijejo in ukoreninijo. Grozdje že lahko odstranjujemo sočasno z zelenimi deli. Za samo zagotovitev kakovosti, moramo še bolj natančno odstraniti grozdje pri močno rastočih in zelo rodni sortah na globokih tleh in pri prevelikem nastavku. Ob raznih stresnih dogodkih, predvsem mislimo tu na sušo, tako omogočimo mladim trsom razvoj in razrast tudi v manj ugodnih pogojih rasti. Ob preobremenitvi trsov je sama rast mladik slabša in trte postanejo hirave ter tako začnejo počasi propadati. V drugem letu priporočamo, da odstranimo ves pridelek, v tretjem pa ob zadostni količini padavin, pustimo po en grozd na mladiko in tako odstranimo zgornje in slabše razvite grozde. Naša investicija v življenjsko dobo vinograda bo tako še bolj prišla do izraza v letu močnega nastavka, pri zelo rodni sortah, predvsem pa pri sortah z velikimi grozdi in pri zgodnejši suši.

RODNI VINOGRADI:

V rodni vinogradih, ki so starejših od 5 let je redčenje grozdja odvisno od bujnosti rasti, števila odgnanih rodni mladik na trs, od nastavka, ki je odvisen od posamezne sorte in od posameznega letnika, dobre ali slabe oplodnje, listne mase in razpoložljive vode.

Ob dobro opravljeni rezi, pravočasni pletvi mladik, je običajno v vinogradu ukrep potrebno izvajati le delno kot korekcijo nastavka pridelka. Zgodnje redčenje grozdov (sredi julija) lahko še vpliva na izboljšanje rasti razmer, saj se tako v vinogradih z optimalno rastjo pridelek v glavnem poveča zaradi večje mase jagod in tudi grozdov. Če odstranimo po en grozd z mladike, je izravnava pridelka še posebno izrazita, če opravimo redčenje bolj zgodaj.

V kolikor grozdja nismo razredčili v celoti, sploh zaradi velikega tveganja zaradi vremenskih ujm in toč, lahko to naredimo še enkrat ali naredimo dopolnilno redčenje v začetku dozorevanja, ko odstranimo slabše razvito grozdje in grozde, ki slabo zorijo.

Najbolj je potrebno redčiti pridelek na trsih, kjer se začetek dozorevanja zavleče, kjer so posajene močno rodne sorte z velikimi grozdi, pri preveliki gostoti odgnanih mladik (pomanjkljiva, nepravilna pletev, rez), ter v primeru velike in dolgotrajne suše. Kadar imamo opravka z veliko sušo, lahko redčenje opravimo tudi že v sredini julija, še preden spodnji listi porumenijo in mladike prisilno dozoriijo.

Določitev zrelosti grozdja omogoča vinogradnikom in vinarjem časovno načrtovanje trgatve. Vsak vinogradnik se mora zavedati, da opravi trgatve takrat, ko je sestava grozdja najbolj primerna za določen tehnološki postopek. Zdravo in tehnološko zrelo grozdje je namreč nujno za pridobitev kakovostnega vina. V tem trenutku je še čas, da z redčenjem grozdja razbremenimo trse in tudi na ta način prispevamo k boljši kakovosti preostalega grozdja.

Pri redčenju grozdja mora boljša kakovost pokriti stroške manjšega pridelka, zato pri tem ukrepu vedno poiščimo ustrezno razmerje med pridelkom in kakovostjo grozdja ter finančnim učinkom, ki ga bo to opravilo imelo.

Jernej Martinčič, univ.dipl.ing.kmet.