

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 08.

Datum: 30. maj 2018

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta cveti (61-67 po lestvici BBCH).

Tveganje za okužbe s *peronosporo vinske trte* je veliko. Za varstvo priporočamo pripravke s kombiniranim delovanjem kot so: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Možna je tudi raba sredstev na osnovi Al-fosetil: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), ki jih je potrebno uporabiti 3× zaporedoma v razmiku 7-10 dni. Slednja dva delujeta le preventivno.

V primeru neurja s točo varstvo vinske trte s fungicidi opravite čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet (Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F). Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev **tudi bakrovi pripravki**.

Razmike med tretiranjmi v tem obdobju prilagodite intenzivnosti padavin (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 10 dni.

Z dodajanjem **ŽVEPLOVIH PRIPRAVKOV** v odmerku 5 do 8 kg/ha zmanjšujete možnost pojavov *oidija* ter *pršic trsne kodravosti (akarinoze)* in *trsne pršice (erinoze)*.

Proti *oidiju vinske trte* priporočamo pripravke kot so **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 - 0,3 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,25 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha),...

Ameriški škržatek, ki je prenašalec *zlate trsne rumenice*, je v letošnjem letu pričel z izleganjem v 1. dekadi maja. Prve ličinke smo zabeležili 08.05.2018. O primernem času zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto