

Tehnološko navodilo 1/2020: rez češenj

V času napenjanja brstov je čas za gojitveno rez mladih dreves češnje, kjer še nimamo polnega volumna drevesa, pa tudi za rez rodnih dreves češenj, ki v predhodnem poletju niso bila porezana. Natančnejša navodila najdete na spodnji povezavi.

Rez dreves, pri katerih smo že zgradili želeni volumen, je sicer najbolje opraviti v drugi polovici julija ali v avgustu (poletna rez). Vendar, če drevesa poleti niso bila porezana, jih je v tem času priporočljivo vsaj deloma porezati. Pomemben učinek vsake rezi je osvetljevanje krošnje. Če osvetlitve s poletno rezjo nismo izvedli, jo je nujno izvesti sedaj. To dosežemo predvsem z izrezovanjem predebelih vej v vrhu in v zgornji polovici krošnje.

Natančnejša navodila za rez češnje lahko preberete v tehnoloških navodilih (1/2018) - rez češnje, na povezavi:

<https://lj.kgzs.si/sadjarstvo> ali <http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/sadjarstvo?page=1>

Pomembno je, da rez izvajamo v obdobju suhega vremena, ko tudi v naslednjih treh dni ni napovedanih padavin.

Po izvedeni rezi je drevesa priporočljivo zaščititi z enim od bakrovih pripravkov, ki imajo dovoljenje za ta namen (Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 35 WG in Badge WG). Tako se bodo rane bolje zacelile in manjša bo možnost okužb z različnimi boleznimi.

Priporočamo, da navodila za redno varstvo češenj in drugih sadnih rastlin spremljate na spletni strani Javne službe za varstvo rastlin, kjer sodelavci osmih ustanov objavljajo priporočila za vsako regijo posebej. Navodila so na povezavi: <http://agromet.mkgp.gov.si/pp/>