













HERBICIDI V KORUZI DOVOLJENI V LETU 2021

									
Pred vznikom 0	Pred vznikom 7	Vznik 10	En list 11	Dva lista 12	Trije listi 13	Štirje listi 14	Pet listov 15	Šest listov 16	7 in več listov 17-32
suho seme	koleoptila prodrla iz zrna	prvi list prodrl skozi koleoptilo	prvi list razgrnjen	drugi list razgrnjen	tretji list razgrnjen	četrti list razgrnjen	pet listov razgrnjenih	šest listov razgrnjenih	sedem in več listov razgrnjenih
CREDIT XTREME*									
FRONTIER X2*									
DUAL GOLD 960 EC*									
EFICA 960 EC									
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC*									
SHARPEN PLUS, SHARPEN 33 EC									
MERLIN FLEXX		MERLIN FLEXX							
ADENGO									
CALARIS PRO*									
LUMAX*									
LUMAX H 537.5 SE									
STOMP AQUA									
CALLISTO 480 SC		CALLISTO 480 SC							
SUCCESSOR 600*		SUCCESSOR 600*							
KOBAN TX*									
CAPRENO									
PEAK 75 WG									
BASAGRAN 480*									
STARANE FORTE									
ELUMIS*									
RIM 25 WG									
LONTREL 100*									
AKRIS*									
ALISEO PLUS*									
ARRAT*									
EQUIP									
MONSOON ACTIVE									
MURAL*									
ARIGO*									
BANDERA*									
BOTIGA									
DICASH*									
FOCUS ULTRA									
HARMONY 50 SX									
KALIMBA*									
KAMBA 480 SL*									
KELVIN MAX									
LAUDIS									
LAUDIS WG 30									
LONTREL 72SG*									
MILAGRO EXTRA 6 OD									
MILAGRO PLUS*									
MOTIVELL*									
MOTIVELL EXTRA 6 OD*									
OSORNO									
PRIMERO*									
SAMSON 4 SC*, SAMSON EXTRA 6 OD*									
SPANDIS*									
STRETCH									
TALISMAN									
TAROT 25 WG*									
TEMSA SC									
BANVEL 480 S*									
CALLAM*									

									
Pred vznikom 0	Pred vznikom 7	Vznik 10	En list 11	Dva lista 12	Trije listi 13	Štirje listi 14	Pet listov 15	Šest listov 16	7 in več listov 17-32
suho seme	koleoptila prodrla iz zrna	prvi list prodrl skozi koleoptilo	prvi list razgrnjen	drugi list razgrnjen	tretji list razgrnjen	četrti list razgrnjen	pet listov razgrnjenih	Šest listov razgrnjenih	sedem in več listov razgrnjenih
					ENTAIL *				
					HERBOCID XL				
					MILAGRO 240 SC *				
					NICOSH				
					KELVIN *				
					ESTERON				
					MUSTANG 306 SE				
					KELVIN OD *				
					RINIDI WG				

LASTNOSTI HERBICIDOV DOVOLJENIH ZA UPORABO V KORUZI V LETU 2020

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ADENGO	0,44 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L vode/ha	pred ali po vzniku koruze do faze 3 listov koruze (BBCH 00 - 13)	<u>Učinkovito zatira:</u> <i>navadno lobodo, navadni plešec, metliko, drobnocvetni rogovilček, kamilico, spominčico, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, pasje zelišče, navadno zvezdico, zeleni muhvič, gluhi oves, enoletno latovko, krvavo rdečo srakonjo, njivsko vijolico, navadni slakovec in navadno kostrebo</i>	MEŠANJE: Sredstvo Adengo se ne meša s sredstvi EC ali OD formulacije, s herbicidi, ki vsebujejo aktivne snovi v obliki estra, s tekočimi gnojili ali z močili.
AKRIS *	3 l/ha Poraba vode: 200 – 400 l/ha	2 – 6 listov (BBCH 12 – 16)	<u>Zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, laški muhvič, enoletno latovko, dresni, navadno lobodo, pasje zelišče, enoletni golšec, kamilico, belo metliko, mnogosemnsko metlika, njivsko vijolico, navadno zvezdico, navadni ščir in drobnocvetni rogovilček.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost s:</u> <i>pirnico, njivskim slakom in navadnim plotnim slakom</i>	
ALISEO PLUS * (dodajanje močila)	350-440 g/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ ha	2 - 6 listov (BBCH 12 - 16)	<u>Dobro zatira:</u> <i>ljulke, proso, enoletno latovko, navadni oves, muhviče in divji sirek; ščire, navadno lobodo, navadno ogrščico, navadni plešec, navadno rosnico, kamilice, slizek, navadni nefrolepsis, ščavjelistno dresen, breskovo dresen, njivsko redkev, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak in jetičnik, srakonje, kostrebo; belo metliko, mnogosemnsko metliko, njivsko vijolico</i> <u>Zadovoljivo zatira:</u> <i>pirnico; baržunasti oslez, navadni plotni slak, njivski osat, plezajočo lakoto, drobnocvetni rogovilček, veliki trpotec, ptičjo dresen, navadni slakovec, navadno solinko, pasje zelišče, škrbinke in bodič</i>	
ARRAT * (dodajanje močila)	0,2 kg/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	2 - 6 listov (BBCH 12 - 16)	<u>Dobro zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec, metlike, plezajoča lakota ali smolenec, kamilice, njivski mak, dresni, navadna zvezdica, njivska gorjušica, bela gorjušica, bršljanastolistni jetičnik, perzijski jetičnik.</i> Sredstvo <u>zaviralno deluje:</u> <i>pasje zelišče in njivski slak.</i> <u>Ne zatira ozkolistnega plevela.</u>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ARIGO * (dodajanje močila)	330 g/ha Poraba vode: 200 – 400 l/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<p><u>Učinkovito zatira:</u> <i>baržunasti oslez; bela metlika; breskova dresen; bršljanastolistni jetičnik; drobnocvetni rogovilček; enoletna latovka; enoletni ozkolistni plevel; gluhi oves; kamilice; mehka krvomočnica; močvirski čišljak; navadna kostreba; navadna loboda; navadna rosница; navadna sončnica; navadna zvezdica; navadni grint; navadni kristavec; navadni osat; navadni pelin; navadni plešec; navadni zebrat; njivska gorjušica; njivska pasja kamilica; njivska spominčica; njivska škrbinka; njivska vijolica; njivski čišljak; njivski mošnjak;</i></p> <p><u>Zaviralno deluje:</u> <i>njivski osat; oljna ogrščica; pasje zelišče; plazeča pirnica; plezajoča lakota; proso; ptičja dresen; srakonja; srhkodlakavi ščir; ščavjelistna dresen; širokolistni plevel; škrlatnordeča mrtva kopriva; večletni ozkolistni plevel; vejicati rogovilček; velika kopriva; vodna dresen; vretenčasti muhvič; zeleni muhvič</i></p>	
BANDERA *	1,0 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<p><u>Zatira:</u> <i>njivski lisičji rep, navadna kostreba, enoletna latovka, ter naslednje širokolistne plevel: srhkodlakavi ščir, navadna zvezdica, njivska vijolica, navadna ambrozija, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica in navadni slakovec.</i></p> <p><u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>zelenim muhvičem, njivskim mošnjakom, belo metliko in pritlično krvomočnico.</i></p> <p><u>omejeno deluje na:</u> <i>ptičjo dresen in pasje zelišče</i></p>	
BANVEL 480 S *	0,6 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2-8 listov (BBCH 12 - 18)	<p><u>Zatira:</u> <i>navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen, plotni slak, osat, slak in kislica</i></p>	<p>Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruze! Mešanje sredstva Banvel 480 S z drugimi pripravki ni predvideno. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.</p>

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
BASAGRAN 480 *	1,5 – 2 L/ha	od 1 - 5 lista (BBCH 11-15)	<u>dobro zatira:</u> <i>njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico.</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto.</i> <u>Ne zatira :</u> <i>poljskega maka in jetičnika.</i>	
BOTIGA	1 L/ha (ali v deljenem odmerku 2 x Poraba vode: 200 - 400 L/ha)	od 2 - 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Zatira:</u> <i>njivsko kurjo češnjico, samosevno oljno ogrščico, belo metliko, smokvasto metliko, plezajočo lakoto, njivsko mrtvo koprivo, škrlatnordečo mrtvo koprivo, dresni, plevele iz rodu razhudnikov, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike in njivsko vijolico.</i> <u>Omejuje:</u> <i>navadne kostrebe in navadnega osleza</i>	Dnevna temperatura zraka mora biti višja od 10 °C
CALARIS PRO *	a) 2,0-2,3 L/ha b) 2,3 L/ha	a) pred vznikom koruze b) po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14)	<u>dobro zatira:</u> <i>baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, navadni oslez, kamilice, enoletni golščec, navadni slakovec, breskova dresen, navadni tolščak, njivska gorjušica, pasje zelišče in bodič.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>krvavordeča srakonja, navadna kostreba, divje proso, golo proso in muhviči.</i>	
CALLAM * (dodajanje močila)	300 g/ha	3 – 6 (BBCH 13-16)	<u>Zatiranje:</u> <i>goli ščir, navadni ščir, bela metlika, navadni kristavec, navadni oslez, njivska gorjušica in bodič</i>	
CALLISTO 480 SC (dodajanje močila)	c) 0,25 - 0,3 L/ha d) 0,15 - 0,25 L/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	a) po setvi in pred vznikom koruze in plevela (BBCH 0 – 7) b) po vzniku koruze do faze največ osem listov koruze v odmerku (BBCH 7 – 18)	<u>Dobro deluje:</u> <i>njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodic, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevne krompirja, navadni zebnat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec.</i> <u>Zavira plevele:</u> <i>njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu.</i> <u>Nezadovoljivo:</u> <i>njivski lisičji rep, muhviče, gluhi oves, stoklaso, navadni srakoprec, enoletno latovko in navadni oslez.</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
CAPRENO* (dodajanje močila)	0,3 L/ha poraba vode: 150 - 400 L/ha (Potrebno je dodati močilo na osnovi repičnega olja)	2 – 6 listov (BBCH 12-16)	Učinkovito zatira: <i>belo metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, navadno kostrebo, zeleni muhvič, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir in prosa.</i> Zmanjšuje zapleveljenost: <i>enoletna latovka</i>	1x v rastni sezoni Fitotoksično za hibrid koruze Suzann.
CREDIT XTREME*	a) v predsetveni obdelavi tal: 1,33 – 4 L/ha (poraba vode 100 – 400 L) b) do 5 dni po setvi, pred vznikom posevka: 1,2 – 2 L/ha (poraba vode 100 – 400 L) c) na strniščih po spravi pridelka 1,33 - 4 L/ha (poraba vode 100 – 400 L)		Zatira: enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni plevel	1x v rastni dobi
EFICA 960 EC	a) pred vznikom koruze - izven vodovarstvenih območij za: • lahka peščena tla v odmerku 1-1,2 L/ha (10-12 ml/100 m ²); • srednje težka tla v odmerku 1,2-1,4 L/ha (12-14 ml/100 m ²); • težka tla v odmerku 1,5 L/ha (15 ml/100 m ²); b) po vzniku koruze za: • lahka peščena tla v odmerku 1-1,1 L/ha (10-11 ml/100 m ²); • srednje težka tla v odmerku 1,1-1,2 L/ha (11-12 ml/100 m ²); • težka tla v odmerku 1,2-1,3 L/ha (12-13 ml/100 m ²).		Zatira: <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo prosa, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček.</i> Srednje dobro zatira: <i>užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.</i>	
EQUIP	2 – 2,5 L/ha Poraba vode: 200 – 300 L/ha	2 – 6 listov (BBCH 12 – 16)	<i>njivski lisičji rep, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, ljulke, enoletna latovka, muhviči, baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, metlike, drobnocvetni rogovilček, koprive, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, divji sirek, njivski osat, njivski slak, plazeča pirnica</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
DUAL GOLD 960 EC *	a) izven VVO: <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla 1-1,2 l/ha; • srednje težka tla 1,2-1,4 l/ha; • težka tla 1,5 l/ha Poraba vode: 200 – 500 L/ha	a) pred vznikom koruze	<u>Zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilček.</i> <u>Srednje dobro zatira:</u> <i>užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak</i>	Pred vznikom koruze in sirka uporaba tega sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena!
	b) Na VVO <ul style="list-style-type: none"> • lahka peščena tla 1-1,1 l/ha; • srednje težka tla 1,1-1,2 l/ha; • težka tla 1,2-1,3 l/ha Poraba vode: 150 – 250 L/ha	b) Po vzniku koruze		
DICASH *	0,6 L/ha poraba vode: 200-400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Zatira:</u> <i>navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen, navadni plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislica.</i>	1x v rastni dobi Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
ELUMIS *	1,5 L/ha	1 – 8 listov (BBCH 11 – 18)	Dobro <u>zatira:</u> <i>krvavordeča srakonja, navadna kostreba, gluhi oves, enoletna latovka, muhviči, divji sirek, proso, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebkrat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice, njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec.</i> <u>Zaviralno deluje:</u> <i>njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu</i>	
ENTAIL *	170 ml/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 5 listov (BBCH 13 – 15)	Dobro <u>zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec</i> Zadovoljivo <u>zatira:</u> <i>enoletna latovka, navadni zebkrat, njivsko vijolico;</i> Slabše <u>zatira:</u> <i>navadni slakovec, pasje zelišče, belo metliko, ščavjelistno dresen, breskovo dresen in zeleni muhvič</i>	Sredstva se ne sme nanašati na rastline, ki so bile predhodno tretirane z organofosfatnimi insekticidi.

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
ESTERON	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	4 – 6 listov (BBCH 14 – 16)	<i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec, bela metlika, njivski osat, navadni osat, njivski slak, navadna rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče in perzijski jetičnik</i>	
FRONTIER X2 *	1,0-1,4 L/ha	pred setvijo z inkorporacijo v globino do 5 cm ali po setvi pred vznikom plevela (BBCH 0 – 7)	<u>Učinkovito zatira:</u> <i>navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, lasasto proso, zeleni muhvič, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, divji sirek iz semena</i> <u>Dobro deluje na:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna rosnica, plezajoča lakota, kamilice, njivska spominčica, breskova dresen in pasje zelišče</i>	MEŠANJE: FRONTIER X2 se lahko meša s sredstvi na osnovi pendimetalina, izoksaflutola, mezatrina, bentazona, dikambe, nikosulfurona in kloridazona. Mešanje je dovoljeno tudi z listnimi gnojili.
FOCUS ULTRA	a) 2 L/ha ali b) 1 L/ha z dodatkom 1 L/ha močila DASH HC	2 do 9 pravih listov (BBCH 12-19)	<i>enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit</i>	Za koruzo, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim. 1x v rastni sezoni.
	c) 4 L/ha ali d) 2 L/ha z dodatkom 2 L/ha močila DASH HC		<i>večletnega ozkolistnega plevela</i>	
HARMONY 50 SX (dodajanje močila)	22,5 g/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Občutljivi pleveli:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, navadni zebnat, prava kamilica, nedišeča trirobka, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, njivska redkev, kislica, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in oljna ogrščica.</i> <u>Manj občutljivi pleveli:</u> <i>navadni slakovec, njivska vijolica, perzijski jetičnik in njivski slak.</i>	1x v rastni sezoni
HERBOCID XL	1,25 L/ha Poraba vode: 400-500 L vode/ha	3 - 4 listov (BBCH 13 - 14)	<u>Dobro zatira:</u> <i>njivski osat, njivski mošnjak, navadni plešec, koprive, metlike in plezajočo lakoto.</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>poljski mak, kamilice in dresni</i>	Herbicidov na podlagi 2,4-D se ne sme uporabljati v posevkih semenske koruske. S sredstvom se lahko na isti površini tretira samo enkrat na leto.
KAMBA 480 SL *	0,6 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Zatira:</u> <i>kurjo češnjico, ščire, dresni in metlike, plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislice</i>	Pleveli morajo biti v fazi intenzivne rasti. Pri njivskem slaku je optimalen čas zatiranja, ko so poganjki dolgi 5-15 cm, pri njivskem osatu pa, ko ima le-ta 4-6 listov. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
KALIMBA *	0,6 L/ha	od 2 do 8 listov (BBCH 12-18)	<i>kurjo češnjico, ščire, dresni in metlike, ter plotni slak, njivski osat, njivski slak in kislice</i>	Uporaba sredstva ni dovoljena pri pridelavi semenske koruske. Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28 °C.
KELVIN *	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 8 razvitih listov (BBCH 13 – 18)	<u>Dobro zatira:</u> <i>pirnica, divji sirek, kostreba in muhvič, navadno kostrebo, muhvič, kamilice, ščire in navadno rosnico.</i> <u>Sredstvo slabše zatira:</u> <i>navadno pirnico, divji sirek, škrbinko, breskovo dresen in srakonjo</i>	1x v rastni sezoni

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
KELVIN OD *	1 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	4 - 7 listov (BBCH 14 - 17)	<u>Občutljivi pleveli:</u> <i>navadna kostreba, navadni zebkrat, plezajoča lakota, kamilica in njivski mošnjak.</i> <u>Manj občutljivi pleveli:</u> <i>plazeča pirnica, bela metlika, ščavjelistna dresen in njivska vijolica.</i>	Sredstva se ne sme uporabiti, če so temperature zraka višje od 25 °C. Uporaba samo 1 x v rastni sezoni.
KELVIN MAX *	0,75 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<u>Zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavi ščir, navadne zvezdice, kamilic in pasjega zelišča</i> <u>Zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, bela metlika, navadni slakovec, breskova dresen</i>	V primeru propada posevka koruze se sme na površino, ki je bila tretirana s pripravkom KELVIN MAX, sejati le koruzo po predhodni obdelavi tal. Jeseni se sme po predhodni obdelavi tal sejati le ozimno pšenico, naslednjo pomlad pa le koruzo, prav tako po predhodni obdelavi tal.
KOBAN TX *	4 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	1 – 4 lista (BBCH 10-14)	<u>Zelo dobro deluje:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, bela metlika, navadna kostreba, plezajoča lakota, drobnocvetni rogovilček, pritlična krvomočnica, njivska mrtva kopriva, škrlatnordeča mrtva kopriva, nedišeča trirobka, morska kamilica, enoletna latovka, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, zeleni muhvič, navadna zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik in njivska vijolica.</i> <u>Slabo deluje:</u> <i>njivski slak, plazeča pirnica in pasje zelišče</i>	
LAUDIS	1,15 - 2,25 L/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha.	2 - 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Dobro zatira:</u> <i>belo metliko, mnogosemnsko metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, tridelni mrkač, navadno kostrebo, zeleni muhvič, enoletno latovko, ptičjo dresen, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir, njivski slak, divji sirek, plezajoča lakota, golo proso</i>	S sredstvom se lahko tretira tudi v deljenih odmerkih (split aplikacija), ki se izvede v presledku 7-14 dni. Pri obeh tretiranjih skupni odmerek ne sme preseči 2,25 L/ha, pri čemer posamezen odmerek ne sme preseči 1,5 L/ha. Priporoča se uporaba 1 L/ha za prvo tretiranje, ter 1,25 L/ha za drugo tretiranje.
LAUDIS WG 30 (dodajanje močila)	0,25 - 0,5 kg/ha Poraba vode: 200 - 300 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	Zelo dobro zatira: - 0,25 kg/ha: <i>navadni plešec, drobnocvetni rogovilček, škrlatnordečo mrtvo kopriv, njivsko gorjušico, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez in navadni kristavec,</i> - 0,375 kg/ha: <i>srhkodlakavi ščir, belo metliko, mnogosemnsko metliko, navadno lobodo, navadni pelin, plezajočo lakoto, breskovo dresen, ščavjelistno dresen in navadno kostrebo,</i> <u>Zatira:</u> 0,5 kg/ha: <i>njivsko vijolico in muhvič</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
LONTREL 100 *	1 do 1,2 L/ha Poraba vode: 200 – 300 L/ha	2 - 5 listov (BBCH 12 - 15)	<i>bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov</i>	1 x v rastni dobi
LONTREL 72SG *	0,17 kg/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 - 9 listov (BBCH 12 - 19)	<u>dobro zatira:</u> <i>bodič, pravo kamilico, nedišečo trirobko, druge vrste kamilic), njivsko pasjo kamilico, njivski osat) in druge vrste osatov.</i> <u>slabše deluje na osate</u>	S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Rastlinski material, tretiran s sredstvom LONTREL 72SG, se ne sme uporabljati za kompostiranje in se ga ne sme mulčiti. Gnoja živali, ki se hranijo s pridelki tretiranimi s sredstvom LONTREL 72SG, se ne sme uporabljati za kompostiranje.
LUMAX *	a) izven VVO: • na lahkih peščenih tleh 3,25-3,5 L/ha; • na srednje težkih tleh 3,5 – 3,75 L/ha; • na težkih tleh v odmerku 3,75 - 4 L/ha b) 3– 4 L/ha, nižji odmerek se uporablja na lahkih tleh	a) pred vznikom b) zgodaj po vzniku (koruza največ 4 liste)	<i>enoletni ozkolistni plevel; enoletni širokolistni plevel</i>	Pred vznikom uporaba tega sredstva na vodovarstvenih območjih ni dovoljena.
LUMAX H 537.5 SE	3-4 L/ha Poraba vode: 200 - 400 L/ha	4 liste (BBCH 14)	<u>Zatira</u> v odmerku 3,0 L/ha: <i>baržunasti oslez, ščire, navadno ambrozijo, ogrščico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadni čapljevec, drobnocvetni rogovilček, plezajočo lakoto, mrtve koprive, breskovo dresen, njivsko gorjušico, pasje zelišče in navadno zvezdico.</i> <u>Zatira</u> v odmerku 4,0 L/ha (poleg zgoraj navedenih): <i>njivski slak, kamilice, poljski mak, navadni slakovec, ptičjo dresen, navadni tolščak, navadni bodič, njivski mošnjak, jetičnike ter vijolice, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo ter golo proso in navadno proso.</i> Za učinkovitejše zatiranje <i>ptičje dresni</i> se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. Za učinkovitejše zatiranje <i>navadnega tolščaka</i> se priporoča tretiranje takoj po vzniku koruze. Za učinkovitejše zatiranje <i>sivozelenega muhviča</i> se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> v odmerku 4,0 L/ha: <i>plazeče pirnice in muhvičev.</i> Zelo slabo zatira <i>divji sirek</i> .	Sredstvo se uporablja v koruzi za zrnje in silažo. Nižji odmerek se lahko uporablja na lahkih tleh in za plevele kot je navedeno v nadaljevanju. Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in brez skorje

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
MERLIN FLEXX	a) 0,3 L/ha	a) pred vznikom koruze (BBCH 00 – 07)	<p><u>Dobro zatira:</u> <i>baržunasti oslez, belo metliko, pasje zelišče, divji sirek in ščavjelistno dresen.</i></p> <p><u>Slabše zatira:</u> <i>ščire, pičjo dresen, breskovo dresen, muhviče, navadno kostrebo in mrtve koprive</i></p>	
	b) 0,4 L / ha	b) po vzniku koruze do 2-3 listov (BBCH 09-13)		
	Poraba vode: 200 - 400 L/ha			
MILAGRO EXTRA 6 OD *	0,75 L/ha	2 - 8 listov (BBCH 12 - 18)	<p><u>za zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča;</i></p> <p><u>za zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo.</i></p>	
MILAGRO 240 SC *	170 ml/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	3 – 5listov (BBCH 13 – 15)	<p><u>dobro zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadni plešec</i></p> <p><u>zadovoljivo zatira:</u> <i>enoletno latovko, navadni zebnat, njivsko vijolico;</i></p> <p><u>slabše zatira:</u> <i>navadni slakovec, pasje zelišče, belo metliko, ščavjelistno dresen, breskovo dresen in zeleni muhvič</i></p>	
MILAGRO PLUS *	0,8 L/ha Poraba vode: 100-400 L/ha	2 -8 listov (BBCH 12 – 18)	<p><u>Zatira:</u> <i>srhkodlakavi ščir, navadna ambrozija, bela metlika, izrodna metlika , navadni kristavec, samosevna navadna sončnica, ščavjelistna dresen, njivska gorjušica, golo proso in divji sirek;</i></p> <p><u>Zadovoljivo zatira:</u> <i>baržunasti oslez, navadni oslez, breskovolistna dresen, navadni tolščak, pasje zelišče, laški bodič, njivski osat, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, golo proso</i></p>	1x v rastni sezoni Tretiranja se ne priporoča, ko so temperature zraka višje od 28 °C, ali v vetrovnem vremenu.
MOTIVELL *	1 L/ha Poraba vode: 150 - 250 L/ha	3 - 6 listov (BBCH 13 – 16)	<p><u>zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in ljulk, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice in kamilic;</i></p> <p><u>zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>plazečo pirnico, belo metliko, breskovo dresen, navadnim slakovcem in pasjim zeliščem</i></p>	1x v rastni dobi
MONSOON ACTIVE	a) 1,5 L/ha ali b) deljenem odmerku dva krat po 0,75 L/ha, ter c) za zatiranje divjega sirka: 2,0 L/ha ali v d) deljenem odmerku dva krat po 1,0 L/ha. Poraba vode: 200 do 400 L/ha	2 do 6 listov (BBCH 12-16)	<p><u>Sredstvo učinkovito zatira</u> (>86% učinkovitost): krvavordeča srakonja, navadna kostreba, enoletna latovka, muhviči in divji sirek; baržunasti oslez, ščiri, navadna ambrozija, navadna loboda, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, prava kamilica, dresni, navadni grint, laški bodič in hrapava škrbinka</p> <p><u>Sredstvo zadovoljivo zatira</u> (70-85 % učinkovitost): njivski osat</p> <p><u>Sredstvo delno zatira</u> (<70 % učinkovitost): mala srakonja, njivski slak, navadna rosica in perzijski jetičnik</p>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
MOTIVELL EXTRA 6 OD *	0,75 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Za zatiranje</u> : navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča; <u>za zmanjševanje zapleveljenosti</u> : plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo.	
MURAL *	0,6 - 0,75 L/ha Poraba vode: 200 do 400 L/ha	2 – 5 listov (BBCH 12 – 15)	<u>Zatira</u> v odmerku 0,6 L/ha: srhkodlakavi ščir, bela metlika, mnogosemenska metlika, plezajoča lakota, navadni slakovec, breskova dresen, ščavjelistna dresen, navadna ambrozija, izrodna metlika. <u>Zatira</u> v odmerku 0,75 L/ha: baržunasti oslez, navadni plešec, navadni kristavec, drobnocvetni rogovilček, navadni oslez, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, njivski osat, njivski slak. <u>Slabo zatira</u> v odmerku 0,75 L/ha: ptičja dresen.	V koruzi za zrnje in silažo. 1x v rastni sezoni
MUSTANG 306 SE	0,5 do 0,6 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	4 – 5 listov (BBCH 14 – 15)	<u>metlike, dresni, navadna zvezdica, navadna kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija, perzijskim jetičnikom, njivski osat, njivski slak</u>	
NICOSH *	1 L/ha	3 – 5 listov (BBCH 13 – 15)	<u>Dobro zatira</u> : škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, njivski mošnjak, navadni plešec, njivsko škrbinko, kamilico, gluhi oves, plezajočo lakoto, divji sirek, baržunasti oslez, ščavjelistno dresen, navadni oslez, srhkodlakavi ščir; breskovo dresen, navadno zvezdico, enoletno latovko, navadno kostrebo in krvavordečo srakonjo; <u>Slabše zatira</u> : belo metliko, pasje zelišče, navadni slakovec, ptičjo dresen, plazečo pirnico, navadno lobodo, sivozeleni muhvič, perzijski jetičnik in njivski slak	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
OSORNO	1,5 L/ha Poraba vode: 300 L/ha.	2 do 8 listov (BBCH 12 do 18).	<i>navadne kostrebe, njivska vijolica, plezajoča lakota in navadni slakovec</i>	
PEAK 75 WG (dodajanje močila)	20-30 g/ha	po vzniku – 7 listov (BBCH 09 – 17)	<i>enoletni širokolistni plevel; kislice; njivski osat</i>	
PRIMERO *	1,0 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L / ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Zatira:</u> <i>njivski lisičji rep, navadna kostreba, enoletna latovka, ter naslednje širokolistne plevela: srhkodlakavi ščir, navadna zvezdica, njivska vijolica, navadna ambrozija, plezajoča lakota, škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica in navadni slakovec.</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>zelenim muhvičem, njivskim mošnjakom, belo metliko in pritlično krmovnico.</i> <u>Omejeno deluje na:</u> <i>ptičjo dresen in pasje zelišče</i>	
RIM 25 WG	60 g/ha	1 - 7 listov (BBCH 11-17)	<u>Zatiranje:</u> <i>srhodlakavi ščir, navadni plešec, sončnica, nedišeča trirobka, prava kamilica, vonjava kamilica, navadni slakovec, breskova dresen, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in njivska vijolica, plazeča pirnica, navadna kostreba, enoletna latovka in divji sirek</i> <u>Zmanjševanje</u> <i>navadna ambrozija, bela metlika in ptičja dresen, krvavordeča srakonja in sivozeleni muhvič</i>	
RIMURON 25 WG*	V enkratnem odmerku 50 g/ha z dodatkom močila HELM SURFER PLUS 0,2L/ha.	Tretira sev fenološki fazi, ko imakoruzi 2-6 listov (BBCH 12-16).	<u>Zatiranje:</u> <i>navadne kostrebe, navadne zvezdice, enoletne latovke, navadnega plešca, njivskega mošnjaka, navadne rosnice, nedišeče trirobke, plazeče pirnice in samosevne oljne ogrščice</i> <u>Za zmanjševanje zapleveljenosti z:</u> <i>navadnim ščirom, belo metliko, pasjim zeliščem, breskovo dresnijo, pravo kamilico, enoletnim golšcem in drobnocvetnim rogovilčkom</i>	S sredstvom je na isti površini dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni sezoni.
	v deljeni (split) aplikaciji: 30 g/ha + 20 g/ha z dodatkom močila HELM SURFER PLUS 0,2L/ha. Poraba vode 200 – 400 L.	Prvič se tretira v fenološki fazi, ko ima koruza 2-4 liste (BBCH 12-14). Drugo tretiranje se izvede 8-10 dni po prvem tretiranju, do faze, ko ima koruza 6 listov (najpozneje do BBCH16).		S sredstvom sta na isti površini dovoljeni dve deljeni (split) tretiranja v eni rastni sezoni.
RINIDI WG	440 g/ha Poraba vode: 200 – 400 L / ha	4 - 8 listov (BBCH 14-18)	<u>Zatiranje</u> <i>srhodlakavi ščir, navadni plešec, sončnica, nedišeča trirobka, prava kamilica, vonjava kamilica, navadni slakovec, breskova dresen, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in njivska vijolica;</i> zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. plazeča pirnica (<i>Elytrigia (=Agropyron) repens</i>), navadna kostreba	



			(Echinochloa crus-galli), enoletna latovka (Poa annua) in divji sirek (Sorghum halepense); - zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst širokolistnega plevela, kot so npr. navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), bela metlika (Chenopodium album) in ptičja dresen (Polygonum aviculare), - zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst ozkolistnega plevela, kot so npr. krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis) in sivozeleni muhvič	
ROUNDUP POWERMAX	1 kg/ha Poraba vode 150 – 200 L/ha	7 do 10 dni pred setvijo	<i>ozkolistno ciprje, navadni osat, topolistna kislicanjska škrbinka, njivski lisičji rep, jalova stoklasa, bela metilka, dvoletni dimek, naceplenolistna krvomočnica, njivska zavrtnica, poljski mak, enoletna latovka, navadna zvezdica</i>	S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi
SAMSON 4 SC *	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>zatiranje</u> : <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in ljulk, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice in kamilic;</i> <u>zmanjševanje zapleveljenosti</u> : <i>plazečo pirnico, belo metliko, breskovo dresen, navadnim slakovcem in pasjim zeliščem</i>	1x v rastni dobi
SAMSON EXTRA 6 OD *	0,75 L / ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>za zatiranje</u> : <i>navadne kostrebe, muhvičev, enoletne latovke in angleške ljulke, srhkodlakavega ščira, navadne zvezdice, kamilice in pasjega zelišča, plazečo pirnico, belo metliko, navadnim slakovcem, breskovo dresnijo</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
SHARPEN PLUS	2,5-4 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	<u>Zatira:</u> <i>lisičji rep, srakoperec, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozelena muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti širokolistne plevela: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica.</i> <u>Slabo zatira:</u> <i>slak in njivska preslica</i>	Dovoljeni na koruzi za zrnje!
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC *	<p>a) pred vznikom koruze – izven vodovarstvenih območij:</p> <ul style="list-style-type: none"> lahka in srednje težka tla 4-4,25 L/ha; težka tla 4,25-4,5 L/ha. <p>Mešanica s pripravkom Callisto 480 SC:</p> <ul style="list-style-type: none"> lahka peščena tla 2,5-2,75 L/ha + 250-300 ml Callista 480 SC; srednje težka tla 2,75-3,1 L/ha + 200-250 ml Callista 480 SC; težka tla v odmerku 3,1-3,4 L/ha + 200-250 ml Callista 480 SC. <p>b) po vzniku koruze:</p> <ul style="list-style-type: none"> lahka in srednje težka tla 4-4,25 L/ha; težka tla 4,25-4,5 L/ha. <p>Mešanica s pripravkom Callisto 480 SC (priporočljivo je dodati še močilo):</p> <ul style="list-style-type: none"> lahka peščena tla v odmerku 2,3-2,6 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC; srednje težka tla 2,6-2,9 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC; težka tla 2,9-3 L/ha + 200-250 ml Callisto 480 SC 	<p>a) pred setvijo z zadelavo s predsetvenikom na globino 5 cm (največ 14 dni pred setvijo): primerno predvsem za območja, kjer se pričakuje sušno obdobje na začetku razvoja koruze ali po setvi, pred vznikom plevela in koruze</p> <p>b) po vzniku plevela in koruze.</p>	<p><i>lisičji rep, ščire, njivsko kurjo češnjico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, malo srakonjo, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, navadno rosnico, navadni zebnat, drobnocvetni rogovilček, mrtve koprive, kamilice, proso, ptičjo dresen, breskovo dresen, navadni tolščak, njivsko redkev, muhviče, navadni grint, gorjušice), pasje zelišče, čišljake, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, grašice, divjo vijolico, baržunasti oslez, navadna ambrozija, lobode, ostrice, mlečke, plezajočo lakoto, madronščice, navadni slezenovec, trpotce, škrbinke, pisani sirek in divji sirek</i></p>	Pred vznikom koruze uporaba sredstva Primextra TZ Gold 500 SC na vodovarstvenih območjih ni dovoljena.

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
SHARPEN 33 EC	3-5 L/ha	pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	<u>Zatira:</u> <i>lisičji rep, srakoperec, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti širokolistne plevela: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica.</i> <u>Slabo zatira:</u> <i>slak in njivska preslica</i>	Dovoljeno v koruzi za pridelavo semena!
SPANDIS *	0,4 kg/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12-18)	<u>Dobro deluje:</u> <i>baržunasti oslez, ščiri, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, drobnocvetni rogoviček, navadni oslez, kamilice, enoletni golšček, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska gorjušica, njivska škrbinka, navadna zvezdica, njivski mošnjak in navadni bodič, proso.</i> <u>Dobro deluje:</u> <i>pelinolistna ambrozija, navadni plotni slak, njivski osat, plezajoča lakota, mrtve koprive in vijolice, navadna kostreba, plazeča pirnica, enoletna latovka, zeleni muhvič, sivozeleni muhvič in divji sirek.</i> <u>Deluje:</u> <i>njivni lisičji rep, njivski slak, ptičja dresen, navadni tolščak in pasje zelišče.</i> <u>Slabo deluje:</u> <i>srakonjo</i> <u>Ne deluje:</u> <i>perzijski jetičnik.</i>	
STARANE FORTE	0,54 L/ha poraba vode: 200-400 L/ha	2 - 6 listov (BBCH 12-16)	<u>Zatira:</u> <i>plezajočo lakoto, navadno zvezdico, breskovo dresen, drobnocvetni rogoviček in njivski slak;</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>navadni plotni slak</i>	Pri temperaturah zraka pod 15 °C se priporoča uporaba močila. 1x v rastni sezoni
STOMP AQUA	3,3 L/ha Poraba vode: 100 – 200 L/ha	Od vznika do 4 listov (BBCH 10 – 14)	<u>Dobro zatira:</u> <i>enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno ogrščico.</i> <u>Slabše zatira:</u> <i>navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico</i>	Sredstva se ne sme zadelati (inkorporirati) v tla.
STRETCH	1 L/ha Poraba vode: 200 – 400 L/ha	2 -8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Zatira:</u> <i>navadno kostrebo, srhkodlakavi ščir in njivsko vijolico,</i> <u>Zmanjšuje zapleveljenost:</u> <i>belo metliko,</i> <u>Omejeno delovanje:</u> <i>navadni slakovec</i>	

FFS	Odmerek	FF posevka	Plevel	Opozorila
SUCCESSOR 600 *	2 L/ha	Od vznika – 4 listov (BBCH 10 – 14)	<u>Zatira:</u> <i>bela metlika; breskova dresen; drobnocvetni rogovilček; enoletna latovka; kamilice; muhvič; navadna kostreba; ozkolistni plevel; pasje zelišče; srhkodlakavi ščir; širokolistni plevel</i>	1x v rastni sezoni
TALISMAN	1,125 L/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<u>Odlično zatira:</u> <i>srhodlakavi ščir, mnogosemenska metlika, navadni plešec, zeleni muhvič, navadna kostreba, divji sirek</i> <u>Zatira:</u> <i>navadni kristavec, škrlatnordeča mrtva kopriva, bela metlika, navadni oslez, breskova dresen, krvava srakonja, divji sirek.</i> <u>Zmanjševanje zapleveljenosti:</u> <i>prava kamilica, njivska vijolica, ptičja dresen, veliki trpotec.</i>	V koruzi za zrnje in silažo. Sredstva se ne sme uporabljati, ko so 6 ur po tretiranju napovedane padavine.
TAROT 25 WG * (dodajanje močila)	50 – 60 g/ha	2 – 8 listov (BBCH 12 – 18)	<i>navadna zvezdica, srhkodlakavi ščir, baržunasti oslez, divji sirek in plazeča pirnica</i>	
TEMSA SC	1,125 L/ha Poraba vode: 300 L/ha	2 do 8 listov (BBCH 12 do 18)	<i>navadne kostrebe, njivska vijolica, plezajoča lakota in navadni slakovec</i>	

Pripravke, ki so označeni z * ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) in v ukrepu POS_FFSV.

Pripravila:
Karmen Rodič, univ.dipl.ing.agr.
 Služba za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto