

# Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@gov.si](mailto:domen.bajec@gov.si)

ISSN

št. 11.

Datum: 23. junij 2022

## VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta nastavlja plodič: mladi plodiči nabrekajo, preostali cvetovi so odpadli (71 – 72 po lestvici BBCH). Neurja in nestanovitno vreme omogočajo dobre razmere za okužbe s povzročitelji glivičnih obolenj. V vinogradih je poleg varstva s kemičnimi sredstvi potrebno sočasno skrbeti tudi za redna zelena dela: prikrajševanje mladic, pletev zalistnikov, postopno odstranjevanje listja v predelu grozinja in vršičkanje. Omogočiti morate ustrezno zračnost.

V času nastavka plodičev – do razvoja jagod velikosti graha, je potrebno nameniti povečano pozornost varstvu pridelka pred *oidijem vinske trte*. Uporabite lahko: **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha do nastavka plodiča ter v odmerku 0,5 l/ha od razvojne faze, ko je viden nastavek plodiča, do razvojne faze, ko so jagode v velikosti prosenih zrn in se grozdiči začenjajo povešati), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 – 0,6 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **TALENDO EXTRA** (po cvetenju: 0,13-0,3 l/ha, oz. ko so večina jagod med seboj dotika: 0,2-0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; veljavnost do 31.8.2022), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; zaloge v uporabi do 30.11.2022), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **VIVANDO** (0,2 l/ha v fazu po cvetenju do zapiranja grozgov - BBCH 79), **PROSPER CS 300** (1 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **TOPAS 100 EC** (0,3 l/ha), **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,12 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), ...

Ravno tako se ob nestanovitnem vremenu razvijajo okužbe s *peronosporo vinske trte*. Svetujemo sredstva s kombiniranim načinom delovanja: **EQUATION PRO** (400 g/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), **FOLPAN GOLD** (2,5 kg/ha od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXSTRA WDG** (1,5 kg/ha od BBCH 53-75) in 2 kg/ha od BBCH 76), **TWINGO** (3 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **CYMBAL** (največ 0,25 kg/ha), **VALIS F** (2 kg/ha), **SANVINO** (1,125 kg/ha od BBCH 71 in 1,5 kg/ha do BBCH 83 za vinsko grozdje in od BBCH 75 – 79 za namizno), **DELAN PRO** (3 l/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **VIDERYO F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **VINCYA F** (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **MILDICUT** (4 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), **DELAN PRO** (3 l/ha), **FOSHIELD** (samostojno v šestih zaporednih tretiranjih v odmerku 1-4 l/ha, odvisno od razvojne stopnje faze trte v času tretiranja...), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGNA TRIPLE WG** (3 kg/ha), ...

Priporočen razmik med tretiranji naj bo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

V primeru **neurja s točo** je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke **na osnovi aktivne snovi folpet** (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mikal Flash, Momentum F, Pergado F, Twingo,...) ali **BAKROVE PRIPRAVKE**.

Pri rednem spremljanju razvoja **ameriškega škržatka**, prenašalca karantenske bolezni **zlata trsna rumenica**, beležimo prisotnost večine ličink na razvojnih stopnjah L3 in L2. Še vedno se pojavljajo ličinke L1; zabeležili pa smo tudi prve škržatke na stopnji L4. **Predvideno obdobje 1. obveznega zatiranja poteka med 20. in 30.06.2022, ko je vinska trta popolnoma odcvetela. Podrobni pristop zatiranja je predstavljen v posebnih obvestilih.**

**Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi**



MKGP-UVHVVR    KGZS-Zavod Novo mesto

*fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.*



MKGP-UVHVVR    KGZS-Zavod Novo mesto