



Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
Obvestilo pripravila: Karmen Rodič, e-pošta: [karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si](mailto:karmen.rodic@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 1

Datum: 26. februar 2026

## OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI

### Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije po večini v razvojnih fazah devet listov razgrnjenih (19 po BBCH 15).

**Zatiranje škodljivcev kljunotajev (*Ceutorhynchus napi*, *Ceutorhynchus quadrienz*) in repičarja (*Meligethes aeneus*)**

V oljni ogrščici priporočamo, da postavite rumen lovilne posode ali rumene lepljive plošče za spremljanje škodljivcev: kljunotajev (*Ceutorhynchus napi*, *Ceutorhynchus quadrienz*) in repičarja (*Meligethes aeneus*). Posoda in plošče naj bodo postavljene na nivoju višine rastlin.



Kljunotaj na rastlini oljne ogrščice. Slika: I. Imperl



Rumena lovilna posoda. Slika: I. Imperl

Rezultati pregledov rumenih lovilnih posod na naših lokacijah lahko spremljate tu:

repičar oz. repični bolhač:

<https://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Zoo/Feno?meteoLocId=117&soLocId=890&taxId=1002&archive=0>

repični kljunotaj:

<https://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Zoo/Feno?meteoLocId=117&soLocId=960&fitoLocId=0&taxId=856>



Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev na rumeno posodo v treh dneh. V primeru preseženega praga škodljivosti vam priporočamo njihovo zatiranje.

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi za zatiranje kljunotajev:

| PRIPRAVEK        | ODMEREK    | št. dovoljenih tretiranj | KDAJ <u>FF</u>                                                        | OPOMBE                                                                   |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DECIS 100 EC     | 0,075 L/ha | 1                        | ob pojavu škodljivih žuželk oz. ko je presežen prag gospodarske škode | za <u>zatiranje</u> repičarja za <u>zmanjšanje</u> populacije kljunotaja |
| DECIS 2,5 EC     | 0,3 L/ha   | 2                        | ko je presežen prag gospodarske škode                                 | za <u>zatiranje</u> repičarja in klunotaja                               |
| KARATE ZEON 5 CS | 0,15 L/ha  | 2                        |                                                                       | za <u>zatiranje</u> repičarja in klunotaja                               |
| POLECI           | 0,3 L/ha   | 2                        |                                                                       | za <u>zatiranje</u> repičarja                                            |
| EVURE            | 0,2 L/ha   | 1                        | do BBCH 69                                                            | za <u>zatiranje</u> kljunotaja za <u>zmanjšanje</u> populacije repičarja |
| MAVRIK 240 EW    | 0,2 L/ha   | 1                        | do BBCH 69                                                            | za <u>zatiranje</u> kljunotaja za <u>zmanjšanje</u> populacije repičarja |
| DELUX 050 CS     | 0,1 L/ha   | 1                        | BBCH 51-59                                                            | za <u>zatiranje</u> repičarja in klunotaja                               |
| SCATTO           | 0,3 L/ha   | 1                        | BBCH 50-75                                                            | za <u>zatiranje</u> repičarja za <u>zmanjšanje</u> populacije kljunotaja |

\* Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti se na istem zemljišču ne sme uporabljati sredstev, ki vsebujejo aktivno snov deltametrin oziroma sredstev iz skupine piretroidov več kot dva krat v eni rastni dobi.

**Kljunotaj** odlaga jajčeca v vrhnje dele stebela, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebela se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

Tudi ta vsebina v obliki videoposnetka je še vedno aktualna. Vabljeni k ogledu: <https://www.youtube.com/watch?v=jiPTPsHfeOc&t=275s>

**Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

