

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Obvestilo pripravila: Iva Imperl, e-pošta: ivica.imperl@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 02

Datum: 09. marec 2026

VARSTVO JABLAN

Nasadi jablan in hrušk brstijo. Večinoma so brsti močno nabrekli in se razpirajo (51 po lestvici BBCH), na zgodnjih legah je razvoj napredoval že do stopnje mišjega ušesca (54 po lestvici BBCH).

V tekočem tednu podaja vremenska prognoza skorajšnje oblikovanje malo bolj spremenljivih vremenskih razmer. Svetujemo, da v tem času poskrbite za preventivno zaščito nasadov s sredstvi na osnovi bakra, katera imajo poleg delovanja na **škrlup** učinek tudi na **glivične ter bakterijske okužbe lesa** (rakaste okužbe, hrušev ožig, gniloba koreninskega vratu,...). Za ta ukrep vsekakor poskrbite pred naslednjimi padavinami.

FFS	Aktivna snov	Odmerek	EKO	Uporabi se proti	Prepovedana uporaba najožji VVO
CUPRABLAU Z 35 WG	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)	3,0 kg/ha	DA	jablanov škrlup, hrušev ožig, gniloba koreninskega vratu	NE
CUPRABLAU Z 35 WP	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)	2,5 kg/ha	DA	škrlup, hrušev ožig	NE
CUPRABLAU Z 50 WP	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (50%)	1,4 kg/ha	DA	škrlup	NE
KOCIDE 2000	bakrove spojine - bakrov hidroksid (53,8%)	2,0 kg/ha	DA	škrlup, hrušev ožig	NE
BADGE WG	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)	2,9 kg/ha	DA	hrušev ožig	NE
NORDOX 75 WG	bakrove spojine - bakrov oksid (75%)	1,6 kg/ha	DA	jablanov rak, hrušev ožig	NE

V tem obdobju poteka v nasade jablan in hrušk nalet **bolšic**. Njihov pritisk je možno zmanjšati z metodo odvrčanja, z nanosom kaolinskih glin. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite produkte kot sta npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je sprejemljiv v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Pri tem imetnike nasadov jablan obveščamo, da je bilo KGZS za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin izdano dovoljenje (Št.: 34330-86/2025-2337-9, z veljavnostjo od 02.03. do 29.06.2026) za **MAVRIK 240 EW** (v odmerku 0,2 l/ha pri porabi vode 500-1000 l/ha; uporaba največ dvakrat v eni rastni dobi, v razmiku 14 dni)



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto

za zatiranje bolšic iz rodu *Cacopsylla*. Omenjena vrsta predstavlja nevarnost kot prenašalec gospodarsko zelo pomembne bolezni **metličavost jablan**. Sredstvo se lahko uporabi od razvojne faze konec nabrekanja do stadija rožnatih popkov (BBCH 52-57). Zaradi zaščite neciljnih členonožcev je pri tretiranju na jablanah obvezna uporaba naprav za preprečevanje zanašanja, ki so opremljene s šobami z najmanj 50% zmanjšanjem zanašanja ter upoštevati netretiran varovalni pas 5 m do nekmetske površine. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju na jablanah upoštevati netretiran varovalni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda. Uporabljajo ga lahko imetniki nasadov jablan - pravne in fizične osebe, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Za **bolšice** in **jablanovega cvetožera** je predviden še **ASSET FIVE** (0,96 l pri porabi vode največ 1500 l vode na ha; s sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat, v razmiku 7 dni; najkasneje do stadija mišjega ušesca). Pripravek je možen za uporabo še v ekološkem načinu varstva, a pazite pri uporabi – nevaren je za čebele! Njegov nanos opravite zvečer, v času, ko čebele ne letajo. Boljšo učinkovitost pa dosežete pri nižjem pH škroplilne brozge (5 do 6).

Prej omenjeni **jablanov cvetožer** je začel z naletom v prvih dneh meseca marca in povečal aktivnost z odlaganjem jajčec konec preteklega tedna. Na legah, ki so potrjene njegovim napadom, priporočamo aktivno spremljanje hroščkov in poškodb na brstih. Najbolj so izpostavljeni nasadi v bližini gozda, visokodebelnih dreves jablan, oz. nasadi, kjer napade beležimo že več zaporednih let. Nalet hroščkov sledimo na več načinov. Najpreprostejši je obešanje belih lepljivih plošč, s katerimi zaznamo prve pojave. Hkrati podajamo opombo, da so bele lepljive plošče privlačne in usodne tudi za številne koristne organizme, zato jih je po zaključenem spremljanju (cvetožera in grizlice) nemudoma odstraniti iz nasada. Za ugotavljanje številčnosti hroščkov v nasadu pa je zelo priročno otresanje vej in poganjkov. V delu dneva z nižjimi temperaturami (zjutraj) so žuželke še otrple in jih z otrsanjem vej nad podloženo svetlo podlago (npr. lepenka, platnena podloga) hitro opazimo. Prag škodljivosti je 20 hroščkov na 100 stresenih vej. Ob tem na znamenja napada pregledujemo tudi brste z drobnimi izvirinami. Ocenjuje se lahko še prag škodljivosti po deležu napadenih brstov, ko je pri slabem cvetnem nastavku je prag 15%, oz. pri zelo dobrem nastavku do 30% napadenih brstov. Škoda se stopnjuje v okoliščinah z ohladitvijo vremena, ko se upočasni razvoj dreves, kar vodi v daljšo izpostavljenost napadov. V primeru potrebe po izvedbi zaščitnega tretiranja vas bomo opozorili.

Ta čas je primeren še za nanos sredstev na osnovi olja, ki učinkujejo zoper zimsko jajčeca škodljivih vrst **pršic prelke, listnih uši, kaparjev**. V poštev pridejo v poštev pripravki: **BELO OLJE KARSIA** (10 l/ha/m višine krošnje, najvišji odmerek 30 l/ha), **FRUTAPON** (10 l/ha/m višine krošnje, najvišji odmerek 30 l/ha), **OVITEX** (20 l/ha) ali **CELAFLOR NATUREN NARAVNI INSEKTICID ZA SADJE, VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE – KONCENTRAT** (30 ml na 1 l vode oz. 3% koncentracija). Pri tej skupini sredstev lahko pri rabi ob nizkih temperaturah pride do fitotoksičnosti.

Ob začetku rastne dobe bodite pozorni tudi na nalet **vrtnih zavrtičev**, hroščkov iz skupine podlubnikov, ki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, katera zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pastí** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola). Video navodila za izdelavo pastí so dostopna na povezavi: <https://www.youtube.com/watch?v=B7nL3GpqEsw&t=189s>.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrašč.

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Brti breskev in nektarin v JV Sloveniji nadaljujejo odpiranje preko fenološke stopnje zelenega vršička (BBCH 53). Po tem, ko ste prve preventivne korake za varstvo nasadov pred **breskovo kodravostjo** opravili s pripravki na osnovi bakra, vam v izogib fitotoksičnosti naprej svetujemo sredstvo **SYLLIT 400 SC** (dodin (40%); 2,25 l/ha).

Na poznih legah, kjer je razvoj zakasnen, lahko fenološke razmere še vedno omogočajo raba bakrovih pripravkov: **CUPRABLAU Z 35 WP** (bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%); EKO; 3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%); EKO; 1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **BADGE WG** (bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%); EKO; 3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **NORDOX 75 WG** (bakrove spojine - bakrov oksid (75%); EKO; 2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Za nanos obvezno poskrbite še pred predvidenimi padavinami.



V pošteve pride tudi **CURATIO žvepleno apnena brozga (10)** (kalcijev polisulfid (apneno žveplo (38%); EKO; 6 - 18 l/ha). Slednjega smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO MARELIC

Nasadi marelic cvetijo (61 – 63 po lestvici BBCH).

Vremenska prognoza podaja za prihajajoče dni oblikovanje bolj spremenljivih vremenskih razmer. Priporočamo vam preventivno varstvo pred **cvetno monilijo**. Prvi nanos enega od spodaj navedenih fungicidov boste opravili ob začetku cvetenja.

FFS	Aktivna snov	Odmerek	EKO	Prepovedana uporaba najožji VVO
<u>AMYLO - X</u>	Bacillus amyloliquefaciens subsp. od 1,5 do 2,5 kg/ha plantarum sev D747 (25%)		DA	NE
<u>CHORUS 50 WG</u>	ciprodinil (50%)	0,6 kg/ha	NE	NE
<u>DUAXO KONCENTRAT</u>	difenokonazol (1,67%)	3,3 l/ha	NE	NE
<u>REVYONA</u>	mefentriflukonazol (7,5%)	1,8 l/ha	NE	NE
<u>SERENADE ASO*</u>	Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%)	8 l/ha	DA	NE
<u>SIGNUM*</u>	boskalid (26,7%), piraklostrobin (6,7%)	0,75 kg/ha	NE	NE
<u>SWITCH 62,5 WG</u>	ciprodinil (37,5%), fludioksonil (25%)	1 kg/ha, oz. 8 g / 10 l	NE	NE
<u>ZENBY</u>	izofetamid (40%)	0,9 l/ha	NE	NE

Drugo tretiranje bo sledilo ob odpadanju venčnih listov (zaključek cvetenja).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

Nasadi češenj in višenj brstijo (51 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** vam svetujemo varstvo z uporabo bakrovih pripravkov. Nanos je potrebno opraviti v naslednjih dneh, še pred padavinami.

FFS	Aktivna snov	Odmerek	EKO	Prepovedana uporaba najožji VVO
<u>BADGE WG*</u>	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,5%), bakrove spojine - bakrov hidroksid (24,4%)	3,5 kg/ha	DA	NE
<u>CUPRABLAU Z 35 WP*</u>	bakrove spojine - bakrov oksiklorid (35%)	2 kg/ha	DA	NE

V pošteve pride še **CURATIO žvepleno apnena brozga (10)** (kalcijev polisulfid (apneno žveplo (38%); EKO; 6 - 18 l/ha). Slednjega smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

