

VINORODNA DEŽELA POSAVJE - TRGATEV 2026

VINORODNI OKOLIŠ: BIZELJSKO-SREMIČ

1. VZORČENJE 11.08.2026

Zap. št.	Sorta	Lega	zdravstveno stanje	masa 100 jagod (g)	sladkor z refraktometro m (°Oe)	sladkor z refraktometro m (°Brix)	skupne tit. kisline (g/L)	pH	vinska kislina (g/L)	jabolčna kislina (g/L)	YAN (mg/L)	Nalaganje sladkorja (mg/jagodo)
1	Beli pinot	Bizeljska vas-Kunejevo	zdravo	101	59	14,5	17,1	2,64	7,9	8,3	141	147
2	Chardonnay	Drenovec	zdravo	109	84	20,3	10,6	3,06	7,8	3,6	216	222
3	Chardonnay	Sromlje-pri britofu	zdravo	121	81	19,7	10,7	3,01	8,1	3,4	320	239
4	Chardonnay	Bučerca	zdravo	155	58	14,2	15,6	2,68	8,1	6,6	83	221
5	Johanniter	Sromlje	zdravo	120	80	19,3	11,2	2,97	8,3	3,4	324	232
6	Sauvignon	Podvrh (klet)	zdravo	124	77	18,7	13,8	2,81	8,7	4,9	165	233
7	Sauvignon	Orešje	zdravo	147	72	17,5	11,1	2,98	7,2	4,3	129	258
8	Sauvignon	Podgorje pri Pišecah (hosta)	zdravo	86	51	12,7	25,6	2,21	10,3	12,6	242	110
9	Sauvignon	Bučerca	zdravo	149	76	18,5	10,9	2,99	7,5	3,9	146	276
10	Sauvignon gris	Sromlje	zdravo	124	82	19,7	13,7	2,85	9,2	4,3	216	245
11	Sivi pinot	Bizeljsko-Kovance	zdravo	114	83	19,9	11,3	3,03	7,7	4,3	373	228
12	Sivi pinot	Vrhovnica, Ruknica	zdravo	88	72	17,6	13,0	2,86	8,2	4,7	160	155
13	Traminc	Podgorje pri Pišecah (hosta ob cesti)	zdravo	75	64	15,7	13,2	2,79	9,6	3,5	255	118

BIZELJSKO-SREMIČ 2026 1.teden - 11.8.2026

Vinograde na širšem Bizeljsko-Sremiškem območju je v začetku maja prizadela močna toča, ki je povzročila veliko škodo. Cvetenje vinske trte se je zaradi ugodnih vremenskih razmer začelo konec maja, na večini vinogradniških leg pa je bilo zaključeno že v prvem tednu junija. V poletnem obdobju je bila trta izpostavljena dolgotrajnim visokim temperaturam in sušnim razmeram. Soočamo se z daljšim obdobjem brez padavin, kar se odraža v pospešenem dozorevanju grozdja ter vpliva na razmerje med sladkorji in kislinami ter na razvoj aromatskega profila grozdja.

Podatki 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja letnika 2026, prikazani v zgornji tabeli, kažejo na intenzivno dozorevanje grozdja. Sladkorne stopnje pospešeno naraščajo predvsem zaradi dnevnih visokih temperatur in daljšega sušnega obdobja oziroma izgube vode iz jagod zaradi povečanega izhlapevanja. Kljub temu so skupne kisline zaenkrat še razmeroma visoke in pH vrednosti nizke.

Zdravstveno stanje grozdja in rezultati 1. tedna spremljanja dozorevanja grozdja predstavljajo še vedno dobro izhodišče za nadaljnje dozorevanje grozdja. Ob tem je treba poudariti, da so rezultati opravljenih meritev merodajni le za vzorčene vinograde in jih ne smemo posploševati na celotno območje. Razlike med vinogradi so lahko zaradi sorte, lege, tipa tal, obremenitve trte in vodnega režima precejšnje. Zato je treba v vsakem vinogradu posebej spremljati dozorevanje grozdja, predvsem sladkorno stopnjo, skupne kisline, pH in zdravstveno stanje, ter na podlagi vseh kazalnikov določiti optimalni rok trgatve za posamezno sorto in lego.

Naj poudarimo, da pokazatelj dozorelosti ni zgolj sladkorna stopnja. Pomembni so tudi drugi kazalniki zrelosti grozdja, med drugim kislinska sestava, aromatska zrelost, obarvanost jagod ter dozorelost pešk. Rezultati spremljanja so nam pri tem lahko pomembna opora.