

Priloga 1: Tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin**KAZALO VSEBINE**

1.	UVOD	2
2.	LOKACIJA	2
3.	RAVNANJE S TLEMI	2
4.	KOLOBAR	3
5.	SORTIMENT	4
6.	GNOJENJE OZ. PREHRANA RASTLIN	5
6.1	BILANCA HRANIL	5
6.2	ODMERKI IN APLIKACIJA DUŠIKOVIH GNOJIL VKLJUČNO Z ORGANSKIMI GNOJILI	6
7.	NAMAKANJE	7
8.	SKRB ZA PESTROST BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	7
9.	SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE	8
10.	RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS)	8
11.	OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV	10
11.1	UPORABA RASTNIH REGULATORJEV	11
11.2	UPORABA OSNOVNIH SNOVI	11
12.	INTEGRIRANO VARSTVO POLJŠČIN	13
12.1	INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT	13
12.2	INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE	35
12.3	INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA	46
12.4	INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRŠČICE	63
12.5	INTEGRIRANO VARSTVO KRMNE PESE	75
12.6	INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE	78
12.7	INTEGRIRANO VARSTVO OLJNIH BUČ	89
12.8	INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC	92
12.9	INTEGRIRANO VARSTVO KRMNEGA GRAHA	97
12.10	INTEGRIRANO VARSTVO NAVADNE SOJE	101
13.	INFO-TOČKA – INTEGRIRANA PRIDELAVA	105

1. UVOD

Tehnološka navodila so namenjena pridelovalcem poljščin in podajajo strokovne in tehnološke usmeritve za Integrirano pridelavo poljščin. Namenjena so pridelovalcem poljščin, ki so vključeni v postopek certificiranja Integrirane pridelave poljščin ter za tiste, ki iščejo strokovne informacije o pridelavi poljščin.

Ukrepi za izvajanje zahtev oziroma usmeritev v tehnoloških navodilih so razdeljeni na sledeč način:

Zahteve – pridelovalec mora predpisane zahteve obvezno izvajati po načelih dobre kmetijske prakse na kmetijskem gospodarstvu. Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi neskladje med kontrolnim pregledom na kraju samem, ga mora pridelovalec odpraviti in če je ustrezno odpravljeno, lahko organizacije za kontrolo in certificiranje izda certifikat.

Prepovedi – so kriteriji, katerih neizpolnjevanje pomeni zavrnitev izdaje ali razveljavitev že izdanega certifikata s strani certifikacijskega organa.

Priporočeni ukrepi oziroma priporočilo – so usmeritve pri izvajanju dobre kmetijske prakse na kmetijskem gospodarstvu, ki jih pridelovalec poljubno in po svojih zmožnostih izvaja v postopku pridelave poljščin. Njihovo neizpolnjevanje ne vpliva na izdajo certifikata s strani certifikacijskega organa.

2. LOKACIJA

Zahteve:

V sistemu integrirane pridelave poljščin lahko na določeni lokaciji pridelujemo le vrste/kultivarje poljščin primerne glede na klimatske značilnosti, možnosti dodatne oskrbe z vodo, lastnosti tal in reliefsa.

Priporočilo:

Glede na specifične razmere lokacije je potrebno zagotoviti dodatno protivetno varstvo in ozare za zagotavljanje biotske raznovrstnosti ter njenih pozitivnih vplivov na okolje.

Glede na lokacijo (nagnjen teren, podtalnica, odprt vodotoki,...) je potrebna še posebna pozornost glede dodatnih negativnih vplivov na okolje, kot jo predstavlja koncept integrirane pridelave v celoti (tla, kolobar, sortiment, gnojenje, varstvo rastlin, ekonomičnost pridelovanja). Na njivah, kjer je bila za določeno poljščino (npr. koruzo) v kolobarju 3 ali več let zaporedoma potrjena (npr. drugo, četrto in šesto leto v kolobarju) več kot 50 % škoda zaradi suše, ne priporočamo pridelave te poljščine.

3. RAVNANJE S TLEMI

Vse prepovedi, zahtevani ukrepi in priporočila imajo za cilj ohranjanje oziroma izboljšanje strukture tal, preprečevanje erozije tal in hranil, naravnega ravnotežja v tleh, potencialne naravne rodovitnosti tal ter zagotavljanje ugodnih talnih razmer za rast in razvoj poljščin.

Prepovedi:

- obdelava zmrznjenih tal (izjemoma so lahko tla zmrznjena do 30 % globine ornice);
- osnovna in predsetvena obdelava premokrih in presuhih tal (obdelave z rotirajočimi stroji, kot so freze, v opisanih razmerah pa tudi kolutaste brane se nasproloh izogibamo), če se s tem povzroči nastanek prašnatega sloja tal, zalizanje brazde in kot posledica zaskorjenost tal;
- na njivah je prepovedano požigalništvo, to je kurjenje žetvenih ostankov kot so slama, koruznica, itd.;
- celoletna nepokritost tal (v skladu z zahtevo po kolobarjenju morajo biti tla večji del pomladji in poletja namensko zasejana in oskrbovana, zgolj zapleveljena njiva ne izpolnjuje zahtevanega pogoja za praho);

Zahteve:

- mehansko zatiranje plevelov vsaj 1x v posameznem posevku z uporabo česal ali drugimi načini mehanske obdelave tal;
- načini rabe tal, ki dolgoročno značilno ne zmanjšujejo populacije koristnih talnih makroorganizmov (deževnikov, itd.);

- obdelovati tla tako, da se prepreči zbitost tal ter nastajanje plazine; v primeru nastanka pa izvesti ukrepe poglabljanja ornice in/ali podrahljavanja;
- obdelovanje tal, ki ohranja strukturo tal – to pomeni, da obdelujemo primerno vlažna tla (obdelava presuhih - prah in premokrih tal - blato uniči strukturo!). Posebej pazimo na prekomerno vlažnost tudi pri globinskem rahljanju tal;
- zagotavljanje zadostne vsebnosti humusa oziroma uravnovežene bilance humusa v tleh. V tleh z manj kot 2 % humusa (oz. preračunano na organsko snov preračunana iz skupnega C do 0,3 m oz. do globine ornice) je obvezno na njivi pustiti vse žetvene ostanke, sejati rastline za zeleno gnojenje in/ali prekrivne rastline in/ali vrniti na njivo odvzeto organsko snov v obliki hlevskega gnoja (vsaj dvakrat 30 t ha⁻¹ v petih letih, letna količina vnosa N iz živinskih gnojil na nivoju KMH-MIDa ne sme preseči 170 kg N ha⁻¹, oz. manj, če je z drugimi predpisi na območju tako zahtevano);
- obdelovanje tal na nagnjenih njivah prečno na pobočje (preprečevanje erozije). Erozijo tal je potrebno preprečiti s pomočjo izboljšanja strukture tal (posledica uničenja favne v tleh, pomanjkljive oskrbe tal z organsko snovjo, pomanjkanja Ca ionov in/ali neprimerne obdelave tal). Obvezna je skrb za vzpostavitev in stalno ohranjanje strukturalnih tal, nadalje pa ob vzpostavljenem stanju paziti na primerno vlažnost tal, ki se obdelujejo, s tem, da jih ne obdelujemo pozimi;
- uporabiti strategijo pridelovanja, ki temelji na zmanjšanju ostankov sredstev za varstvo rastlin (kolobar, upoštevanje pravilnika o integriranem varstvu rastlin);
- izdelati bilanco hranil, preverjati potrebe po dušiku (glej gnojenje);
- glede na teksturo tal in zahteve poljščin skrbeti za primerno pH vrednost tal (kislost ali bazičnost). Optimalna reakcija namreč zelo vpliva na dostopnost hranil za rastline in je odvisna od tekture in vsebnosti humusa, zato se določi na podlagi teh parametrov največji enkraten odmerek sredstev za kalcifikacijo. Njive s pH vrednostjo pod 4.5 (močno kisla), kar ne velja za barjanska tla, ne morejo biti v sistemu IPL, razen v primeru, če ima gospodarstvo manj kot ¼ površine njiv s pH pod 4.5. V tem primeru mora biti ukrep kalcifikacije tal izveden v prvem letu vključitve v IPL oz. v jesenskem obdobju prejšnjega leta;
- mulčenje in zaoravanje žetvenih ostankov poljščin, ki so lahko ugoden vir za razvoj škodljivcev (npr. koruza in sirek zaradi koruzne vešče) je obvezno že v jeseni, vendar ne v zmrznjena tla. V primeru obdelave tal brez pluga (konzervirajoča, direktna setev) morajo biti žetveni ostanki zdrobljeni do velikosti, ko ne omogočajo preživetja gošenic koruzne vešče.

Priporočila:

- v primeru urejenega vodno zračnega režima, primerne razpleveljenosti in razpoložljivosti strojev občasno namesto klasičnega oranja uporabiti obdelavo tal brez pluga (konzervirajočo obdelavo) ali pa direktno setev;
- opremiti traktorje in stroje s pnevmatikami oziroma nastavki, ki preprečujejo negativne vplive na zbitost tal;
- setev prezimnih in neprezimnih prekrivnih rastlin. Če je mogoče glede na tehniko pridelovanja in ranost spomladanske seteve se nepokritih njivskih površin preko zime izogibamo; preverimo pa okoljske in druge dokumente ali je omenjena nepokritost preko zime na vašem območju sploh dopustna.

4. KOLOBAR

Kolobar (vrstenje, kolobarjenje, menjavanje oz. premena, ki predstavlja obdobje mirovanja med dvema nasadoma hmelja na isti lokaciji) je sistem razvrščanja poljščin, krmnih rastlin, aromatskih rastlin in zelenjadnic, ki ga uporabljamo na njivah, vrtovih ali pokritih prostorih. Z njim ustvarjamo kar največjo racionalnost in optimalnost bioloških, organizacijskih in prostorskih vplivov na tla in rastline. S pravilnim kolobarjem želimo ob primerni tehniki pridelave kar najbolje nadomestiti biološko ravnotežje spontanih fitocenozi. Kolobar ni "recept", ampak naj predstavlja v danih razmerah najboljšo kompromisno rešitev.

Vsaka sprememba kolobarja mora biti dokumentirana, kolobar pa ponovno vzpostavljen glede na zahtevana pravila.

Prepovedi:

- prepovedano je zaporedno vrstenje glavnih posevkov posameznih poljščin in sorodnih rastlinskih vrst (isti rodovi), razen hmelja;
- korozo se lahko seje na isto njivo dvakrat v treh letih, vendar nikoli dvakrat zapored.
- njivska površina po žetvi preko poletja ne sme biti neprekrita (zastopanost zgolj absolutnih plevelov ni sprejemljiva); razen v izjemnih primerih, ko se dokaže, da so bili zaradi izsušenosti tal obdelava in setev ter pogoji za vznik semena onemogočeni. Nepokritost tal je dovoljena v primeru setve naslednje poljščine (npr. ogrščice) do dva meseca po spravilu prejšnjega posevka (npr. ozimne pšenice). V tem primeru se tla plitvo obdela po žetvi.
- prava žita se v zaporedju rž - oves - ječmen - pšenica (npr. oves in nato pšenica) ali sama s seboj (npr. ječmen - ječmen) ne smejo sejati;
- pri pridelovanju pese in križnic v kolobarju, si le-te med seboj (npr. križnica-pesa) ali same s seboj (npr. pesa - pesa) ne smejo slediti. Na isto površino jih lahko sejemo šele vsako 3. leto;

- poljščine, ki se same s seboj ne prenašajo (oves, ogrščica, koleraba, ajda, krompir in grah), sezemo oz. sadimo na isto površino največ vsako 3. leto, priporočen pa je daljši presledek; za črno deteljo in za lucerno se zahteva 3 oziroma 4 letni presledek, odvisno od tega koliko let imamo prejšnji posevek na njivi.
- vrtni mak in industrijsko konopljo smemo vključiti v kolobar le pod posebnimi pogoji (Uredbi MKGP, Uredba Ministrstva za zdravstvo).

Zahteve:

- upoštevanje vplivov poljščin v kolobarju na preprečevanje pojava bolezni in škodljivcev in neuravnoveženo bilanco hranil v tleh, ki so lahko posledica nepravilnega kolobarja;
- izdelava, upoštevanje in eventualno strokovno spremištanje načrta kolobarjenja (skupaj z gnojilnim načrtom);
- menjava vrst rastlin. Temelj kolobarja v integrirani pridelavi poljščin je, da so v 5-letnem obdobju vključene v kolobar vsaj 3 različne vrste enoletnih poljščin (oziora krmnih rastlin in semenskih posevkov, ali dve zelenjavnici v vsakem letu na isti njivi skladno s pravili kolobarjenja) ali dve enoletni poljščini + en večletni posevek (npr. detelje, deteljne - travne mešanice,...) ali ena poljščina in 4 leta lucerne.
- v obdobju 5 let je v kolobar na njivah brez gnojenja z živilskimi gnojili oziroma možnosti kroženja organske snovi v obliki živalskih gnojil, obvezno vključiti vsaj enkrat kot glavni posevek:
 - eno enoletno (enoletne zrnate stročnice in detelje) ali večletno metuljnico (večletne detelje) ali
 - strniščni dosevek (dvoletne detelje ali deteljno-travna mešanica) ali
 - prekrivni posevek (lahko prezimni ali neprezimni – glede na zakonodajo to za vodovarstvena območja ne velja)
 - in dosevek metuljnice. Prezimni posevek je lahko katerakoli rastlinska vrsta, ki čez zimo ostane zelena;
- v kolikor je v kolobar vključenih več žit zaporedoma, naj si sledijo v naslednjem zaporedju: navadna pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, pira (npr. pšenica in nato rž); po dveh ali treh letih neprekinjenega pridelovanja pa jih nato enako obdobje ne smemo pridelovati na isti njivi.
- prekrivne prezimne ali neprezimne rastline (facelija, gorjušica,...) so obvezne na vseh območjih, kjer se pojavlja vodna ali vetrna erozija in tam, kjer je koruza zastopana v kolobarju več kot 50%;
- prekrivne rastline oziroma podorine je potrebno v kolobarju šteti kot sestavni del kolobarja z negativnimi vplivi (nesprejemljiva je npr. metuljnica za metuljnico, križnica za križnico);
- posejana njiva z dobro prekrivnimi raznovrstnimi rastlinami brez namena žetve (set-aside tki. obvezna praha) oziroma košnje, je enakovreden kolobarni člen poljščini;

Priporočila:

- trave in travno deteljne mešanice naj ne bodo predposevek okopavinam, pri katerih lahko talni škodljivci (strune, ogrci,...) naredijo škodo, če so prisotni;
- vključevanje podorin in vmesnih posevkov, podsevov ali kakršnih koli drugačnih združenih setev;
- na njivah, kjer preorjemo travnje ali TDM, se pričakuje močnejši napad strun in je zaradi tega velika verjetnost zmanjšanja tržne vrednosti pridelka, se priporoča najprej ozelenitev tal z rastlinami, ki vsebujejo glukozinate, katere lahko pravočasno zadelamo in pripravimo njivo npr. za sajenje krompirja (najprimernejše rastline so križnice kot so bela gorjušica, repica, ogrščica).

5. SORTIMENT**Zahteve:**

- izbrati je potrebno rastnim razmeram prilagojene sorte, ki zagotavlja ekonomsko upravičljiv in kakovosten pridelek. Sorte morajo biti vključene v skupni katalog sort poljščin ali, če ta ne obstaja, v slovensko sortno listo (npr.: pri ajdi, prosu);
- izbrati je potrebno čimbolj tolerantne oziroma odporne sorte na bolezni in škodljivce;
- izbrati je potrebno manj zahtevne sorte glede dušika;
- za prava žita je potrebno izbrati sorte, ki imajo krajšo rastno dobo pri enakem pridelku, pri katerih so poraba dela in energije ter stroški za njihovo pridelovanje čim nižji, skladiščenje naj bo čim manj zahtevno;
- glede na želeno pridelavo izberemo sorte s specifičnimi lastnostmi (pokončni listi in možnost povečanja sklopa rastlin in izkoristka aktivne radiacije v fotosintezi, širši in povešeni listi z večjo pokrovnostjo – preprečujejo zapleveljenost,...).

Prepovedi:

- prepovedana je uporaba gensko spremenjenih sort;
- za setev/saditev je prepovedano uporabljati seme, ki ne ustreza predpisom o zdravstvenem varstvu rastlin

Priporočila:

- za setev/sajenje se priporoča uporaba uradno potrjenega (certificiranega) semena;
- za vrste za katere imamo sezname priporočenih sort se priporoča izbira sorte s tega seznama.

6. GNOJENJE OZ. PREHRANA RASTLIN

Racionalna strategija gnojenja (bilanca hranil, vnos posameznih hranil, prepoved razvažanja gnojevke pozimi,...), predvsem pa njihova kontrola/vzorčenja za svetovanje najoptimalnejšega gnojenja, lahko zmanjšajo uporabo gnojil. Izkoristek hranil in zmanjšanje vnosa hranil lahko dosežemo tudi s primernim kolobarjenjem. K zmanjšanju izpiranja nitratov preko zime lahko prispevamo z ozelenitvijo njiv preko zime s t.i. prekrivnimi rastlinami.

Gnojenje oziroma prehrana rastlin pri integrirani pridelavi temeljita na Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/2009, 5/2013, 22/15, 12/17 in 44/22), rezultatih raziskovalnega dela ter posebnih zahtev v sistemu integrirane pridelave poljščin.

6.1 BILANCA HRANIL

Bilanca hranil je ključna za nadzor vnosa hranil (P_2O_5 in K_2O) vključno z dušikom. Če ni drugih omejitev znaša mejna vrednost letnega vnosa z organskimi gnojili 120 kg $P_2O_5\text{ ha}^{-1}$, 300 kg $K_2O\text{ ha}^{-1}$ in 170 kg dušika ha^{-1} . Omejevanja letnega vnosa dušika v tla je za nekatere vrste poljščin predpisano Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22). Poleg naštetih omejitev pa se za načrtno gnojenje oz. dognanje poslužujemo, če je to mogoče, tudi ciljnih vrednosti za gnojenje z dušikom glede na analizirano stanje razpoložljivega mineralnega $NO_3\text{-N}$ ali skupnega $N_{min} = NO_3\text{-N}, NH_4\text{-N}$ v tleh. Za načrtno dognanje poljščin uporabimo strokovno sprejemljive teste, kot npr. za žita rastlinske nitratne teste, N_{min} analize ali nitratni talni test, oz. novejše pristope h gnojenju, če obstaja strokovna oz. znanstvena utemeljitev rabe le teh. Izkoristek in odmerek hranil je mogoče pri nekaterih poljščinah povečati z aplikacijo v vrsto in s počasi sproščajočimi hranili. Potrebe po hranilih lahko usmerjamo tudi s primernim kolobarjem, žetvenimi ostanki ter prezimnimi in neprezimnimi prekrivnimi rastlinami.

Zahteve:

- za načrtovanje bilance hranil je ob vsaki kontroli obvezno predložiti analizo tal (pH, humus, K_2O , P_2O_5) in izdelan načrt kolobarja z bilanco hranil za 5 let glede na odzem z načrtovanimi pridelki in stopnje založenost tal s hranili. Založenost rastlinskih hranil v tleh se analizira po AL-metodi, stopnje založenosti pa so naslednje:
 - A-slabo preskrbljena tla
 - B-srednje preskrbljena tla
 - C-dobro preskrbljena tla
 - D-pretirano preskrbljena tla
 - E-ekstremne vrednosti

Preglednica 1: Gnojilne norme za fosfor in kalij glede na različno založenost v intenzivnem poljedelstvu (primer 70 kg $P_2O_5\text{ ha}^{-1}$ oziroma 200 $K_2O\text{ ha}^{-1}$ odzem)

Razred založenosti $P_2O_5\text{ mg 100 g tal}^{-1}$	Vsakoletni odmerek $P_2O_5\text{ kg ha}^{-1}$
A< 6	100 - 120 = Odzem plus 30 – 50
B=6 – 11	90 - 100 = Odzem plus 20 – 30
C=12 – 25	80 = Odzem plus 0 – 10
D=26 – 40	940 = 50 % odzema
E>40	0 do naslednjega odzema

Razred založenosti $K_2O\text{mg 100 g}^{-1}$ tal	TLA Lahka / srednja / težka	Vsakoletni odmerek $K_2O\text{ kg ha}^{-1}$
A	< 8 <13 <15	200 + 40 do 60 = 240 do 260
B	8 – 15 13 - 19 15 - 22	200 + 20 do 30 = 220 do 230
C	16 - 25 20 - 30 23 - 33	200
D	26 - 35 31- 40 34 - 45	100
E	> 35 > 40 > 45	0 do naslednje analize

Pri izračunu je potrebno upoštevati postopen izkoristek hranil iz organskih gnojil, žetvene ostanke, organske zastirke, zeleno gnojenje. Analizo tal je obvezno ponoviti vsakih 5 let, s tem da se upoštevajo vse analize, ki so bile narejene za posamezno njivo v obdobju 4-ih let pred tem; če je vsebnost hranil analizirana po AI metodi, velja kot optimalna vrednost založenosti tal s fosforjem in kalijem stopnja C, pri kateri gnojimo le za potrebe odvzema s pridelkom. Pri ekstremnih vrednostih E, gnojenje z mineralnimi oblikami fosforja in kalija (mineralna gnojila) ni dovoljeno. Ena analiza tal lahko velja za več manjših parcel do 5 ha, če gre za podoben tip tal, vlažnostne razmere parcele, nagib in zgodovino gnojenja.

- med rastjo v primerih dvomov o nezadostni oskrbljenosti z mikro-hranili (Fe, Cu, Co, Mn, Zn, Mo, B) analiziramo rastlinski material in na podlagi rezultatov po potrebi gnojimo s foliarnimi sredstvi oziroma ustreznimi mineralnimi gnojili. Glede na oceno rastnih razmer in vizualna znamenja pomanjkanja mikro-hranil zadostuje pisni nasvet svetovalca;
- bilanco hranil, vključno z bilanco dušika za vse njivske površine, mora opraviti in s podpisom jamčiti kmetijski svetovalec oziroma strokovno usposobljena oseba, ki ima izkušnje na tem področju;
- v primeru spremembe kolobarja je potrebno izračune bilance hranil ustrezeno dopolniti.
- če koncentracija nitrata v vodi za namakanje presega 50 mg nitrata/l, je v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22) potrebno skupno količino z namakanjem dodanega dušika upoštevati pri mejnih vrednostih vnosa dušika v tla.

Prepovedi:

- Prepovedano je preseči vse zakonsko predpisane vrednosti vnosov hranil in predpisani način – termin aplikacije gnojil

6.2 ODMERKI IN APLIKACIJA DUŠIKOVIH GNOJIL VKLJUČNO Z ORGANSKIMI GNOJILI

V kolikor so dovoljeni odmerki dušika v teh tehnoloških navodilih večji, kot jih dovoljuje Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22), je vnos dušika potrebno omejiti na količine, kot jih dovoljuje omenjena uredba.

Zahteve:

- pokriti najmanj 25 % N z živilskimi gnojili ali s kolobarjem (metuljnico) in/ali z organskimi gnojili in/ali z žetvenimi ostanki in/ali z zelenim gnojenjem in/ali s prekrivnimi rastlinami;
- v letu pridelave je na 10 % njiv obvezna analiza rastlinam razpoložljivega dušika v tleh pred osnovnim gnojenjem koruze oziroma v začetnih razvojnih fazah, pravih žit pa pred 1.dognojevanjem pridelave; v primeru, da z zakonodajo ni predpisanih drugih omejitev (glej predpise in uredbe za posamezne poljščine), se smatra, da je najvišja mejna vrednost pri kateri ne dognojujemo z dušikom $21 \text{ mg NO}_3\text{-N kg}^{-1}$ tal (Bressman, preverjeno Bavec F.) do $0,3 \text{ m}$ globine tal (to predstavlja okoli $75 \text{ kg nitratnega N ha}^{-1}$ -mineralna oblika) oz. do globine ornice zadostna za pridelovanje najzahtevnejših poljščin glede N; Ciljne vrednosti in odmerke za gnojenje posameznih poljščin, ki morajo upoštevati tudi vse omejitve vnosa N v tla, je potrebno na podlagi izvedenih meritev (mineralnega $\text{NO}_3\text{-N}$ ali skupnega $\text{N}_{\text{min}} = \text{NO}_3\text{-N}, \text{NH}_4\text{-N}$ v tleh ali rastlinske nitratne teste, ob predpostavki razvoja priporočil pa tudi klorofilmerske odčitke in druge analize) pridobiti s strani ustrezne strokovne službe. Vzorce za analizo dušika v tleh je potrebno ob odvzemu shraniti v ohlajeni hladilni torbi in jih čimprej shraniti pri temperaturah nižjih od 0°C , v primeru, če jih hranimo več kot en dan pa jih zamrzni;
- v letu pridelave je na 10 % njiv obvezno za drugo in tretje dognojevanje pravih žit uporabiti rezultate hitrih rastlinskih nitratnih testov. Optimalne vrednosti dobimo na podlagi priporočil za gnojenje;
- na njivah brez uporabe živalskih gnojil in možnosti kroženja organske snovi v obliki živilskih gnojil je obvezno vključiti v kolobar vsaj enkrat eno enoletno ali večletno metuljnicu;
- živilska gnojila se morajo skladiščiti v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22);
- kompost iz lastne pridelave je potrebno skladiščiti tako, da ne prihaja do odtekanja izcedkov v podtalnico;
- biološki razgradljivi odpadki se lahko uporabljajo le v skladu z določbami Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18 in 44/22);
- upoštevati je potrebno uravnoteženo in potrebam prilagojeno oskrbo posevkov s hranili (še posebej z dušikom), da se občutljivost posevkov na okužbo s škodljivimi organizmi in poleganje ne poveča;
- aplikacija mineralnih gnojil pri okopavinah v vrste; zadelovanje lahko topnih mineralnih gnojil v tla (npr. uree);
- raba foliarnih gnojil izključno za korekcijo pomanjkanja določenega hranila ob dokazanem pomanjkanju.

Priporočila:

- uporaba počasi delajočih dušikovih gnojil;
- uporaba sodobnih postopkov za napovedovanje mineralizacije dušika;
- zmanjšanje plinskih izgub N (volatizacija in denitrifikacija) iz gnojil je mogoče doseči s primerno inkorporacijo dušikovih gnojil v tla.
- razvoz hlevskega gnoja, gnojevke in gnojnice se mora opraviti v skladu z usmeritvami, kot jih predpisuje Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22);

Prepovedi:

- prepovedano je zavesti kontrolno službo, da pristopi h kontroli integrirane pridelave poljščin brez ustreznega kolabarno-gnojilnega načrta in kontrolnih točk N_{min} (vsaj NO_3-N) v tleh (pred oz. v začetku rasti) na vsaj 10 % nem deležu števila njiv na katerih se pridelujejo glede oskrbe z dušikom zahtevnejše glavne poljščine (npr. koruza, pšenica, srednje pozni in pozni krompir); (to pomeni, da je potrebno za preostali delež 1/5 njiv (skupno 20 %) narediti letno še najmanj 10 % hitrih rastlinskih nitratnih (ob ustreznem svetovanju tudi klorofilmetrskej testov rastlin).
- prepovedana je prekoračitev gnojenja, ki ga dovoljuje Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22).
- odmerek dušika ne sme presegati vrednosti predpisanih v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22) (preglednica 2), kljub temu, da ciljne vrednosti za doseganje največjih pridelkov pri posameznih poljščinah presega te vrednosti;
- prepovedana je raba N v enem obroku, v kolikor potreba po dušiku presega 80 kg mineralnega N ha^{-1} , na vodovarstvenih območjih pa v skladu s predpisanimi ukrepi na teh območjih;

7. NAMAKANJE

Zaradi dejstva, da lahko nenadzorovana raba vode povzroči prekomerna izpiranja hrani, poslabša strukturo tal in ima lahko tudi ostale negativne vplive na okolje ter da rastlinam podobno škoduje tako presežek, kakor pomanjkanje vlage, moramo biti pri tem ukrepu še posebej pozorni.

Zahteve:

- če je za pridelovalno območje organizirana ustrezena služba, namakamo le na podlagi uradne napovedi o potrebnosti namakanja, izjemoma pa na podlagi posebnega dovoljenja te službe;
- tudi za namakanje je potrebno voditi sprotne zapise o uporabljeni namakalni normi in datumih namakanja ;
- Obroke prilagodimo razvojni fazi rastlin, tipu tal ter vremenskim razmeram. Enkraten obrok vode praviloma ne sme preseči 20 mm (le v primeru dokazljivih povečanih potreb 30 mm), skupna mesečna količina porabljene vode pa ne sme preseči dolgoletne povprečne vsote padavin namakanega območja za več kot 50 %;
- Na večjih namakalnih sistemih je obvezna predhodna organiziranost namakanja;
- sistem fertigacije (to je vnos gnojil in FFS s sistemom namakanja) je dovoljen le s strokovno pomočjo svetovalcev (v pisni obliki);
- v primeru, če koncentracija nitrata v vodi za namakanje presega 50 mg nitrata/l, je v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št.113/09, 5/13, 22/15, 12/17 in 44/22) potrebno skupno količino z namakanjem dodanega dušika upoštevati pri mejnih vrednostih vnosa dušika v tla.

Priporočila:

- Za namakanje se sme uporabljati samo okoljsko neoporečna voda (razen prekoračitev nitratov) s tem, da se upošteva pri odmerjanju gnojil tudi vsebnost nitratov v vodi, ki jo uporabljam za namakanje;
- Priporočljivo je merjenje in zapisovanje lokalnih padavin;
- Legalizacijo namakanja urediti v skladu z okoljevarstvenimi in lokalnimi zahtevami.

8. SKRB ZA PESTROST BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

Priporočila:

Raznovrstnost rastlin: Pestreža biotska raznovrstnost rastlinskih vrst je pomemben člen v ohranjanju manjše občutljivosti rastlinskih vrst na bolezni in povzročitve škod zaradi škodljivcev. To je mogoče delno doseči s prehodom iz monokulturne pridelave v sistem kolobarjenja, v katerem bo zastopanih več rastlinskih vrst pa tudi medvrstnih ali sortnih mešanic. Posledično je cilj zmanjšana poraba sredstev za varstvo rastlin in bolj racionalno gnojenje.

Mikro favna: Negativni vpliv na talno favno zmanjšuje raba zmanjšanih odmerkov najmanj toksičnih sredstev za varstvo rastlin ter splošno zmanjšanje njihove uporabe. Na favno ima vpliv tudi način obdelave tal (konzervirajoča obdelava, direktna setev, ...).

Makrofavna: Izbor ustreznih FFS ter priporočeni način rabe lahko zmanjšajo pogine ptic, ježev, žab, krastač, rib in številnih koristnih živalskih členov v tleh (npr. deževnikov).

Prosto živeče živali: Zeleni poljski robovi, ki jih zaraščajo trave in druge zeli, včasih tudi grmovje in posamezno drevje, so zelo primerno gnezdišče in pribrežališče za številne prosto živeče živali, kot so ptice in mali sesalci pa tudi za številne zaželene žuželke, kot so na primer plenilski hrošči. Poljski rob lahko izpolnjuje funkcijo bogatega živiljenjskega prostora, če je širok vsaj 1 m. Zeleni poljski rob lahko predstavlja tudi prehod med obdelovalno površino in živo mejico.

Koristne žuželke: Uporaba koristnih žuželk je alternativna možnost kemijskemu zatiranju škodljivih organizmov, to je nezaželenih žuželk, pršic, nematod in drugih. Gre za biotično varstvo, pri katerem naravni sovražniki vzpostavijo ravnotesje s škodljivimi vrstami. Tak način varstva pridelka pa bo učinkovit le, če bo število naravnih sovražnikov dovolj veliko in bo že v prvih fazah rasti kulture preprečevalo množični razvoj škodljivcev. V severnih deželah EU so sonaravno usmerjeni kmetovalci uvedli robove za koristne žuželke, v zameno za izgubljene zelene robove polj, ki so izginila ob stopnjevanju intenzivnosti kmetovanja in združevanju poljskih kompleksov v monokulture. Rob za koristne žuželke je 0,5 m visok in 1,5 do 2 m širok nasip na robu obdelovalne površine, preraščen s šopasto travo (na primer pasjo travo *Dactylis glomerata*). Rob nudi optimalne razmere za prezimovanje zaželenih žuželk ter gnezdenje talnih gnezdljk v spomladanskem času. Nasipe pripravimo tako, da skupaj naorjemo dve ali štiri brazde. Zasejemo jih lahko bodisi spomladi ali v jeseni. Najprimernejše je ročno sejanje pri porabi semena 3g m⁻², pri čemer lahko seme zmešamo s peskom ali z drobnim kamenjem, da dosežemo enakomernejšo porazdelitev semena.

Cilj vzdrževanja je obdržati travnato vegetacijo s staro posušeno travo in z nekaterimi cvetnicami ter preprečiti razvoj nizkega grmovja in agresivnih plevelov. To je mogoče doseči s košnjo nezaželenega rastja enkrat letno, v primeru nevarnosti semenjenja semenkih plevelov pa tudi pogosteje. Zaradi funkcije pri biotičnem varstvu je potrebno zeleni poljski rob in rob za koristne žuželke vzdrževati tako, da s kemičnimi sredstvi ne porušimo naravnega ravnotesja.

Ohranjanje kulturne krajine: Način pridelovanja ima lahko več vrst vplivov na spremembo krajine. Izgled kulturne krajine zelo osiromašuje monokulturno pridelovanje, kar se da preprečiti s kolobarjenjem namenoma zasajenih/zasejanih robov njiv (zeleni poljski rob, mejice, vetrna zaščita).

9. SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE

Zahteve:

- skladiščiti in voditi evidenco o skladiščenem pridelku tako, da je mogoč nadzor in sledenje pridelane količine.

Priporočila:

- poleg splošnih tehnološko skladiščnih zahtev za posamezno rastlinsko vrsto oziroma sortiment je potrebno skrbeti še za: preprečevanje razširjanja plevelov s stroji in opremo ter skrbeti za preprečevanje razvoja skladiščnih škodljivcev;
- skrbeti za higieno v obdobju skladiščenja, predvsem pa preprečiti dostop domačim in divjim živalim, kakor tudi glodalcem;
- redno kontrolirati skladiščeno blago in izvajati dovoljene - potrebne ukrepe za preprečevanje škode;

10. RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS)

Pri uporabi FFS je potrebno dosledno spoštovati vse predpise, ki urejajo to področje.

Zahteva:

- Pridelovalec mora pri uporabi FFS upoštevati določbe zapisane na etiketi in v navodilu za uporabo posameznega FFS.

- Aplikacija FFS mora biti prilagojena stanju vegetacije in izvedena v skladu z dobro kmetijsko prakso iz varstva rastlin ob upoštevanju določil Pravilnika o pravilni uporabi FFS (Ur. L. RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22) ter navedb v navodilih za uporabo FFS.

Poskrbeti je treba, da je izguba škropiva zaradi zanašanja, izhlapevanja ali odtekanja kapljic na tla čim manjša.

Pomembno je tudi pravilno shranjevanje FFS ter ravnanje z njihovimi odpadki oziroma odpadno embalažo.

Poklicni uporabniki FFS morajo upoštevati določbe Pravilnika o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. I. RS 43/2014).

Za izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi mora poklicni uporabnik FFS za zagotavljanje zdrave rasti rastlin in obvladovanje škodljivih organizmov optimalno kombinirati preventivne ukrepe varstva (na primer: kolobar, uravnoteženo gnojenje, izbira lokacije, setev neokuženega semena,...), metode varstva rastlin z nizkim tveganjem (na primer: mehansko zatiranje plevelov, mehansko odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin ali delov rastlin ali škodljivih organizmov, uporaba FFS na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in snovi z nizkim tveganjem, uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, uporabo osnovnih snovi, uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje) ter uporabo FFS.; Pridelovalec mora svoje posevke redno pregledovati, spremljati pojav in razvoj škodljivih organizmov in nato na podlagi lastne presoje in izkušenj izbere najprimernejšo metodo varstva rastlin.

Cilj integriranega varstva rastlin je zagotavljanje zdrave rasti rastlin in obvladovanje škodljivih organizmov z optimalno kombinacijo preventivnih ukrepov, metod varstva rastlin z nizkim tveganjem ter strokovno utemeljeno uporabo FFS. S strokovno utemljenim in odgovornim pristopom k varstvu rastlin zmanjšujemo negativne vplive in tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Zahteve:

- izvajalec varstva rastlin mora biti ustrezno strokovno usposobljen o rabi FFS, kar dokazuje z veljavnim potrdilom o pridobitvi znanja iz fitomedicine,
- za aplikacijo FFS se uporablajo tehnično brezhibne in redno pregledane naprave za nanos FFS,
- za zatiranje plevelov je v glavnih posevkih treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje-plamen, vodna para,...) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.
- v posevkih pravih žitih je treba vsaj enkrat letno uporabiti česala (mehansko zatiranje plevelov).
- redno spremljanje pojava in razvoja škodljivih organizmov,
- najprimernejšo metodo varstva rastlin za zatiranje škodljivih organizmov izbere na podlagi lastne presoje in izkušenj ob upoštevanju prognostičnih obvestil Javne službe zdravstvenega varstva rastlin,
- pri odločjanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba obvezno upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme za poljščine, za katere ti pragovi obstajajo.
- razvoj odpornosti škodljivih organizmov je treba upočasnit z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja. Kjer so dostopne alternative, je obvezna uporaba pripravkov z različnimi načini delovanja za isto vrsto škodljivega organizma.
- sprotno vodenje evidenc o uporabi FFS v kmetijski pridelavi ter izvajanju metod z nizkim tveganjem.
- uporaba rastnih regulatorjev ni dovoljena.
- potrebna je obvezna strokovna usposobljenost o rabi FFS in veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin;
- izbrati primeren rok setve in sajenja, ki ne pospešuje razvoja škodljivih organizmov in združevati nekemične in kemične oblike varstva rastlin.
- za zatiranje plevelov je obvezen vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje-plamen, vodna para,...) ali aplikacija herbicidov samo v vrste. Za prava žita je treba vsaj enkrat letno uporabiti česala;
- uporabljati brezhibne in redno pregledane naprave za nanašanje FFS;
- izvajati ustrezno oskrbo za posamezna rastišča in razmere, vključno s higieniskimi ukrepi, ki zagotavljajo zdrave posevke in preprečujejo razširjanje plevelov v okolici;
- z ukrepi zadrževati škodljive organizme pod pragom gospodarske škodljivosti, oziroma le-te kemično zatirati, šele ko je dosežen gospodarski prag škodljivosti;
- upoštevati vrsto rastline in rastne razmere ter specifične značilnosti za nadaljnji razvoj škodljivih organizmov in izkušnje iz prejšnjih let in napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin;
- uporabiti ustrezno FFS, registrirano za izbrano rastlino in škodljivi organizem, uporabiti pa najnižji predpisani odmerek, potreben za specifične rastne razmere, škodljive organizme, razvojno fazo rastlin in škodljivih organizmov, ki je predvidena v navodilu za uporabo;
- ob uporabi upoštevati navodila za uporabo FFS in vse dodatne omejitve o uporabi FFS s čimer se zagotovlja varnost izvajalcev varstva rastlin, potrošnikov in okolja;

- upočasniti razvoj odpornosti škodljivih organizmov z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja ter upoštevanjem največjega dovoljenega števila tretiranj in časovni interval med njimi;
- pravočasno tretirati posamezne dele njiv, kjer se pojavi 'gnezda' škodljivih organizmov, da bi se tako izognili potrebnemu škropljenju celotnih posevkov;
- voditi evidenco o uporabljenih FFS (še posebej obvezni so ažurni zapisi o datumih uporabe FFS in spravila pridelka).

MOŽNOST IZVAJANJA IZREDNIH PRIDELOVALNIH UKREPOV

V sistem integrirane pridelave vključeni pridelovalci lahko zaprosijo kontrolne organizacije ali člane strokovne delovne skupine za integrirano pridelavo poljščin, za izvedbo ukrepov, ki niso dovoljeni ali uporabo FFS, ki niso vključeni v vsakokratna tehnološka navodila. Izredni ukrepi se nanašajo na spremembe v tehnologiji obdelovanja tal, gnojenja, kolobarjenje in uporabe FFS v posebnih in občutno spremenjenih pridelovalnih razmerah (naravne ujme, propad posevkov, nenaden pojav škodljivcev in bolezni, ...).

V primeru, da se v določenem letu pokaže nujna potreba za uporabo FFS, ki v teh tehnoloških navodilih ni dovoljeno, je pa FFS v RS registrirano oziroma je zarjazano izdano dovoljenje za nujne primere, se le-to lahko izjemoma uporabi ob pogoju, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na osnovi soglasja vsaj dveh članov strokovne delovne skupine, ki sta zadolžena za varstvo poljščin, izda posebno dovoljenje za izredni ukrep in o tem takoj obvesti organizacijo za kontrolo, pristojne inšpekcije in pridelovalca poljščin oziroma pridelovalce poljščin, v primeru, da gre za dovoljenje za izredni ukrep na širšem območju.

UPORABA FFS V POSEVKIH, KI NISO NEPOSREDNO OBRAVNAVANI V TEHNOLOŠKIH NAVODILIH

Pridelovalci vključeni v integrirano pridelavo poljščin lahko v kolobar uvrstijo tudi poljščine, ki jih ne obravnavajo tehnološka navodila. Pri izvajanju varstva rastlin v teh poljščinah smejo pridelovalci uporabljati vsa FFS, registrirana v RS za varstvo teh poljščin, v skladu z navodili za uporabo, dobro kmetijsko prakso in ob upoštevanju vseh drugih omejitve (npr. omejitve za vodovarstvena območja).

UPORABA FFS, KI JIM V LETU PRIDELOAVE POTEČE ODLOČBA O REGISTRACIJI IN BODO NA NOVO REGISTRIRANA PO OBJAVI TEHNOLOŠKIH NAVODIL V SLOVENIJI

Pridelovalci vključeni v sistem integrirane pridelave poljščin smejo uporabljati le FFS, ki so navedena v tehnoloških navodilih. V tehnološka navodila se smejo vnesti le FFS, ki so v času izdaje tehnoloških navodil registrirana v Republiki Sloveniji za predvideno uporabo. Sredstva, ki so navedena v tehnoloških navodilih in jim med letom poteče registracija, pridelovalec lahko uporablja do zaključka rastne dobe, razen v primeru, če drugače ne odredi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR).

Vse nove FFS, ki se na trgu pojavijo po izdaji vsakoletnih tehnoloških navodil, smejo pridelovalci v letu registracije uporabljati skladno s pogoji registracije in navedbami v navodilu za uporabo novega FFS, četudi ti FFS ne bodo navedeni v tehnoloških navodilih. Pred vsakoletno izdajo revidiranih tehnoloških navodil za naslednje leto se bodo člani strokovne skupine odločili o vpisu teh FFS v preglednice tehnoloških navodil. Če določeno FFS zaradi strokovnih zadržkov ne bo vpisano, se v sistemu integrirane pridelave v naslednjem letu (drugo leto po registraciji FFS) ne bo smelo uporabljati.

Enako načelo velja za FFS, ki jim prav v času vsakoletnega revidiranja tehnoloških navodil poteče registracija ali rok za odprodajo zalog po preteku registracije, registracija pa se jim v teknu rastne dobe znova podaljša zaradi obnovljenih registracijskih postopkov.

11. OPAZOVANJE IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Podlaga za odločanje o zatiralnih ukrepih v IPL je analiza pragov škodljivosti, vremenskih razmer in splošnih lastnosti posamezne sorte poljščine. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin izvaja naloge s področja spremeljanja, opazovanja in napovedovanja pojava bolezni in škodljivcev rastlin (prognoza škodljivih organizmov). V okviru prognoze javna služba obvešča pridelovalce zelenjave in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje bolezni in škodljivcev rastlin.

Ker so roki zatiranja postavljeni za celotno regijo, se stanja mikrolokacije v regiji razlikujejo: nekatere prehitevajo razvoj, druge zaostajajo. Zato mora pridelovalec sam redno preverjati dogajanja v svojih posevkih, če želi ukrepe varstva rastlin izvesti v zares optimalnih rokih. Pridelovalci, ki imajo večje površine zahtevnejših poljščin (vrtnine, krompir, ...) tudi sami investirajo v opremo za meritve temperatur, zračne vlage, padavin,... saj so jim ti podatki v pomoč pri načrtovanju gnojenja, namakanja, izvajanju ukrepov varstva rastlin, spravila pridelkov...

Pri odločjanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba obvezno upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme za poljščine, za katere ti pragovi obstajajo.

Napovedi kot »Prognoščna obvestila« so dostopne na Agrometeorološkem portalu Slovenije (<http://agromet.mkgp.gov.si/APP2/sl/Home/Index>), na telefonskih odzivnikih in spletnih straneh posameznih ustanov. Brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, oljk, hmelja, vrtnin ali poljščin si lahko naročite tudi po elektronski pošti ali na SMS sporočila.

Informacije glede določenih bolezni in škodljivcev:

Območje	Ustanova	Telefonska številka (T)	Pisne informacije
Osrednja Slovenija in Splošne napovedi za vso Slovenijo	Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17 1000 Ljubljana	T: +386(0)1 280 5262	info@kis.si Kmetijski inštitut Slovenije
Severovzhodna Slovenija	Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Vinarska ulica 14, 2000 Maribor	T: +386(0)2 228 4900	info@kmetijski-zavod.si KGZS Zavod MB
Celjska in Koroška regija	Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Cesta Žalskega tabora 2 3310 Žalec	T: +386(0)3 712 1600	tainistvo@ihps.si Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Zahodna Slovenija	Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica	T: +386(0)5 335 1200	info@go.kqzs.si Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Jugovzhodna Slovenija	Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto Smihelska cesta 14 8000 Novo mesto	T: +386(0)7 373 0570	tainistvo@kgzs-zavodnm.si Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

11.1 UPORABA RASTNIH REGULATORJEV

Zahteva:

- Uporaba rastnih regulatorjev ni dovoljena.

11.2 UPORABA OSNOVNIH SNOVI

V integrirani pridelavi je tudi možna uporaba osnovnih snovi za varstvo rastlin. Osnovne snovi, ki se lahko uporabljajo za varstvo rastlin, so tiste, ki niso problematične, ne povzročajo motenj hormonskega ravnovesja in nimajo nevrotoksičnih ali imunotoksičnih učinkov. Odobrene so za druge namene in se običajno ne uporabljajo za varstvo rastlin in ne dajejo v promet kot fitofarmacevtska sredstva (FFS), vendar so kljub temu koristne za varstvo rastlin, bodisi neposredno bodisi v

pripravkih, ki so sestavljeni iz osnovnih snovi in enostavnih razredčil. Za osnovne snovi se lahko štejejo snovi, ki izpolnjujejo merila za živila. Seznam je dostopen na: <https://www.gov.si/teme/osnovne-snovi-za-varstvo-rastlin/>.

12. INTEGRIRANO VARSTVO POLJŠČIN

Sredstva označena z zeleno barvo so dovoljena v ekološki pridelavi.

12.1 INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT

(j-ječmen; o-oves; pi-pira; p – pšenica; r-ž, t-tritikala)

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Žitna pepelovka <i>Blumeria graminis</i>	Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih hitro in temeljito zaoravanje žetvenih ostankov - setev manj občutljivih sort izolacija med jarimi in ozimnimi posevki - zmerno gnjenje z duškom - širok kolobar - primerena gostota posevka optimalen, ne prezgodnja setev ozimin	tetrakonazol tebukonazol	Eminent 125 EW (p) Folicur EW 250 (p,j,o,r) Orius 25 EW (j,p,r,t)	1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	35 dni 42 dni Čas uporabe	Uporaba 1x v sezoni. Uporaba 2x v sezoni.	
Opis bolezni: Pepelovka je bila v preteklosti zelo pogos bolezen žit, danes se pojavlja le v manjšem obsegu. Nevarna je bila predvsem na pšenici in ječmenu, manj na ovsu in rži. Gliva se lahko preko zime ohraní v obliku micelija na rastlinicah, ki so se okužile jeseni, kmalu po vzniku. Lahko se ohani tudi v obliki spolnih plodišč (kleistotecijev), ki so na ostankih slame.			Buzz Ultra DF (p) Bounty (p,j)	0,33 kg/ha 0,6 l/ha	35 dni 35 dni		
			Tebušha 25%EW (p,j, r, t)	1L/ha	35 dni	Uporaba 1x v sezoni.	
			Zantara (p,j,t,r,o)	1,5 l/ha	35 dni	Uporaba 2x v sezoni.	
			Cayunis (p, j, t, r)	1 l/ha	Čas uporabe		
Žveplo			Vindex 80 WG (p, j, t, r) Pepelin (p,j,r,t)	5 - 7,5 kg/ha 5 - 7,5 kg/ha	35 dni 35 dni	Uporaba 1x 2x v sezoni.	
			Thiovit jet (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35 dni		
			Kumulus DF (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35 dni		
			Microthiol SC (p, j, t, r)	5 - 7,5 l/ha	35 dni		
			Microthiol special (p, j, t, r)	5 - 7,5 kg/ha	35 dni		

<p>jeseni po setvi ozimim preidejo narje. Ta način prenosa bolezni označujemo z izrazom prenos preko "zelenega mostu".</p> <p>Pospesjen razvoj gostrega belkastega micelija na površini najnizjih listov se prične spomladji pri temperaturah nad 13 °C. Nato se okužbe polagoma širijo vse do klasov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pepelovki ugaja visoka zračna vlaga in temperature od 16 °C do 22 °C. Gosta setev in obilno gnojenje značilno povečata napad. <p>Kadar posejemo jare posevke v neposredno bližino ozimnih posevkov lahko pricakujemo povečan napad pepelovke in drugih bolezni na njih.</p> <p>Belkast micelij na listih in drugih organih je osnovni razpoznavni znak te bolezni. Pojavijo pa se lahko tudi znamenja, ki so posledica hipersegmentne reakcije rastlin na povzročitelja in so povezane z odpornostjo. Pri nekaterih sortah (pogosteje pri ječmenu), se rastline branijo tako, da celice na mestu, kjer povzročitelj prodre v gostitelja, odmrejo (nastopiti celična smrt). Na teh mestih lahko opazimo le drobne nekrotične pege, ki pa niso pokrite z belim micelijem.</p>	Microthiol disperss (p,j,t,r)	5 – 7,5 kg/ha	35 dni
	Cosan (p,j,o,t)	5 – 7,5 kg/ha	35 dni
	Vertipin (p,j,o,t)	6 l/ha	3 dni
	Sulfar (p,j,t,r)	5 – 7,5 kg/ha	35 dni
	Prosaro (p,j,r,t)	1 l/ha	35 dni
	prokvizid + protiokonazol	1 L/ha	35 dni
	protiokonazol+spiroksamin+trifloksistrobin	1,2-1,5 L/ha	42 dni
	Verben (p,r,t)	1 L/ha	Uporaba le 1x v sezoni.
	Delaro Forte (p,j,r,t)	1,2-1,5 L/ha	Uporaba le 1x v sezoni.
	protiokonazol + spiroksamín	Input (staro ime Prosaro plus) (p,j,o,t)	42 dni
<p>Belkast micelij na listih in drugih organih je osnovni razpoznavni znak te bolezni. Pojavijo pa se lahko tudi znamenja, ki so posledica hipersegmentne reakcije rastlin na povzročitelja in so povezane z odpornostjo. Pri nekaterih sortah (pogosteje pri ječmenu), se rastline branijo tako, da celice na mestu, kjer povzročitelj prodre v gostitelja, odmrejo (nastopiti celična smrt). Na teh mestih lahko opazimo le drobne nekrotične pege, ki pa niso pokrite z belim micelijem.</p>	protiokonazol	Protendo 300 EC (p,j,r,t)	Uporaba le 1x v sezoni.
	prokloraz + tebukonazol	Pecari 300 EC (p,j,r,t)	Uporaba le 2x v sezoni.
	Zamir (p,j,r,t)- v uporabi do 30.6.2023	0,65 l/ha	35 dni
	azoksistrobin	Tazer 250 SC (p)	Uporaba le 2x v sezoni.
	Chamane (j,r,t,o)	0,8 l/ha	Uporaba le 2x v sezoni.
	Norios (j,r,t,o)	1 l/ha	Uporaba le 2x v sezoni.
	fluksapiroksad+ metkonazol	Librax (p,j,t)	Uporaba le 2x v sezoni.
	fluksapiroksad	Imtrex XE (p,j,r,t,o)	Čas uporabe
	difenkonazol + fluksapiroksad	Brivela (p)	uporabe
	azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (p,j,t)	56 dni
<p>Belkast micelij na listih in drugih organih je osnovni razpoznavni znak te bolezni. Pojavijo pa se lahko tudi znamenja, ki so posledica hipersegmentne reakcije rastlin na povzročitelja in so povezane z odpornostjo. Pri nekaterih sortah (pogosteje pri ječmenu), se rastline branijo tako, da celice na mestu, kjer povzročitelj prodre v gostitelja, odmrejo (nastopiti celična smrt). Na teh mestih lahko opazimo le drobne nekrotične pege, ki pa niso pokrite z belim micelijem.</p>	piraklostrobin + fluksapiroksad	Priaxor EC (p,j,t)	Uporaba le 1x v sezoni.
	biksafen + fluopiran + protiokonazol	Ascra xpro (p,r,t,j,o)	Uporaba le 2x v sezoni.
	biksafen + protiokonazol	Silitra xpro (p,t,j,r,o)	Čas uporabe
	metrafenon	Flexity (p,j,o)	uporabe
	mefentriflukonazol+	Revycare (o)	35 dni
	piraklostrobin	Revystar (p,pr,o)	Uporaba le 2x v sezoni.
	mefentriflukonazol		Uporaba le 2x v sezoni.

Mefentrifukonazol + fluksapiroksad fenpropidin	Revystar XL (f) Tern (p)	1,5 l/ha 0,75 l/ha	35 dni 35 dni	Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 1x vsezoni.
boskalid + krezoksim-metil	Emparis (p, t, o)	1,5 l/ha	56 dni	Uporaba le 2x v sezoni.

Tehnika zatiranja:

Če je potrebno izvedemo eno do dve aplikaciji fungicidov, glede na stanje v posevku in okoljske razmere. Izbor pripravkov prilagodimo tako, da za prvo in drugo škropljenje ne uporabljamo istih aktivnih snovi.

V obdobju med kolenčenjem in cvetenjem žit (BBCH 32 – 61) redno pregledujemo posevke. Prag škodljivosti določimo na sledeč način: po diagonalni prehodimo njivo in poberemo 40 bili- Na vsaki pregledamo zgornje tri odvite liste in presežemo rastline z bolezenskimi znamjenji. Prag škodljivosti je presežen, če ima 50-60 % rastlin bolezenska znamena. Vir: KIS, IVR portal.

**INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o,-oves; pi-pira; p - pšenica; r-rž; t-tritikala),
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!**

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Snežna plesen <i>Monographella nivalis</i> (sin. <i>Microdochium niveale</i>)	Opis bolezni: Ko po dolgi in s snegom bogati zimi sneg pozno spomladni skopni, opazimo velike otroke ostankov segnith bilk, ki so prepredeni z belkasto rožnatim micelijem glive. Gliva za svoj razvoj potrebuje z vlago zasičeno okolje in temperature od 4 do 5 °C. Prav takšni pogoj so ob koncu zime pod snežno odejo.		Tehnika zatiranja: Snežno plesen zatiramo s setvijo razkuženega semena. S tem lahko značilno ublažimo okužbo in preprečimo izgube pridelka. Zgodnja in zelo gosta setev poveča možnosti za povečan izbruh bolezni. Prizadete posevke spomladni čim bolje oskrbujemo, da si rastline, ki niso propadle do konca čim prej opomorejo. V redčenih posevkah boj skrbno zatiramo plevete. Pojav snežne plesni lahko zamenjam s pojavi gliv iz rodu <i>Typhula</i> (snežni ožig), proti katerim prav tako ne poznamo uspešnega kemičnega varstva. Poleg snežne plesni povzroča gliva <i>Monographella nivalis</i> na žilih tudi listno pegasost, ki jo podobna seporijski listni pegasost. Bolezen je pogosteješa v hladnih in deževnih pomladih. Za zatiranje snežne plesni na pšenici, rži in tritikali je pri nas registriran pripravek Prosato (protoikonazol, tebukonazol) v odmerku 1 l/ha in pripravek Zantara (biksafen, tebukonazol) v odmerku 1,5 l/ha.				
Rjavenje pšeničnih plev <i>Septoria nodorum</i>	Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih - hitro in temeljito zaoravanje slame		<i>Polyversum (p,j,t,r,o) A</i>	0,1 kg/ha	1 dan		
Pšenična listna pegasost <i>Zymoseptoria tritici</i> (<i>Septoria tritici</i>)	- setev manj občutljivih sort - izolacija med jarimi in ozimnimi posevki - razkuženo seme		mefentriflukonazol	Revistar (p,pi,t) C	1,5 l/ha	35 dni	Uporabale 2x v sezoni.
			mefentriflukonazol + fluksapiroksad	Revistar XL(p, t) C	p 0,75-1,5 l/ha t 1,5 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
			prokvinazid + protiokonazol	Verben (p,t) C	1 l/ha	35 dni	Uporaba le 1x v sezoni.
		OPOMBE:					
		A- registrirano za zatiranje pšenične listne pegasosti in rjavenja pšeničnih plev. B- registrirano samo za zatiranje rjavenja pšeničnih plev C - registrirano samo za zatiranje pšenične listne pegasosti					
		Opis bolezni: Glivi, ki povzročata pšenično listno pegasost in rjavenje pšeničnih plev sta si do neke mere podobni, vendar se razlikujejo tako glede ekoloških potreb za razvoj kot tudi glede znamenj in delov rastlin, ki jih okužujejo. Obe se pojavaljata predvsem na pšenici in tudi drugih žitih. Obe glivi se lahko ohranjata tudi na ostankih slame ali pa na semenu.					
			mefentriflukonazol+pirak lostrobin	Revycare (p,t) C	1,5 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
			fluksapiroksad+mefentrif lukonazol	Revytrex (p,t) C	1,125 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
			protoikonazol	Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p,t) C	0,65 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.
				Tartaros (p,t) C	0,65 l/ha	Čas uporabe	
				Protendo 300 EC (p, t) A	0,65 l/ha	35 dni	
				Pecari 300 EC (p, t) A	0,65 l/ha	35 dni	

Gliva povzročiteljica pšenične listne pegasosti (*S. tritici* = *Zymoseptoria tritici*) se razvija že pri nizkih temperaturah.

Znamenja prvih okužb lahko opazimo že zgodaj spomladji, med razrastanjem žit. Na listih se pojavijo ovalne pege svetlo rjave barve. Sredina peg potemni, na odmirem (kvu se oblikujejo drobna črna trosnišča (plknidiij).		Procer 300 EC (p, t) C	0,65 l/ha	Čas uporabe	
Gliga povzročiteljica rjavaanja pšeničnih plev (<i>S. nodorum</i> = <i>Stagnospora nodorum</i>) potrebuje za hiter razvoj nekoliko višje temperature (vsaj 18 do 22 °C). V začetnem delu rastne dobe živi na listinih nožnicah in na sieblih, med klasenjem se naselei na plevice in na zrnje. Množičen pojav rjavaanja plevic lahko pričakujemo, če v času cveterja in mlečne zrelosti pada veliko dežja in so visoke povprečne dnevne temperature (nad 20°C). Pege na listih so pri obej povzročiteljih. Med seboj ju lahko zanesljivo ločimo le z mikroskopskim pregledom. Znamenja, ki jih obe bolezni povzročata na pšenici lahko zamenjamo z <i>Drechslera tritici-repentis</i> ali <i>Cochliobolus sativus</i> . Pojavljanje obeh gliv je pri nas slabo preučeno. Gospodarski pomen je veliko manjši kot pri zgornjih dveh povzročiteljih.	fluksapiroksad+piraklost robin fluksapiroksad	Promino 300 EC (p, t) C Praktis (p) C Cactai (p, t) C Mizona (p,pi) C Imtrex XE (p, t) C	0,65 l/ha 0,8 l/ha 0,65 l/ha 1 l/ha 2 l/ha	Čas uporabe 35 dni ČU 35 dni Uporaba 2 x v sezoni Uporaba le 2x v sezoni	
Ozek kolobar in slab zaoranje ostankov slame ima zelo velik vpliv na razvoj teh dveh bolezni. Septorijske glive lahko na ostankih slame zelo dolgo živijo v saprofitskem stadiju. Podrobnejše opise bolezni in fotografije lahko najdete na strani www.lvr.si/skodljivec/rjavaanje-psenicnih-plev/ in www.lvr.si/skodljivec/psenicna-listna-pegovost/	protiokonazol + spiroksamín fluksapiroksad + tebukonazol fluksapiroksad + piraklostrobin difenokonazol + fluksapiroksad difenokonazol protiokonazol+spiroksa min+trifloksistrobin metkonazol	Input (staro ime Prosaro plus) (p, o, t) C Librax (p, t) C Input (staro ime Prosaro plus) (p, o, t) A Eminent 125 EW (p) A Magnello (p) A Mirador forte (p-A; t,j-C) Priaxor EC (p, t) C Brivela (p) C Greteg (p,pi,t) C Delaro Forte (p-A, t-C)	1,25 l/ha 1,33 – 2 l/ha 1,33 – 2 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1,5 – 2 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha 0,5 l/ha 1,2-1,5 L/ha	Čas uporabe 42 dni Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.	
Tehnika zatiranja: Prvi ukrep pri zatiranju obeh bolezni je uporaba razkuženega semena, ki pa lahko prepreči le zgodnje okužbene pa razvoja gliv pozneje med rastno dobo. Zatiranje bolezni temelji na rabi fungicidov. Če je potrebno izvedemo eno do dve, izjednoma tri aplikacije fungicidov, odvisno od stanja v posevku in okoljskih razmer. Za razvoj bolezni so nevarna predvsem nekajdnevna deževna obdobja, ko je listje mokro več ur.	protiokonazol+tebukona zol tebukonazol	Tebusha 25% EW (p, t) B Prosaro (p, t) A Metso (p) C Tebusha 25% EW (p, t) B Orius 25 EW (p) C Buzz Ultra DF (p) C Bounty (p, t) C Elatus Era (p, pi - A ; t-C) benzovindiflupir+protiol onazol	1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,33 kg/ha 0,6 l/ha 1 l/ha	Čas uporabe 35 dni Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni. Čas uporabe 35 dni Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.	
V obdobju med kolenčenjem in cvetenjem žit (BBCH 31 – 61)					

redno pregledujemo posevke. Ali je dosežen prag škodljivosti določimo na sledeč način: po diagonalni prehodimo nivo, poberemo 100 rastlin in preštejemo rastline z bolezenskimi znamenji.	benzovindiflupir biksafen + tebukonazol azoksistrobin	Elatus Plus (p, pi - A ; t- C) Zantara (p, t) A Tazer 250 SC (p) A Ortiva (p, j, r, t) B Zafra AZT 250 SC (p, j, r, t) B Mirador 250 SC (p, j, r, t) B Amistar (p, j, r, t) B Chamane (p) A Zoxis 250 SC (r, p, t) C Velostar (p) B Noris (p) A prokloraz + tebukonazol do 30.6.2023 prokloraz biksafen + fluopiram + protiokonazol biksafen + protiokonazol biksafen + spiroksamín + trifloksistrobin boskalid + krezoksamín - metil žveplo	0,75 l/ha 1,5 l/ha 0,8 l/ha 1 l/ha 6 l/ha	42 dni 35 dni 3 dñi	Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.
Prag škodljivost je presežen, če je v obdobju med 2 kolencem in pojavom zastavčarja (BBCH 32 in 37) od 20 do 30% rastlin z znamenji okužb na četrtem najmlajšem listu. Ali če je v razvojni fazi od razvilegazastavčarja do začetka cvetenja (BBCH39-61) 10 do 20% rastlin okuženih. Vir: KIS, IVR portal.					
Drugo škropiljenje se izvede glede na padavinske razmere. Potrebno ga je izvesti, če po prvem škropiljenju pride obdobje z nekajdnevnimi obilnejšimi padavinami. Škropiljenje se izvede po preteklu dveh do treh tednov od predhodnega škropiljenja.					
Drugo škropiljenje se običajno izvede v terminu, ko se zavaruje tudi klas (obdobje od konca klaseњa do sredine cvetenja).					

**INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o,-oves; pi-pira; p - pšenica; r-rž; t-tritikala),
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!**

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	RASTLIN	SREDSTVO ZA VARSTVO	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Ječmenov listni ožig <i>Rhynchosporium secalis</i>	- setev zdravega (certificiranega) semena setev manj občutljivih sort hitro in temeljito zaoranjanje žetvenih ostankov	tebukonazol	Folicur EW 250 (j, r) - C Bounty (j, r) -C Orius 25 EW (j) B	1 l/ha 0,6 l/ha 1 l/ha	42 dni 35 dni Čas uporabe	A - registrirano za zatiranje obeh bolezni		
Ječmenova mrežasta pegavost <i>Pyrenophora teres</i>	- izolacija med jarimi in ozimnimi posevkami - ne sejaj ječmena za ržjo	benzovindiflupir	Elatus Plus (j-A; r, t-C)	0,75 l/ha	Čas uporabe r,t - 42 dni	C- registrirano za zatiranje ječmenovega listnega ožiga		
Opis bolezni: Ječmenova mrežasta pegavost se lahko prične razvijati že v jeseni ali zgodaj spomladci. V hladnem vremenu je razvoj počasen, ko pa se temperature dvignejo nad 15°C, se razvoj pospeši. Bolezen se najhitrejše širi, če se obdobja s padavinami menjujejo s toplimi in sončnimi obdobji. Na okuženem trku se najprej razvijejo podolgovate svetle lise, z rijavimi mrežastimi vzorci. Kasneje nastanejo podolgaste temne lise obkrožene z rumenimi klorozami, mrežavost ni več opazna. Obstaja tudi tip glive, kjer na perghah mrežaste strukture ne nastajajo. Gliva se ohranja v oblikli miceliji na zrnju ali na ječmenovih slami oz. žetvenih ostankih.		Elatus Era (j-A, r, t-C) Zantara (j-A, r, t-C) Priaxor EC (j-A, r-C)	1 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha	42 dni 35 dni 35 dni				
		metrafenon	Flexity (j) B	0,5 l/ha	35 dni			
		prokvinazid + protiokonazol	Verben (j-A, r-C)	1 l/ha	35 dni			
		protiokonazol+tebulkonazol	Prosoaro (j-A; r, t-C)	1 l/ha	35 dni			
		protiokonazol + spiroksamín	Input (staro ime Prossaro plus) (j-A, r-C)	1,25 l/ha	42 dni			
		azoksistrobin	Tazer 250 SC (j) A	0,8 l/ha	35 dni			
			Zaftra AZT 250 SC (p, j, r, t) C	1 l/ha	35 dni			
			Ortiva (p, j, r, t) C	1 l/ha	35 dni			
			Mirador 250 SC (j, p, r, t) C	1 l/ha	35 dni			
			Chamane (j) A	1 l/ha	35 dni			
			Amistar (p, j, r, t) C	1 l/ha	35 dni			
			Zoxis 250 SC (j) A	1 l/ha	35 dni			
			Velostar (j) C	1 l/ha	Čas uporabe			
			Norios (j) A	1 l/ha	35 dni			
			Mirador forte (j) B	1,5 -2 l/ha	35 dni			
			Rētengo (j-A, r-C)	1,25 l/ha	35 dni			
			Zamir (j-A, r-C) - v uporabi do 30.6.2023	1,5 l/ha	42 dni			
		biksafen + fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (j-A; r,t-C)	j-1,2 l/ha r,t -1,5 l/ha	Čas uporabe			

protoikonazol+spiroksamini+trifloksistrobin	Delaro Forte (j-A, r-C)	1,2-1,5 L/ha	42 dni
biksafen + protoikonazol	Siltra xpro (j-A; r-C)	1 l/ha	Čas uporabe
fluksapiroksad + metkonazol	Librax (j-A, r-C)	1,33 – 2 l/ha	35 dni
mefentriflukonazol + piraklostrobin	Revycare (j-A, r-C)	1,5 l/ha	35 dni
mefentriflukonazol + fluksapiroksad	Reystar (j) A	1,5 l/ha	35 dni
fluksapiroksad + piraklostrobin	Reystar XL (j-A, r-C)	j- 1,0 – 1,5 l/ha r- 1,5 l/ha	35 dni
fluksapiroksad	Mizona (j) A	1 l/ha	35 dni
biksafen + spiroksamini + trifloksistrobin	Imtrex XE (j-A; r, o-C)	2 l/ha	Čas uporabe
boskalid + krezoksim-metil	Cayunis (j-A, r-C)	1 l/ha	Čas uporabe
protoikonazol	Empartis (j-B, r-C) B; r, t-C	1,5 l/ha	56 dni
	Era (staro ime Tartaros 300 EC) (j- B; r, t-C)	0,65 l/ha	Čas uporabe
	Tartaros (j-B; r, t-C)	0,65 l/ha	Čas uporabe
	Protendo 300 EC (j-A, r, t-C)	0,65 l/ha	35 dni
	Pecari 300 EC (j-A; r, t- C)	0,65 l/ha	35 dni
	Procer 300 EC (j-A; r, t-C)	0,65 l/ha	Čas uporabe
	Promino 300 EC (j-A; r, t-C)	0,65 l/ha	Čas uporabe
	Cactai	0,65 l/ha	Čas uporabe

Tehnika zatiranja:
V obdobju od začetka kolenčenja do začetka klasenja redno pregledujemo posevke. Če je potrebno (ugodne razmere za razvoj bolezni, dosežen prag škodljivosti) izvedemo eno do dve aplikaciji fungicidov.

Prag škodljivosti določimo na sledeč način: po diagonalni prehodimo njivo in poberemo 40 bili. Na vsaki pregledamo zgornje tri odvite liste in preštejemo rastline z bolezenskimi znamjenji. Prag škodljivosti je presežen, če ima več kot 20 do 30 % rastlin bolezenska znamjenja na katerem od zgornjih treh listov (znamenja ob teh bolezni štejemo skupaj). Vir: KIS, IVR portal.

Ječmenova progavost <i>Pyrenophora graminea</i>	Opis bolezni: Rastline, ki se razvijejo iz okuženega semena, dobijo v času klasenja na listih podolgovate rumene pege. Pege sčasoma poravijo, nato triko peg razpadne, zato se listi razcefrajo, kot bi bili narezani s škarjami. Klasi se s težavo izvijejo iz listnih nožnih. Večko zrn je gluhih, oplojena zrna imajo zelo majhno maso.
Ovsova progavost <i>Pyrenophora avenae</i>	Tehnika zatiranja: Ker se gliva širi s semenom je za preprečevanje okužb, odločilnega pomena setev razkuženega semena. Škopljjenje med rastno dobo ne daje zadovoljivih rezultatov, ker v času ko običajno uporabljamo fungicide, gliva že poškoduje rastline. Med ovsovo in ječmenovo progavostjo ni razlik, le da se ovsova progavost le redko pojavi, ječmenova pa je pogosteje, če seme ni razkuženo.

Žitna črnoba <i>Claadosporium herbarum</i>	Opis bolezni: V obdobju pred žetvijo se v deževnih letih na slami razvijejo sajastie preleke in veliko število drobnih črnih peg.	Opis bolezni: V obdobju pred žetvijo se v deževnih letih na slami razvijejo sajastie preleke in veliko število drobnih črnih peg.	Žitna črnoba ni potrebno posebej zatiратi. Če fungicide uporabimo v obdobju mlečne zrelosti njihov stranski učinek navadno zadostuje, da se ne razvije premočna črnoba. Črnoba lahko zmanjša tržno vrednost slame za nastilj ali za predelavo. Nekateri pripavki imajo potrjeno delovanje na črnobo. S spravljom slame ne čakamo predolgo, ker se črnoba dobro razvija tudi na požeti slami.
---	--	--	--

INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o,-oves; pi-pira; r-pšenica; r-rž; t-tritikala)
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potreben upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA RASTLVN VARSTVO	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Fuzarioze klasov <i>Fusarium sp.</i>	Agrotehnični ukrepi: - mulčenje in zadelava koruznih rastlinskih ostankov - izgibanje preozkemu kolobarju s korozo in travami - preprečevanje razvoja samosevcev na stremičih hitro in temeljito zaoravanje žetvenih ostankov - setev manj občutljivih sort	benzovindiflupir+protiokonazol tebukonazol metkonazol	Elatus Era (p, pi) Folicur EW 250 (p) Sirena (p) Plexeo (p)	1 l/ha 1 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha	42 dni 42 dni 35 dni 35 dni	Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.	
Opis bolezni: Fuzarijske okužbe klasov povzroča več vrst gliv iz rodu <i>Fusarium</i> (<i>F. graminearum</i> , <i>F. avenaceum</i> , <i>F. culmorum</i> in druge). Tovrstne okužbe so poleg vplivnega na slabši pridelek problematične zaradi tvorbe toksinov, škodljivih za zdravje ljudi in živali.			Caramba (p) Metso (p)	1,5 l/ha 1,5 l/ha	35 dni 35 dni		
		protiokonazol + tebukonazol protiokonazol + spiroksamín	Prosaro (p, r, t) Input (staro ime Prosaro plus) (p, j, r, o, t)	1 l/ha 1,25 l/ha	35 dni 42 dni	Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni.	
		tebukonazol	Tebusha 25 % EW (p, j, r, t) Orius 25 EV (p)	1 l/ha 1 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	
		biksafen + tebukonazol biksafen + protiokonazol	Buzz Ultra DF (p) Bounty (p) Zantara (p, j, r, t) Siltra xpro (p, t)	0,33 kg/ha 0,6 l/ha 1,5 l/ha 1 l/ha	35 dni 35 dni 35 dni 35 dni	Čas uporabe	
		biksafen+ fluopiram + protiokonazol mefentiflukonazol + piraklostrobin difenokonazol+tebukonazol	Ascrax pro (p, t) Revycare (p, t) Magnello (p)	1,5 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	35 dni 35 dni 35 dni	Čas uporabe	
		Protiokonazol+spiroksamín+trifloksist robin prokloraz + tebukonazol azoksistrobin	Delaro Forte (p,j) L/ha Zamir (p) - v uporabi do 30.6.2023 Tazer 250 SC (p,j)	1,2-1,5 1,5 l/ha 0,8 l/ha	42 dni 42 dni 35 dni	Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.	

Povzročiteljske glive se prek zime ohranajo na rastlinskih ostankih na ali v tleh. V toplem in vlažnem vremenu se na okuženih ostankih oblikujejo trosi, ki jih po okolici raznaša veter in okužijo žita med cvetenjem. Razvoj bolezni pospešuje toploto vreme s padavinami in visoko zračno vlagajo.

Značilna znamenja fuzarijskih okužb klasov se lahko pojavijo že kmalu po zaključenem cvetenju žit. V obdobju med mlečno in voščeno zrelostjo, ko so zdravi klasi še zeleni, se pojavijo posamezni klaski ali več klaskov v klasu, ki predčasno posvetlijo oz. porumenijo, kasneje se oblikujejo oranžne do roza obarvane strukture s trosi. Na ječmenu so znamenja manj značilna. Rjavkasto razbarvani klaski so lahko tudi posledica poškodb ali drugih povzročiteljev bolezni. Tveganje za fuzarijske okužbe klasov je večje, če si v kolobarju sledijo koruza in žita, če ostanejo žetveni ostanki koruze nepredelanji na površini, pri setvi občutljivih sort žit,

<p>obilinem gnojenju z dušikom in v primeru deževnega vremena med cvetenjem pšenice ali ječmerja. Kadar sovpada več omenjenih dejavnikov je zatiranje s fungicidi priporočljiv ukrep. Učinkovitost fungicidov je odvisna od izbranih aktivnih snovi in od časa škropjenja. Najboljše učinke dajejo snovi iz skupine triazolov (npr. protiokonazol, metkonazol).</p>	protiokonazol	Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p,j,t) Tartaros (p,j,t)	0,65 l/ha 0,65 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe 35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
	Protendo 300 EC (p,j,t)	Promino 300 EC (p,j,t)	0,65 l/ha 0,65 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe 35 dni	
	Procer 300 EC (p,j,t)	Praktis (p)	0,65 l/ha 0,8 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe 35 dni	
	Pecari 300 EC (p,j,t)	Polyversum (p,j,t,r,o)	0,65 l/ha 0,1 kg/ha	35 dni 1 dan	
					Uporaba 3x v sezoni.
Tehnika zatiranja: V času cvetenja za zatiranje uporabimo pripravke, registrirane za zatiranje fuzarijskih gliv. Pri semenski pšenici moramo paziti, da z žetvijo ne zavlačujemo preveč, ne glede na težave pri sušenju. Pri zatiranju fuzarioz klasov se upoštevajo rastne razmere, ki so ugodne za razvoj bolezni: predosevek koruza, obdelava tal brez oranja v kolikor je predosevek koruza, občutljiva sorta, raba strobluirinskih fungidov, ugodne vremenske razmere za okužbe klasov (toplo in vlažno vreme v obdobju razvoja klasa in cvetenja žita BBCH 41-65).					
Črna žitna noge <i>Gaeumannomyces graminis</i>	Opis bolezni: Gliva okuži razrastišče in spodnji nodji bili vseh žit. Bil pri teh potemni in izgubi mehanično trdnost. Žito poleže v otokih. Pri zgodnjem napadu so klas popolnoma prazni.	Agrotehnični ukrep: - dovolj širok kolobar, tako da si tudi ječmeni in pšenica ne sledita prej kot v treh letih letih - zatiranje pŕinice	Tehnika zatiranja: Z običajnimi tehnikami uporabe fungicidov glive ni mogoče zatreli. Z izboljševanjem strukture tal, krepimo antagonistične organizme, ki preprečijo dolgoročno ohranjanje glive v tleh. Osnovni način preprečevanja bolezni je ustrezno kolobarenje.		
	Opis bolezni: Na pogosteješ so okužbe na najnižjem nodiju bili. Ob koncu blichenja se na nodiju pojavijo podolgovate medaljonaste pege svetlo rjave barve, obrobljene s temnim robom. Tkivo v sredini pege je najprej razvodenelo, nato pa strohmi. Bili se pod težo nastajajočih klasov zlomijo in poležajo. Način poleganja in lomljenja bili je drugačen, kot pri črni nogi.	biksafen+fluopiram+protoikon azol prokloraz	Ascrac xpro (p,r,j,o) Fixer (p,r,t)-v uporabi do 30.6.2023	j.o-1,2 l/ha 1 l/ha	Čas uporabe 35 dni
Lomljivost žitnih blik <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Opis bolezni: Na pogosteješ so okužbe na najnižjem nodiju bili. Ob koncu blichenja se na nodiju pojavijo podolgovate medaljonaste pege svetlo rjave barve, obrobljene s temnim robom. Tkivo v sredini pege je najprej razvodenelo, nato pa strohmi. Bili se pod težo nastajajočih klasov zlomijo in poležajo. Način poleganja in lomljenja bili je drugačen, kot pri črni nogi.	metrafenon prokvinazid + protoikonazol biksafen + protoikonazol	Flexity (p) Verben (p,t) Silitra xpro (p,t)	0,5 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	35 dni 35 dni Čas uporabe
	Agrotehnični ukrep: enako kot pri črni nogi in drugih boleznih blik	difenokonazol + fluksapiroksad boskaid + krezoksam-metil	Briveila (p)	1,5 l/ha	56 dni
		Empartis (p,o)		1,5 l/ha	56 dni

	protoikonazol+spiroksamini+trifluksapiroksad	Delaro Forte (p,i) Imtrex XE (p, r, t, o)	1,2-1,5 L/ha 2 l/ha	42 dni Čas uporabe
Tehnika zatiranja: Tudi pri kemičnem zatiranju lomljivosti žitnih bili ne moremo pričakovati zelo dobrih rezultatov. Prisotnost glive moramo odkriti ob začetku bilčenja na razrastišču, na listih ali na prvem nodiju. Ali je dosežen prag škodljivosti določimo na sledeč način: Njivo prehodimo po diagonalni in poberemo 40 bili ter preštejemo tiste, ki imajo znamena bolezni. Prag škodljivosti je presežen, če je v fazi od začetek kolenčenja do dveh kolenc(BBCH 30 – 32)več kot 20 % bili z znamjenji okužb. Vir:KIS, IVR portal.				

INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o-oves; pi-pira; p – pšenica; r-rž; t-tritikala)
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN		ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Žitne rje <i>Puccinia</i> sp. Žitna progasta rja <i>Puccinia graminis</i>	Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcev na strniščih hitro in temeljito zaoranje slame setev manj občutljivih sort in sort odprnih na sušo - poznejša setev jeseni	benzovindiflupir+protiokonazo l benzovindiflupir	Elatus Era (p, j, r, t, pi, o) Elatus Plus (p, j, r, t, pi, o)	1 l/ha 0,75 l/ha	42 dni j,o-Čas uporabe p,pi,r,t - 42 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
Pšenična rja <i>Puccinia tritici</i> , Rumena rja <i>Puccinia striiformis</i>		piraklostrobin	Retengo (p,j,r,t)	1,25 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
Ječmenova rja <i>Puccinia hordei</i>	-	tetrakonazol	Eminent 125 EW (p)	1 l/ha	35 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
Osova rja <i>Puccinia coronifera</i>		prokvinazid + protiokonazol	Verben (p,j,r,t)	1 l/ha	35 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
Ržena rja <i>Puccinia dispersa</i>		biksafen + spiroksamín + trifloksistrobin	Cayunis (p, j, t, r)	1 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		fluksapiroksad + metkonazol	Priaxor EC (p, j, t, r)	1,5 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		piraklostrobin	Librax (p, t, r)	1,33 – 2 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		fluksapiroksad	Imtrex XE (p, j, r, t, o)	2 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte (p, t)	1,5- 2 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		protiokonazol+spiroksamín+	Delaro Forte (p,j,r,t)	1,2-1,5 L/ha	42 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		trifloksistrobin						
		metkonazol	Caramba (p, j, r)	1,5 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
			Sirena (p, j, r)	1,5 l/ha	35 dni			
			Plexeo (p, j, r)	1,5 l/ha	35 dni			
			Metso (p)	1,5 l/ha	35 dni			
		protiokonazol + tebukonazol	Prosaro (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
		protiokonazol + spiroksamín	Input (staro ime Prosaro plu) (j, r, o, t)	1,25 l/ha	42 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
		difenokonazol + tebukonazol	Magnello (p)	1 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
		difenokonazol + fluksapiroksad	Brivela (p)	1,5 l/ha	56 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
		difenokonazol	Greteg (p, pi, t, r)	0,5 l/ha	40 dni	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.	Uporaba le 1x v sezoni.
		tebukonazol	Tebusha 25 % EW (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.	Uporaba le 2x v sezoni.
		Orius 25 EW (p, j, r,t)	Orius 1 l/ha					

Opis bolezni:

Večinoma rje okužijo žita v maju, ko v posevke po zraku prineše spore z vmesnih gostiteljev. Možne so tudi jesenske okužbe tako, da rja prezimi v oblikni uredo-stadija na okuženih rastlinah. Po okužbi se na listju in na ostalih organih pojavijo rjasti kupčki trosov – sorusi, polni spor. Rjasta trošča nastajajo vse do žetve. Izgube pridelka se gibljejo od 5 do 40%. Okužene rastline pospešeno izgubljajo vodo. Vmesni gostitelji na obseg okužbo navadno ne vplivajo odločilno. Rje se dobro razvijajo tudi v sušnih razmerah (posebej žitna progasta). Odpornost sort na rje ni nikoli dolgotrajna.

Tehnika zatiranja:

Pri izboru pripravkov in določanju termina škropljenja rjam posvečamo manjšo pozornost, ker večina sodobnih fungicidov dobro deluje na rje. Le v posameznih letih, ko se rje pojavijo že zgodaj jih moramo zatrati ciljano (npr. rumeno rjo). Pri semenskih posevkah rži je rja, poleg listnega oziga najpomembnejša bolezen.

Pri nas sta na gojenih žitih najbolj razširjeni pšenična in ječmenova rja. Pri drugih travah sta močno razširjeni ovsova in rumena rja. Progasta rja se razvija na vseh žith. Ugajajo jo nižinske legle z visokimi poletnimi temperaturami. Rumena rja se razvija predvsem na pšenici in na tritikali. V ugodnih razmerah (hladno in deževno vreme) poteka razvoj bolezni zelo hitro. Optimalna temperatura za razvoj bolezni je med 7 in 15 °C. Pri temperaturah nad 20 do 25 °C se razvoj bolezni upočasni, pri 32 °C uredospore odmrejo. Prag škodljivosti pri rumeni rji je presegzen, ko je od 1 do 3 % okuženih rastlin na občutljivih sortah. Pri ostalih rjah iz rodu <i>Puccinia</i> je ta prag škodljivosti 30 %. Rastlin z znanimenji okužb na katerem od zgornjih treh listov v razvojni fazi od pojava zastavčarja do začetek cvetenja (BBCH 37-61). Prag škodljivosti določimo na sledeč način: Po diagonalni pobremo 40 bili, na vsaki pregledamo 3 najvišje odvite liste in preštejemo rastline z znanimenji okužb. Vir: KIS, IVR portal	Buzz Ultra DF (p)	0,33 kg/ha	35 dni	
	Bounty (p, j, o, r, t)	0,6 l/ha	35 dni	
	Folicur EW 250 (p, j, r, o)	1 l/ha	42 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
	Zaffra AZT 250 SC (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	
	Ortiva (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	
	Chamane (p, j, r, t, o)	1 l/ha	35 dni	
	Tazer 250 SC (p, j)	0,8 l/ha	35 dni	
	Amistar (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	
	Zoxis 250 SC (r, j, p, t)	1 l/ha	35 dni	
	Mirador 250 SC (p, j, r, t)	1 l/ha	35 dni	
	Velostar (p, j)	1 l/ha	Čas uporabe	
	Norios (j, r, t, o)	1 l/ha	35 dni	
	Zantara (p, j, r, t, o)	1,5 l/ha	35 dni	Uporaba le 1x v sezoni.
	biksafen + tebukonazol			
	biksafen+fluopiram+protiokonazol	Ascra xpro (p, r, t, j, o) j,o-1,2 l/ha p,r,t- 1,5 l/ha	Čas uporabe	j,o-uporaba le 1x p,r,t- uporaba 2x
	biksafen + protiokonazol	Silitra xpro (p, t, j, r, o)	1 l/ha	Čas uporabe
	prokloraz +tebukonazol	Zamir (p, j, r, t) - v uporabi do 30.6.2023	1,5 l/ha	42 dni
	mefentrifukonazol + piraklostrobin	Revycare (p,r,t)	1,5 l/ha	35 dni
	mefentrifukonazol	Revystar (p,pi, j,t,o)	1,5 l/ha	35 dni
	mefentrifukonazol + fluksapiroksad	Revytrex (p, r, t)	1,125 l/ha	35 dni
		Revystar XL (p, j, r, t)	p- 0,75-1,5 l/ha j,r,t - 1,5 l/ha	35 dni
	fluksapiroksad + piraklostrobin protiokonazol	Mizona (p,pi)	1 l/ha	35 dni
	piraklostrobin protiokonazol	Era (staro ime Tartaros 300 EC) (p,j,r)	0,65 l/ha	Čas uporabe
		Tartaros (p, j, r)	0,65 l/ha	Čas uporabe
	Protendo 300 EC (p, j, r, t)	0,65 l/ha	35 dni	Uporaba le 2x v sezoni.
	Procer 300 EC (p, j, t)	0,65 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.
	Promino 300 EC (p, j, r)	0,65 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 2x v sezoni.

	Pecari 300 EC (p, j, r, t)	0,65 l/ha	35 dni	
	Praktis (p)	0,8 l/ha	35 dni	Uporabale 2x v sezoni.
boskalid + krezoksim-metil	Empartis (p, j, r, t, o)	1,5 l/ha	56 dni	

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Ramularijska pegavost ječmena <i>Ramularia collo-cygni</i>	Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcev na stniščih - uporaba razkuženega semena - širok kolobar hitro in temeljito zaoravanje s same - - -	biksafen + tebukonazol biksafen + spiroksamín + trifloksistrobin protibkonazol+spiroksamín+trifl oksistrobin fluksapiroksad+metkonazol fluksapiroksad + piraklostrobin fluksapiroksad + piraklostrobin biksafen+fluopiram+protiokona zol biksafen + protiokonazol nefentriflukonazol + piraklostrobin nefentriflukonazol nefentriflukonazol	Zantara (j) Cayunis (j) Delaro Forte (j) Librax (j) Imtrex XE (j) Priaxor EC (j) Ascra xpro (j) Silitra xpro (j) Revycare (j) Revystar (j) Revystar XL (j) Revytrex (j) Elatus Era (j)	1,5 l/ha 1 l/ha 1,2-1,5 L/ha 1,33 – 2 l/ha 2 l/ha 1,5 l/ha 1,2 l/ha 1 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha j-1,0 -1,5 l/ha 1,125 l/ha 1 l/ha	35 dni Čas uporabe 42 dni 35 dni Čas uporabe 35 dni Čas uporabe 35 dni Čas uporabe 35 dni Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 2x v sezoni.		

Opis bolezni:

Za ramularijsko pegavost ječmena je značilno, da se pojavi razmeroma pozno, šele v času cvetenja ječmena. Takrat na listih opazimo čmorjave, drobne pege, velike od 11 do 3 mm, ki so običajno v sredini najtemnejše in obdane z nekoliko svetlejšim tkivom. Vidne so na zgornji in na spodnji strani listov, temnejše so na strani, izpostavljeni soncu. Če mrtvo tkivo pogledamo pod povečavo, lahko opazimo v vrste nанизane skupine trosonoscev, ki izrasčajo iz listnih rež. Pri močnem napadu se pege združujejo, odmrilo tkivo se širi, listi se predčasno posušijo in odmrejo. Med zorenjem ječmena se pege pojavijo tudi na steblih, resah in plevah.

Tehnika zatiranja:

Bolezni se prenaša s semenom, vendar razkuževanje s fungicidi, ki so sedaj v uporabi, ni učinkovito. Vse sorte ječmena so občutljive na okužbe, tudi jari ječmen, med sortami so določene razlike v občutljivosti, vendar odpornih sort ni. Zaenkrat je bolezen možno zatirati samo z uporabo fungicidov. Za dobro delovanje je pomembna pravočasna raba fungicida. Primeren čas je v obdobju od razvojne stopnje BBCH 39 (popolnoma razvit vrhnji list – zastavičar) pa do stopnje BBCH 51 (začetek klasenja, ko so vidne konice res). Pri ramularijski pegavosti ni pragov škodljivosti. Bolezen zatiramo preventivno. Vir: KIS, IVR portal.

INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o-oves; pi-pira; p-pšenica; r-rž; t-tritikala), VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Rdeči žitni strgač <i>Oulema melanopus</i>	Opis škodljivca: Žitni strgač ima en rod letno. Samice z rdečastim telesom in modrimi pokrovkami pričnejo odlagati rumena podolgovata jajčeca v sredini aprila in jih odlagajo do sredine maja. Iz njih se razvijejo belkaste ličinke z izbočenim hrbitom. Ličinke obdaja sluz in iztrebki. Pri hranjenju ličinke postrgajo zgoraj povrhnjico in mezofili – sredico lista, spodnjo povrhnjico pa pustijo. Na listju so opazne vzdolžne podolgovate belkaste proge. Izmed žit ima strgač najraje oves, nato pšenico in ječmen ter štavilne trave in koruzo. Najbolj mu ustrezajo gosti, vlažni in prepirano pognojeni posevki.	Agrotencični ukrepi: - kolobar - zmerno gnjenje redkejši posevki majhen delež ovsu v kolobarju	lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)	0,15 l /ha	30 dni	
	Opis škodljivca: Žitni strgač ima en rod letno. Samice z rdečastim telesom in modrimi pokrovkami pričnejo odlagati rumena podolgovata jajčeca v sredini aprila in jih odlagajo do sredine maja. Iz njih se razvijejo belkaste ličinke z izbočenim hrbitom. Ličinke obdaja sluz in iztrebki. Pri hranjenju ličinke postrgajo zgoraj povrhnjico in mezofili – sredico lista, spodnjo povrhnjico pa pustijo. Na listju so opazne vzdolžne podolgovate belkaste proge. Izmed žit ima strgač najraje oves, nato pšenico in ječmen ter štavilne trave in koruzo. Najbolj mu ustrezajo gosti, vlažni in prepirano pognojeni posevki.	deltametrin	Decis 2,5 EC Poleci Delux 050 CS (p) tau-fluvalinat piretrin	0,2 - 0,3 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha 0,1 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha Asset five*	30 dni 30 dni 27 dni 30 dni 30 dni 7 dni	* dovoljenje za najne primere	
	Tehnika zatiranja: Za zatiranje žitnega strgača se odločimo na podlagi preseganja kritičnih števil. Zatiramo ličinke. Ker je obdobje odlaganja jajčec zelo dolgo je razvoj ličink zelo neenakomeren. Pri zatiranju ličink žitnega strgača težimo k enkratni uporabi in insekticida. Za rabo insekticidov se odločimo, ko je doseženo kritično število, to je, če najdemo v povprečju 1 jajčec ali 1 ličinka na steblo, v obdobju razvoja žit od zastavicanja do sredine klasenja BBCH 37-55). Pregledamo 10 x po 5 bil. Pri ovsu in rži upoštevamo niže prago ve škodljivosti. Vir: KIS, IVR portal. V nekaterih letih se na velikih kompleksih žitnih njiv pred obdobjem odlaganja jajčec zborejo v velikih populacijah ob robovih njiv. To se zgodi po obilnem dežju na robovih, ki so blizu gozda ali melioracijskih jarkov ali pa so pretirano pognojeni. Takrat je smiselno zatirati hrošče na tak način, da poškropimo zgolj rob njive, kjer je veliko hroščev. Zaradi zmanjšanega nabora primernih insekticidov obstaja tudi pri strguču precejšnja možnost pojava odpornosti na insekticide iz skupine posevki.		Insekticide uporabimo, ko so preseženi pragovi škodljivosti in ob napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Pri piretroidih upoštevamo pH škropilne brozge, ki naj bo okoli 6,5; pri piretrinu 5-6. Priporočamo, da poškropite v večerno nočnem času.				
Velika žitna uš <i>Sitobion avenae</i>	Opis škodljivca: Uši masovno naselijo žita v obdobju začetka cvetenja, delno pa veliko prej. Najintenzivnejše se hraniijo na klasih v času mlečne zrelosti.	Agrotencični ukrepi: - zmerno gnjenje redkejši posevki	lambda-cihalotrin pirimikarb	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r) Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)	0,15 l/ha 0,3 kg/ha	30 dni 35 dni	
Zeleni žitni uš <i>Schizapis graminum</i>		deltametrin	Decis 2,5 EC	0,2 - 0,3 l/ha	30 dni		
Svetla žitna uš <i>Metopolophium dirhodum</i>			Decis 100 EC (p, j, o) Poleci	63 ml/ha 0,2 - 0,3 l/ha	30 dni 30 dni		
Čremšina uš <i>Rhopalosiphum padi</i>		flonikamid	Teppeki (p, t, r, j,o) Afinto (p, t, r,j,o)	0,14 kg/ha 0,14 kg/ha	28 dni (p,r,t), 30 dni (j,o) 28 dni (p,r,t), 30 dni (j,o)		
Listna uš <i>Aphidiidae</i>		tau-fluvalinat	Mavrik 240 (p, t, r) Evure (p, t, r)	0,2 l/ha 0,2 l/ha	30 dni 30 dni		
	Tehnika zatiranja: Uši navadno zatiramo v obdobju cvetenja in ob začetku mlečne zrelosti. V izjemnih letih in v semenskih posevkah je potrebno zatiranje še enkrat ponoviti. Pri tem moramo paziti na karenco, ki je pri večini pripavkov dolga. Prag škodljivosti je presežen, ko je napadenih več kot 60% klasov. Pregledamo 10 x 5 klasov. Vir:KIS, IVR portal. Stopnja parazitiranosti uši na naših žitnih njivah je dokaj visoka, zato ne smemo prehitro pristopiti h zatiranju in pri tem uničiti večji del naravnih sovražnikov uši. Pri semenskih posevkah lečmena, ki jih posejemo zelo zgodaj, zaradi omejevanja možnosti prenosa virusov, včasih uši smiselno zatirati tudi jeseni.						

INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o-oves; pi-pira; p-pšenica; r-rž; t-tritikala)
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Strune in talne sovke: <i>Agriotes sp.</i> <i>Agrotis sp.</i>	Opis škodljivca: Strune in talne sovke (ozimna sovka, pšenična sovka, njivska sovka) povzročajo redno škodo v žitih. Kompenzacijsko sposobnost žitnih posevkov, da nadomestijo izpad pridelka posameznih rastlin, ki so ostabele ali propadle zaradi poškodb od strun in sovki je zelo velika. Zaradi tega zatiranje strun in sovki v žitih v naših razmerah ni ekonomsko smiselno.						
Žitne stenice: <i>Eurygaster austriaca</i> <i>Eurygaster maura</i> <i>Aelia acuminata</i>	Opis škodljivca: Odrasle stenice in njihove ličinke se hranijo na klasih v obdobju mlečne zrelosti. Zaradi sesanja se zna zgrbančijo. Pecivne lastnosti moke dobljene iz napadenih zrn so zelo slabe.		Upoštevanje stranskih učinkov drugih insekticidov.				
	Tehnika zatiranja: Stenice zatiramo v enakem obdobju kot listne uši, to je v času cvetenja žit ali v obdobju mlečne zrelosti, zato dodatno tretrjanje ni potrebno. Izmed vseh žit imajo stenice najraje močno pogojene posevke pšenice, ki so obdani z gozdovi in se razvijajo na topilih lažjih tleh. Prag škodljivosti znaša več kot 3 do 4 odrasle stenice na m ² ali v času mlečne zrelosti več kot dve ličinki na m ² .						
	Žitni resarji - tripsi: <i>Limnothrips</i> sp., <i>Stenothrips</i> sp., <i>Haplothrips</i> sp	Opis škodljivca: Resarji izsesavajo vse nadzemne organe žit. Kot posledice sesanja nastanejo na listih, listnih nožnicah in klasih zverižene deformacije. Na vbovodnih mestih opazimo veliko drobnih belih pik (vdor zraka).	Tehnika zatiranja: Resarji se na žitnih njivah v Sloveniji pojavljam redno. Navadno so populacije dokaj majhne, tako da posebno zatiranje ni potrebno. Največja neposredna škoda lahko nastane na zrnju ovsa.				

Številnih škodljivcev žit, ki se v Sloveniji običasno ali redno pojavljajo v majhnih populacijah ni potrebno neposredno kemično zatirati. V primeru potrebe, posebej pri semenskih posevkah, se morajo pridelovalci posvetovati z izvajalcji nadzora integrirane pridelove in pridobiti posebno dovoljenje za uporabo pripravkov.

Občasni ali manji pomembni škodljivci žit v Sloveniji so:

Muhe: Ozimna muha (*Delia coaorientata*), Pšenične muhe zavrtalke (*Agromyza luteitarsis*, *Agromyza nigrella*, *Agromyza megalopsis*), Rumena pšenična muha (*Opomyza florum*), Črna pšenična muha (*Phorbia securis*)

Mušice: Švedska mušica (*Oscinella friti*), Pšenična bilna mušica (*Chlorops pumilioinis*), Hessenska žitna mušica (*Mayetiolia destrutor*)

Hržice: Sedlasta žitna hržica (*Haplodiplosis equestris*), Rumena pšenična hržica (*Contarinia tritici*), Rdeča pšenična hržica (*Sitotropis mosellana*)

Ose in grizlice: Žitna stebelna osa (*Cephus pygmaeus*), Žitna listna grizlica (*Dolerus* sp.)

Metulji: Žitni zavijač (*Cnephodesia pasiuiana*),

Hrošči: Majski hrošč (*Melolontha melolontha*), Žitni brzec (*Zabrus tenebrioides*), Modri žitni strigač (*Oulema lichenis*), Koruzni bolhač (*Phyllopertha vittula*), Junijski hrošč (*Amphimallon solstitiale*), Vrtni hrošč (*Phyllopertha horticola*)

Ogorčice: *Dytiscus dipsaci*, *Pratylenchus crenatus*, *Pratylenchus neglectus*, *Heterodera avenae* in *Anguina tritici*.

**INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; o,-oves; pi-pira; r-rž; t-tritikala),
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potreben upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!****Osnovni pribitki pri zatiranju plevelov v žitih:**

Ustrezeno posejana in negovana žita imajo dobro tekmovalno sposobnost. Pri njih se v slovenskih razmerah, v nasprotju z okopavini, pri zatiranju plevelov lahko ravnamo po pragovinih škodljivosti, oziroma po kritičnih številah. Izbor herbicidov je velik, zato lahko v večini primerov najdemo ustrezone rešitve. **V žitih je možno tudi mehanično zatiranje plevelov, ki ga s posebnimi orodji (branami, česali) izvajamo, dokler se žita ne razrastejo preveč.** **V integrirani pridelavi je obvezna vsaj enkrat letno uporaba česal v pridelavi pravih žit.** Za uspešno zatiranje s to nekemično metodo moramo izvesti dvakratno do trikratno branjanje – prečesanjanje. Termin uporabe herbicidov je odvisen od termina seje, vremena in lastnosti plevelnih populacij na posameznih njivah. Zatiranje plevelov v ozimnih žitih že v jesenskem času je smiselno, če smo žita posejali zelo zgodaj in se zima prične pozno. V takšnih razmerah se pleveli v velikem številu razvijejo že jeseni in lahko že v stadiju razraščanja povzročijo izgubo pridelka, ki jih pozneje ni mogoče več nadoknadi. Za ta namen uporabimo herbicide, ki imajo kombinirano talno in listno delovanje.

Jesenski termin je pomemben za zatiranje agresivnih plevelov, ki bi do spomlad že lahko prerasli občutljivi stadiji in bi jih takrat težko zatrlti. Kritična števila za jesensko – zimsko obdobje, ko so žita v stadiju od zaključka oblikovanja prvih listov do konca razraščanja (BBCH 18 – 28) so: enoletni ozkolistični pleveli (srakoperec, rijivski lisičji rep, stoklase, ...) 25 rastlin na m², enoletni jesenski zimski pleveli z majhnim habitusom (kopriive, plešec, jetičniki, zvezdica, ...) 20 na m², enoletni jesensko zimski pleveli s srednjim habitusom (vijolica, kamilice, zebrati, ...) 15 na m², agresivni jesenski zimski enoletni pleveli (plezajoča lakota, kržnice, ...) 0,5–1 na m². Kot prag za zatiranje lahko uporabimo mejo, ko pleveli poraščajo več kot 5 % površine tal ali pa imamo več kot 70 do 80 plevelov različnih vrst, v stadiju kličih listov in prvega lista na m². V spomladanskem obdobju lahko te pragove v fazi ozimnih žit BBCH 30 do 35, v gostih posevkah (nad 400 bili na m²) povečamo za 20 %. Pri jarih žitih v spomladanskem obdobju v stadiju BBCH 15 – 20 upoštevamo za 20 % zmanjšana kritična števila predstavljena za ozimna žita v jeseni. Tekmovalna sposobnost jarih žit je slabša od ozimnih žit. Tudi v žitih se skušamo izogniti talnim herbicidom. Predvsem klorotoluron se lahko čez zimo močno izbere v podtalje. Ocenjuje se, da enoletni ozkolistični pleveli pri nas niso tako konkurenčni, da jih ne bi mogli dovolj zatreći s kombiniranimi pripravki. V primeru poznih setev in počasnega razvoja plevelov jeseni, jesensko zatiranje ni smiselno. Herbicidi bi se čez zimo le izpirali, spomladni pa več ne bi bili učinkoviti.

Sedaj imamo na voljo novejše sulfonilsečinske herbicide s katerimi lahko ob pomoči hormonskih herbicidov **zgodaj spomladi** zatremo tudi višje stadije nevarnih širokolistnih jesenskih plevelov. Sulfonilsečinski herbicidi dokaj dobro delujejo tudi pri nižjih temperaturah, kar pa ne velja za hormonske herbicide (2,4-D, mekoprop-p, ...), ki za dobro delovanje potrebujejo vsaj 12 do 15° C. Pri uporabi hormonskih herbicidov morajo imeti pleveli dovolj veliko listno maso, sicer pri aplikaciji plevelne rastline vskrajno premajhno količino aktivne snovi. **Predolgo z uporabo teh herbicidov tudi ne smemo odlašati.** Na sredini stadija biljenje (BBCH 35) postanejo občutljivi interkalarni meristemni žit dostopni herbicidom in ti postanejo neselektivni. Možne so poškodbe žit. V tem obdobju se sklop rastlin toliko zapre, da kapljice ob škropljenju težko prodrejo do majhnih plevelov skrith pod listnim plastičem žita. Glede na razvojni stadij žit lahko najpozneje uporabimo pripravke na podlagi fluorskpira, bentazona in tribenuron-metila. Te lahko uporabimo v posevkah, kjer so bila predhodna zatiranja neuspešna, ali jih nismo opravili, ali pa v tistih, ki nimajo ustrezne gostote (pod 300 bili na m²), in pričakujemo težave z zatiranjem okopavinskih plevelov.

INTEGRIRANO VARSTVO ŽIT (j-ječmen; jj-jari ječmen; o-oves; pi-pira; p - pšenica; r-rž; t-tritikala),
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NACIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN (vrsta žita)	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE
Enoletni širokolistni pleveli - delno nekateri enoletni ozkolistni pleveli:	Po vzniku posevka in plevelov.	pendimetalin amidosulfuron	Sharpen 33 EC (p) Sharpen plus (p) Stomp Aqua (p, j, r, t) Grody (p, j, o, r, t, pi)	3-5 l/ha 2,5 - 4 l/ha 2,9 l/ha 40 g / ha	Čas uporabe
Širokolistni pleveli	Uporaba pred in po vzniku.	prosulfokarb diflufenikan+flufenacet diflufenikan	Boxer (p, j, r, t) Arnold (p) Flash 500 SC (p, j)	5 l/ha 0,6 l/ha 0,28 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Čas uporabe
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Uporaba po vzniku posevka in plevelov.	klorotuluron florasulam+pinoksaden piroksulam florasulam+piroksulam diflufenikan+klorotuluron+pendim etalin	Tolurex 50 SC (p, j) Axial One (p, j) Pallas 75 WG (p, t, r) Corello duo (p, r, t, pi) Trinity (p, j, r, t)	2,5-4 l/ha 1 - 1,3 l/ha 120 - 250 g/ha 170 - 265 g/ha 2 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe. Uporablja se izklučno v kombinaciji z ustreznim močilom. Čas uporabe. Uporaba močila. Čas uporabe
Ozkolistni pleveli	Po vzniku	flufenacet pinoksaden izoksaben	Fluent 500 SC (p, j) Axial (p, j) Flexidor (p, j)	0,4 l/ha 0,6 - 1,2 l/ha 0,25 L/ha	Čas uporabe. Čas uporabe Čas uporabe
Enoletni širokolistni pleveli	Uporaba pred in po vzniku	Pred vznikom žit	glifosat v obliku izopropilaminolo + glifosat v obliku kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,33 - 4,0 l/ha - odvisno od časa uporabe (pred ali po setvi)
Enoletni in večletni ozkolistni in širokolistni pleveli;	Po vzniku žit in plevelov.	MCPA - DMA	dikamba+tritosulfuron	Arrat (p, j)	0,2 kg/ha
Enoletni in večletni širokolistni pleveli, delno nekateri enoletni ozkolistni pleveli:			U - 46 M fluid (p, j, r, t)	1 l/ha	Čas uporabe, za zeleno krmlo 50 dni. Prepovedan na VVOI.
			EMCEE (p, j, r, o, t)	1 l/ha	Čas uporabe, za zeleno krmlo 60 dni. Prepovedan na VVOI.
			Battery (p, j)	5 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
			Biathlon 4D (p, j, o, pi, r, t)	70 g/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
			Flyer (p, j, r)	0,1 - 0,15 l/ha	Čas uporabe
			Duplosan KV (p, j)	2 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.

bentazon	Duplosan KV 600 (p, j, o, r, t)	1,5 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
metsulfuron-metil+tfensulfuron-metil	Basagran 480 (p, j, r, o, t)	2 l/ha	Čas uporabe
jodosulfuron + diflufenikan	Ergon (p, jj)	60-70 g/ha	Čas uporabe
amidosulfuron + jodosulfuron	Alliance (p, j, r, t)	100 g/ha	Čas uporabe
amidosulfuron + jodosulfuron + 2,4-D	Sekator OD (p, j, r, t)	0,15 l/ha	Čas uporabe
bensulfuron-metil + metsulfuron-metil	Sekator plus (p, t, j, r)	0,6 l/ha	Čas uporabe
jodosulfuron	Xanadu (p, j, o, r, t)	0,1 kg/ha	Čas uporabe
jodosulfuron + mezosulfuron	Hussar OD (p, j, r, t)	0,1 l/ha	Čas uporabe
jodosulfuron + tienkarbazon-metil	Hussar plus (jj, p, r, t)	0,15 – 0,2 l/ha	Čas uporabe
2,4-D-2-EHE	Hussar star (p, r, t)	0,2 – 0,3 kg/ha	Čas uporabe. Dodatek močila.
2,4-D	Esteron (p, j, t)	0,75 – 1 l/ha	Čas uporabe
jodosulfuron-metil natrij +mezosulfuron+tienkarbazon-metil	Herbocid XL (p, j, r, t)	1,25 L/ha	Čas uporabe
jodosulfuron-metil natrij +mezosulfuron+tienkarbazon-metil	Atlantis Star (p, t)	0,2 - 0,33 kg/ha	Čas uporabe
metsulfuron-metil	Savvy (p, j, o, t)	30 g/ha	Čas uporabe
diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron fluroksipir	Ally SX (p, j, r, o, t, pi)	30 g/ha	
	Finy (p, r, t)	30 g/ha	
	Mezzo (strna žita)	20 – 30 g / ha	
metsulfuron-metil+ tribenuron-metil	Boudha (p, j, r, o, t)	20 g/ha	Čas uporabe
fluroksipir	Alister New (p)	1 l/ha	Čas uporabe
	Starane forte (p, j, o, r, t, pi)	0,54 l/ha	Čas uporabe
	Bonaca (p, l)	0,6 – 0,8 l/ha	
	Flurostar 200 (j, r, t, p)	jj, ip - 0,75 l/ha p,j,r,t,- 1 l/ha	
florasulam + fluroksipir	Eltivis (p, j)	0,6-0,8 l/ha	
florasulam + 2,4-D 2-EHE	Flurostar super (p, j, r, t)	1,5 l/ha	Čas uporabe
2,4-D + florasulam + aminopiralid	Valentia (p, j, o, r, t)	1,2 – 1,6 l/ha	Čas uporabe
aminopiralid + florasulam	Mustang 306 SE (p, j)	0,4 - 0,6 l/ha	Čas uporabe
klopiralid	Mustang forte (p, j, t, r, o)	0,8 – 1 l/ha	60 dni
	Lancelot super (p, t, r, jj)	25 – 33 g/ha	Čas uporabe
	Lontrel 100 (p) -v uporabi do 30.4.2023	1-1,2 l / ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.

	Lontrel 72SG (p, i, o)	0,17 kg/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake tri leta.
	Clap (p, j, o, r, t)	0,3 – 0,4 l/ha	
	Clap forte (p, i, r)	0,167 l/ha	
	Major 300 SL (p)	0,3-0,4 l/ha	
florasulam + tribenuron-metil	Saracen max (i, o, p, r, t)	25 g/ha	Čas uporabe
florasulam + diflufenikan	Lector delta (p, i, r, t)	0,075 – 0,1 l/ha	Čas uporabe
florasulam + halauksifen-metil	Quelex (p, j, t, r, pi)	37,5 – 50 g/ha	Čas uporabe
florasulam + fluoksipir	Clyde FX (p, j, o, r, t)	1,5 l/ha	Čas uporabe
tribenuron – metil	TBM 75 WG (i, p, o, r, t)	20 g/ha	Čas uporabe
	Corida (p, i)	20 g/ha	Čas uporabe
	Flame(p, j)	30 g/ha	Čas uporabe
	Adentis (p, j)	20 g/ha	Čas uporabe

Pripravki so registrirani za uporabo pred in po vzniku žit. Pri integrirani pridelavi predvsem uporabo po vzniku. Termin uporabe mora biti prilagojen začetnemu razvoju plevelov in žit (možni pojavi fitotoksičnosti ob uporabi med vznikanjem in v dobi razvoja prvih listov žit). Če jih uporabimo po vzniku lahko tudi pri njihovi uporabi upoštevamo kritična števila.

12.2 INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

list 1

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIΣ	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Listne pegavosti in progavosti povzročene od gliv iz rodu <i>E. turicum</i> in <i>C. carbonum</i>	Pri nas najbolj razširjena bolezen iz te skupine je koruzna progavost, ki jo povzroča gliva <i>E. turicum</i> . Opis bolezni je dostopen na portalu IVR: https://www.ivr.si/skodljivec/koruzna-progavost/	fluopiram + protiokonazol mefentriflukonazol piraklostrobin	Propulse Revyona Retengo	1,0 L/ha 1,25 l/ha 1,0 L/ha	42 dni 56 dni Čas uporabe		
Bolezni povzročene od gliv iz rodu Fusarium: <i>F. graminearum</i> , <i>F. moniliforme</i> , <i>F. culmorum</i> , <i>F. sambucinum</i> in <i>F. lateritium</i>	Koruzna listna pegavost (<i>C. carbonum</i>) se pri nas pojavlja le občasno pri manjšem številu rastlin. Po okužbi se razvijejo manjše okrogle ali ovalne pege obdane s temnim razvodnenim obročem. Okužene rastline lahko močno zaostanejo v razvoju in ne oblikujejo storžev.	Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje: Varstvo temelji predvsem na izboru odpornih hibridov. Poleg odpornosti, dosežene s posameznimi dominantnimi Ht geni, ima koruzna tudi horizontalno odpornost, ki je trajnejša, saj jo uravnava več genov. Obe vrsti odpornosti se dopolnjujeta. Zaoranjanje rastlinskih ostankov lahko zmanjša prve okužbe, kar velja tudi za druge listne pegavosti, katerih povzročitelji se ohranjajo na rastlinskih ostankih.	Glige iz rodu Fusarium lahko napadejo vse organe koruze (fuzarijske okužbe stebel, storžev in zrnja). Po napadu se razvijejo bolezni, klijih imenujemo fuzarioze (fuzarijske gnilobe – trohnobe) in so ene od najpogostejših bolezni s katerimi se srečujemo pri pridelavi koruze. Več sorodnih, vendar specializiranih gliv (organi koruze, vlaga, temperatura) povzroča propad vznikajočih rastlin, trohnenje korenin, steba in listnih nožnic ter trohnenje in plesnirost storžev. Saprofitski micelij in spore se lahko ohranljajo na koruznem semenu ali na ostankih koruznice. Glige tega rodu ne napadajo zgolj koruze, temveč večino drugih poliščin in vrtnin, najraje pa žita, sirek, proso in druge trave.				
<i>Pythium oligandrum</i>	Na površini napadenih organov in v njihovi notranjosti se razvije belkast, rožnat, vijoličen ali oranžen micelij. Zaradi setve okuženih semen lahko rastline propadejo že v času vznikanja. Fuzarioze ogrožajo kakovost koruznega zrnja in koruzne silaže, ker glive izločajo zdravju škodljive toksine. S fuzarijskim micelijem okuženo zrnje in silaža povzroča pri govedu prebavne in plodnostne motnje. Gliva se lahko pospešeno razvija tudi na neprimerno uskladiščenem zrnju in silaži.	protiokonazol + tebukonazol mefentriflukonazol <i>Pythium oligandrum</i>	Prosaro Revyona Polyversum	1,0 L/ha 1,25 l/ha 0,1 kg/ha	56 dni 56 dni 1 dan		

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!							
Koruzna bulava snet <i>Ustilago maydis</i>	Bulava snet je zelo razširjena bolezen. V poprečnih letih napade manj kot 1% koruznih rastlin in ne povzroča zaznaven škode. V začetku zelo ugodnih letih napade med 20 in 30% rastlin. Z rastjo micelija v tkivu pride do hiperplazije in hipertrofije celic, kar povzroči nastanek bul. Te se lahko pojavijo na metlici, vseh delih storža, stebelih in listih, izjemoma tudi na zračnih koreninah. Opis bolezni je dostopen na portalu IVR: Koruzna bulava snet .	Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje: Pri preprečevanju bulave snet največ dosežemo z izborom manj občutljivega hibrida. Izogibati se moramo mehanskim poškodbam pri obdelavi in skrbeti za uravnoteženo gnojenje in kjer so možnosti, tudi za namakanje. Zatiranje škodljivcev, npr. koruzne vešče, tudi prispeva k zmanjšanju okužbe. Z zaoravanjem ostankov bul, ki ležijo na površini tal, se zmanjša infekcijski potencial. Z uporabo razkuženega semena preprečimo le začetne okužbe v maju.	piraklostrobin	Retengo	1,0 l/ha	Čas uporabe	
Koruzna rja <i>Puccinia maydis</i>	Tudi koruzna rja je zelo razširjena bolezen koruze, ki ji v povprečnih letih ne pripisujemo gospodarskega pomena. Napadeni so predvsem listi. Opis bolezni je dostopen na portalu IVR: Koruzna rja .	Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje: Neposredno zatiranje te rje pri nas ni potrebno. Izjemoma je zatiranje potrebno le pri pridelovanju semenske koruze. Nevarna je v deževnih letih, ko se že v sredini poletja pojavijo dajša obdobja z visoko relativno zračno vlago in dokaj nizkimi nočnimi temperaturami. Takrat zgodnje okužbe izrazito pospešijo odmiranje listne mase. Zmanjša se absolutna masa zrn in kakovost koruznice za priprovo koruzne silaže. Vmesni gostitev koruzne rje, to je toga zajčja deteljica (<i>Oxalis stricta</i>) pri ohranjanju glive nima dominantnega pomena. Rja se lahko ohrani tudi v obliki uredospor, ki prezimijo na ostankih nezaorane koruznice (predvsem zelo pozni hibridi na Primorskem) ali na koruznici, ki jo čez zimo hranimo za različne priročne namene. Temeljito zaoravanje ostankov koruznice povzroči propad večine spor, ki omogočijo nadaljnji razvoj glive.	fluopiram + protokonazol	Propulse	1,0 l/ha	42 dni	Česna pegavost
Očesna pegavost <i>Kabatiella zeae</i> Koruzna plesen	Pri očesni pegavosti se na listju razvijejo okrogle sive pege s premerom 3 do 5 mm, obdane z temnim obročkom. Pri epikokum pegavosti se razvije veliko število drobnih peg (2 – 4 mm) z razvodenjem središčem. Včasih so obdane z rdečkastim obročem in tudi listna ploskev pordeči.	piraklostrobin	Retengo	1,0 l/ha	Čas uporabe	Česna pegavost	Očesna pegavost

Sclerotihora macrosperra	Koruzno plesen se pojavlja občasno, vedno v povezavi z zastajanjem vode ali popavljenostjo zemljišča. Opis bolezni je dostopen na portalu IVR: Koruzna plesen	mefentriflukonazol	Reyyona	1,25 l/ha	56 dni	Očesna pegavost
Koruzna pegavost <i>Phyllosticta maydis</i> <i>Epicoccum sp.</i>	Agrotehnični ukrepi in posredno zatihanje: Izbira primernih zemljišč za setev koruze.					

INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE VVOI – najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabot		OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE	
ŠKODLJIVI ORGANIZEM	Pokalice – Žičniki – Strune: <i>Agriotes ustulatus</i> <i>Agriotes sputator</i> <i>Agriotes obscurus</i> <i>Agriotes lineatus</i>	Ličinke hroščev pokalic obžirajo seme, korenine in pritlehni del steba koruze. Največ ličink se pojavlja na njovah, kjer imamo v kolobarju občasno travnodeteljne mešanice, veliko žit in če so rjive občasno zanemarjene in močno zaplevljene. V sušnih obdobjih se napad strun poveča, ker skušajo ličinke nadomestiti izgubljeno vlago z izsesavanjem korenin. Opis škodljivca je dostopen na portalu IVR: Strune							
		Agrotehnični ukrep: Na številčnosti strun lahko vplivamo z agrotehničnimi ukrepi kot so: kolobar, obolevava tal, čas in način setve, ustrezeno gnojenje in zatiranje plevela. V poraščenih tleh (travišča, detelišča, monokultura žit) se povečuje število strun v tleh. Nekatere rastline, na primer ajda, lan, konopija, proso vplivajo na zmanjšanje števila strun v tleh, prepogosta setev žit, lucerne, deteleje pa njihovo številčnost povečuje. Če se proti strunam ne zavaruje posevkov je potrebno nekoliko povečati količino semena na hektar. Strune uničimo tudi ob večkratni mehanični obdelavi tal, kot so branjanje, česanje in okopavanja. Populacijo strun lahko zmanjšamo s preoravajanjem in večkratnim branjanjem zemljišča v suhem vremenu. Najboljše rezultate dosežemo, ko je temperatura tal >10 °C in se strune nahajajo v zgornjih 10 cm tal.							
		Tehnika zatiranja: Določeno učinkovitost proti strunam je moč doseči tudi z uporabo apnenega dušilka. Gre za dušično gnojilo z veliko vsebnosti kalcijevega oksida (19 % N, 50 % CaO). Pri njegovi uporabi se v tleh tvori plin (kalcijski cianamid-CaCN ₂), ki insekticidno deluje na strune. Okvirni odmerki znašajo do 400 kg/ha, pri čemer je potrebno aplikacijo gnojila opraviti vsaj 1 teden pred setvio, sicer lahko deluje fitotoksčno na kaleče rastline. Gnojilo je v granulirani obliki, zato ga v manjših količinah lahko dodajamo tudi neposredno ob setvi, pri čemer pa je potrebno paziti, da gnojilo vnašamo vsaj 5 cm stran od odloženega semena. Literatura navaja, da so na rastlinah koruze pri uporabi 100 kg/ha apnenega dušilka z dozatorji neposredno ob setvi, dosegli tudi do 60 % zmanjšanje prisotnosti strun in manj poškodb na rastlinah. CaCN ₂ deluje predvsem odvračalno na ličinke, sproščanje plina iz dodanega gnojila pa traja 1-2 tedna po aplikaciji, odvisno od okoljskih razmer (temperatura, vлага). Večja učinkovitost je dosežena, če se gnojilo aplikira v topla in vlažna tla.							
		KRITIČNO ŠTEVILLO: Kemična sredstva uporabljamo le na podlagi tahtnih pregledov (izkopov) in ugotavljanja kritičnih števil, ki jih izvajamo konec poletja ali zgodaj jeseni. Če kritično število ugotavljamo z metodo kopanja jam , je prag škodljivosti od ena do tri strune na m² . Na hektar izkopljemo najmanj pet jam velikosti 0,25 m ² (50 x 50 cm). Za ugotavljanje kritičnega števila lahko uporabljamo tudi rastlinske vabe , s katerimi privabljamо strune (npr. sadike solate, gosto posejana žita, gomolje krompirja, korenje itn.). Okolico vabe ocistimo vseh plevelov in drugih rastlin. Prag škodljivosti je v tem primeru od dve do pet strun na m² , upoštevati pa moramo gostoto setve (silažna koruza ali koruza za zrnje), stopnjo zaplevljenosti in kolobar saj lahko največji napad strun pričakujemo takrat, ko koruzo sejemmo v kolobarju za travno-deteljnini mešanicami ali žitom.							
	Majski hrošč <i>Melolontha melolontha</i>	Polski majski hrošč je pomemben škodljivec kmetijskih rastlin, ki se pri nas pojavlja že desetletja. Opis škodljivca je dostopen na portalu IVR: Polski majski hrošč		Agrotehnični ukrep in posredno zatiranje: Zatiranje odraslih osebkov je skoraj nesmiselno in najevečkrat ni potrebno. Večjo pozornost namenjamo ogrcem, zato je priporočljivo spremeljanje hroščevih let. Prag škodljivosti je pri ogrcih majskega hrošča zelo različen in odvisen od starosti (velikosti) ogrovev. Na njivah in travnikih je kritično število 15–20 ogrov na m² . Pri obvladovanju majskega hrošča je zelo pomembno uničevati plevel, saj je znano, da samice najraje odlagajo jajčeca v zaple veljene njive in travišča. Vsaka mehanska prepreka ali metoda, ki zmoti razvojni krog poljskega majskega hrošča, koristno pripomore k zmanjševanju populacije. Plitva obdelava tal med vegetacijo s krožnimi branami ali prekopališči, nekajkrat zaporedoma v sončnem vremenu. S tem poškodujemo del ogrovev, del pa jih na površju zemlje pozobajo ptice ali pa jih uniči sonce.					
	Koruzna vešča <i>Ostrinia nubilalis</i>	Koruzna vešča ima v večjem delu Slovenije dva rodova letno, na Primorskem se lahko pojavi tudi delni tretji rod, medtem ko ima na Gorenjskem samo en rod. Gosenice		klorantraniliprol deltametrin	Coragen Voliam Decis 2,5 EC	125 ml/ha 125 ml/ha 0,5 l/ha	7 dni 7 dni 30 dni	Prepovedan na VVOI.	

virtajo rove po steblih in storžih. Oslabljene rastline so manj produktivne, močnejše so napadene od glev, se lomijo in poležejo. V ugodnih razmerah (visoka zračna vlaga v obdobju cvetenja) lahko izgubimo tudi do 50% pridelka. Vešča ogroža tudi nekatere druge poljsčine (npr. hmelj), vrtine (npr. paprika) in okrasne rastline (npr. krizanteme). Opis škodljivca je dostopen na portalu IVR: [Koruzna vešča](#). Za uspešno zatihanje koruzne vešče je potrebno vsekakor intenzivno spremniti njen razvoj, let metuljev s svetlobnimi ali feromonskimi vabami in število odloženih jajčec oziroma jajčnih legel. **Po nekaterih podatkih je kritično število od štiri do osem jajčnih legel na sto pregledanih rastlin, po drugih podatkih pa je kritično število presegzeno, kadar najdemo jajčna legla na 12 do 15 % pregledanih rastlin.**

Agrotehnični ukrepi in posredno zatihanje:
Eden najučinkovitejših ukrepov za zatihanje koruzne vešče je pravočasno odstranjevanje koruznice s polj oziroma čim temeljitejše in čim bolj globoko zaoravanje, po možnosti sesečilanih koruznih ostankov. Zaoravanje koruznice opravimo čim prej, najbolje že v jesenskem času, saj so gosenice v podoranih steblih preko zime izpostavljene mikroorganizmom, ki zmanjšajo številčnost gosenic. Spomladansko zaoravanje koruznice je, posebno v sušnih obdobjih, veliko manj učinkovito kot jesensko. Poudariti je potrebno, da je večina gosenic prisotnih v koruznih storžih, zato je pomembno kam se le ti skladiščijo (v t.i. koruznike), če se ne posilirajo oziroma oluščijo. K zmanjšanju napada pripomore tudi ustrezni kolobar in pridelava koruze izven območij z velikim tveganjem, h katerim prištevamo predvsem lanskoletna (napadena) koruznišča in neobdelane oziroma zapelevljene njive, poti in obronke z veliko divjega pelina, enega glavnih gostiteljev, robove gozdov in živih mej z veliko debelostebelnih zeli.

INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE VVOI – najožje vodovarstveno območje		ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Ozimsna sovka <i>Agrotis segetum</i>	Večje škode od talnih sovk se v koruzi pojavljajo izrazito občasno, v presledkih 6 do 12 let. Zaradi tega tudi pri nas nimamo urijenega stalnega monitoringu za spremjanje leta metuljev in za napovedovanje pojava sovk. Gosenice talnih sovk se v maju in v začetku junija zavrtajo v razrastče koruznih rastlin in jih uničijo ali pa močno zavrejo njihov razvoj. Opis škodljivca je dostopen na portalu IVR: Talne sovke	Agrotehnični ukrep: Posevke je potrebno najmanj enkrat tedensko pregledovati na prisotnost gosenic. Njihov pojav in številčnost lahko predvidimo na podlagi ulova metuljev na svetlobne ali feromonske vabe. Z zgodnjim setvijo pripomoremo k manjši škodi, saj so rastline v kritičnem obdobju že večje in si lažje opomorejo. Tudi ustrezno gnjenje in oskrba omogoča hiter mladostni razvoj in s tem manj možnosti za pojav večje škode na rastlinah. Razvoju sovk ustreza vlažno okolje, zato med osnovne preventivne ukrepe spada tudi skrb za redno odstranjevanje in zatiranje plevelov. S predhodno obdelavo tal in okopavanjem lahko zmanjšamo številčnost bub in gosenic v teh.							
Ipsilon sovka <i>Agrotis ipsilon</i> Glagolka <i>Autographa gamma</i>	Tehnika zatiranja: Kritično število za okopavine sta 2 gosenici druge ali trejte razvojne stopnje na m ² . Pri nas je za zatiranje talnih sovk možno ob setvi uporabiti talne insekticid Trikaexpert, v sladki koruzi tudi Forceevo. Možna je tudi uporaba tretiranega semena; pripravek Force 20 SC (izredno dovoljenje do 15.5.2023).		deltametrin teflutrin	Decis 2,5 EC Force 1,5 G Force evo TelliX	0,5 l/ha 7 kg/ha 16–20 kg/ha 7 kg/ha	30 dni Čas uporabe			
Koruzni hrošč <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>			lambdā-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	Čas uporabe			

Agrotehnični ukrepi in posredno zatiranje:

Koruzni hrošč se je v Sloveniji razširil že vsa pridelovalna območja koruze. Opis škodljivca je dostopen na portalu M/R: **Koruzni hrošč**. Najpomembnejši in najbolj učinkovit ukrep zaomejovanje škod je **kolobar**. S prekinitev zaporedne pridelave koruze na istem zemljišču prekinemo razvojni krog koruznega hrošča. Ličinke nameč potrebujajo korenine koruze, da zaključijo svoj razvoj, v nasprotnem primeru poginejo. Priporočljiv je vsaj dvo, še bolje pa tri letni kolobar, kar pomeni, da se koruza na istem zemljišču prideluje vsaj vsako drugo ali tretje leto.

GOSPODARSKI PRAGOVI:

LIČINKE - Navzočnost in številčnost ličink koruznega hrošča ugotavljamo s pregledom talnih vzorcev (zemljo in korenine) dimenzije 18 x 18 x 10 cm. Vzorci naj bodo porazdeljeni enakomerno po celi njivi. Pri pregledu si pomagamo s črno podlagko (folijo), na katero postopoma stresamo zemljo s korenin. Gospodarski prag škode je presežen, ko v povprečju ugotovimo dve ličinki na vzorec.

HROŠČI - Najustreznejši način za ugotavljanje praga škodljivosti koruznega hrošča temelji na **vizualnem pregledu**, pri katerem ugotavljamo število hroščev ulovljenih na rumene lepljive plošče ali število hroščev na rastlino. Tako na osnovi ocenjevanja številčnosti hroščev v tekočem letu ugotavljamo gospodarsko škodo, ki bi jo naslednje leto povzročile ličinke z objedanjem korenin koruze. Prag gospodarske škode je določen za rumene lepljive plošče ameriškega proizvajalca (Pherocon AM/NB) in znaša 40 hroščev na ploščo na teden, oziroma približno 6 odraslih osebkov na ploščo na dan. Ker omenjene plošče niso enake kot plošče, ki se uporabljajo pri nas, je bolj zanesljiva metoda ugotavljanje števila hroščev na posamezni rastlini. Pri tem račinu v diagonalni pregledamo 100 rastlin (na 10 mestih po 10 rastlin) na posamezni njivi. Pregledamo liste, steblo, metlico in storž. Preglede izvajamo v prvi polovici avgusta, v obdobju od konca cvetenja do pozne mlečne zrelosti (BBCH 69-77). Gospodarski prag škode je presežen, če v povprečju ugotovimo 0,5 - 1 hrošča / rastlino. V primeru preseženega praga škode je v izogib škode v prihodnjem letu potrebno opustiti pridelavo koruze na tej površini. V primeru, da to ni mogoče, zatiramo odrasle hrošče z insekticidom ali v naslednjem letu uporabimo sredstvo za zatiranje ličink.

Neposredno kemično zatiranje odraslih hroščev je izvedljivo le z ustrezno mehanizacijo, saj se največ hroščev pojavi v času cvetenja – v polni višini koruze. Zatiranje jaljčec in ličink, ki so v zemlji, je mogoče z uporabo ustreznih talnih insekticidov. Pri nasje za zatiranje koruznega hrošča možno uporabiti foliarni insekticid Decis 2,5 EC proti odraslim hroščem ali ob setvi talne insekticide Force 1,5 G, Force evo, Teflix in Trika expert. Opazovalno napovedovalna služba napove optimalni čas zatiranja hroščev, ko številčnost populacije doseže višek.

Najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep za preprečevanje škode zaradi koruznega hrošča je ustrezен kolobar, saj je populacija hroščev bistveno manjša v koruzičih, kjer koruza sledi pšenici, sončnicam in drugim gojenim rastlinam, kot v koruzi, ki jo prideleujejo v monokulturi.

INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!		AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI				
Uši: <i>Rhophalosphum maidis</i>	Temnozeleni, do 2,3 mm velike uši se naselijo na metlice in listne nožnice. Neposredne škode uši navadno ne povzročijo so pa prenašalke virusov, zato jih izjemoma zatiramo le v semenskih posevkah.					
Navadna (hmeljeva) pršica <i>Tetanychus urticae</i>	Posredno zatiranje: V letih z izrazito vročo pomladjo in poletjem navadna (hmeljeva) pršica rada napade koruzu. Ogroženi so pozno posajeni posevki koruze za silažo, semenski posevki koruze in koruzna polja v neposredni bližini hmejišč in vrtnarji.					
Švedska mušica <i>Oscinella frit</i>	Posredno zatiranje: Ličinke mušice izsesavajo razrstišče in povzročijo, da propade srčni list koruznih rastlin. Zaradi tega koruzna rastlina propade v celoti ali pa požene veliko stranskih stebel, na katerih se razvijejo drobni slabo oplojeni storži. Škodljivec se na naših njivah pojavlja redno, vendar le v majhnih populacijah, tako da zatiranje ni potrebno.					
Osnovni pristopi pri zatiranju plevelov v koruzi:		<p>Pri uravnavanju plevelne vegetacije v pridejavi koruze so podobno kot pri gojenju drugih kulturnih rastlin prav tako pomembni preventivni ukrepi. S temi v veliki meri preprečimo, da bi se znašli v položaju, ko stanje zaplevljenosti ni več obvladljivo ali pa je zaradi velikega pritiska plevelne populacije že nastala precejšnja gospodarska škoda. Z uporabo učinkovitih preventivnih strategij lahko uspešno zmanjšamo osnovno plevelno populacijo še pred setvijo našega posevka in tudi v primeru, da zaradi zunanjih dejavnikov (vremenske razmere, itd.) naši ukrepi zatiranja plevela niso med najbolj učinkovitimi, ne prihaja do izgube pridelka. Uporaba preventivnih strategij nam omogoča večjo prilagodljivost pri izbiro samih ukrepov zatiranja plevela. Tako lahko v primeru zelo nizke zaplevljenosti uporabimo tudi mehanske metode zatiranja, ki so praviloma manj učinkovite, vendar z njimi še vedno dovolj uspešno uravnavamo plevelno populacijo, da ne prihaja do izgub pridelka ali semenjenja plevelnih vrst. Učinkoviti preventivni ukrepi pa so toliko bolj pomembni tudi kadar uporabljamo le herbicide, ker na ta način zmanjšujemo pritisk na posamezne zeli učinkovite pripravke iste aktivne snovi, ki jih večkrat zapored uporabljamo na isti površini. Tako se z nizjo osnovno populacijo in širšim izborom ustreznih pripravkov znižuje tudi verjetnost, da bi prišlo do pojava odpornosti posameznih plevelnih vrst na določene aktivne snovi. Med preventivnimi ukrepi je na prvem mestu kolobar ter vsi drugi sanitarni ukrepi s katerimi preprečimo težave s pleveli preden do njih sploh pride. Med temi so najpomembnejši uporaba čistega in certificiranega semena, uporaba gnoja in gnojevke brez plevelnega semena, čista kmetijska tehnika ter oskrbovani robovi njiv. Prav tako lahko z gojitenimi ukrepi kot so dobro pripravljeno setvišče, pravilen čas setve, ustrezno gnojenje in namakanje v dobršni meri povečajo tekmovalno sposobnost koruze in s tem zmanjšamo potrebo po uporabi kemičnih in mehanskih ukrepov zatiranja plevela. Izpostaviti velja tudi vključitev strniščnih dosevkov v pridelovalni sistem. Že sama pravočasna obdelava bo v veliki meri zmanjšala velikost plevelne populacije, še višji pozitiven učinek pa bomo dosegli, če bomo prazna strnišča posejali s strniščnimi dosevkami. Strniščne dosevke smo v preteklosti vključevali v kolobarnne sisteme predvsem zaradi ugodnih okoljskih vplivov kot so zaščita pred erozijo, preprečevanje izpiranja dušika izven rastne dobe, izboljšanje strukture tal in povečevanje organske snovi. V zadnjem obdobju pa le-ti predstavljajo dodatno orodje za sistemsko naravljano integrirano zatiranje plevelov, ki lahko v veliki meri vplivajo na manjšo zaplevljenost v koruzi, kot najpomembnejšem kolobarnem členu pri nas. Strniščni dosevki v pozno poletnem in jesenskem obdobju s svojim tekmovanjem za svetlobo, hraniila in vodo preprečujejo rast, razvoj in tvorbo semena različnih plevelnih vrst. Rastlinski ostanki, ki jih spomladji pustimo na površini (mulč) ali pa jih plitko zadelamo v tla, preprečujejo vznik plevelov. V pridelavi koruze je najbolji razširjenja tehnika direktne setve v mrtvo zastirko iz prezimnih dosevkov. Pri tej tehnologiji uporabimo posebne valjarje s spiralnimi prečnimi rezili (angl. roller crimper), ki dosevke močno stisnejo k tlu in rastline večkrat prelomijo do takšne stopnje, da le-ti počasi propadajo na površini. Metoda je učinkovita, če je zastirka gosta in debela vsaj 6-8 cm. Najbolj pogoste vrste za ta namen so prezimne mešanice iz metuljnici (npr. grašice). Koruzu lahko pridelujemo tudi v tehnologiji žive zastirke iz podsevkov, kjer ob zadnjem medvrstnem okopavanju vsejemo podsevek (npr.; belo deteljo, ajdo, trpežno ljužko in podzemno deteljo). Obe tehnologiji sta s stalniča izgube pridelka precej tveganii in precej odvisni od vremenskih razmer. Že najmanjše napake v tehnologiji lahko privedejo do tega, da postanejo dosevki na pridelki koruze ob pomaranjanju vlage v tleh.</p>				
Uporaba herbicidov v sirku:		<p>Glavna ovira pri kemičnem zatiranju plevelov v sirku pri nas je pomanjkanje registracij herbicidov. Trenutno imamo na voljo pripravke Dual Gold 960 EC, Efica 960 EC (S-metotaklor), Stomp Aqua (pendimetalin), Basagran 480 SL (dikamba).</p>				

**INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE
VVOI-najožje vodovarstveno območje.** Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NACIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA/OPOMBE
Enoletni ozkolistni pleveli Večletni ozkolistni pleveli, ki se razvijajo iz semen, nekatere vrste širokolistnega plevela	Pred vznikom plevela ali v fazi vznikanja. Tudi po vzniku koruze.	dimetenamid -P	Frontier X-2	1 – 1,4 L/ha	Čas uporabe Prepovedan na VVOI.
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom koruze in plevelov (možna uporaba tudi takoj po vzniku):	pendimetalin	Stomp Aqua Sharpen plus Sharpen 33 EC	3,3 l/ha 2,5 – 4 l/ha 3-5 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe Čas uporabe
	terbutilazin + S-metolaklor	Primextra TZ Gold 500 SC	2,3-4,5 l/ha ^a		Čas uporabe aodvisno od tal, vznika, Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.
	terbutilazin + dimetanamid-P	Akris	3 l/ha		Čas uporabe. Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.
	izoksaflutol	Merlin F Texx	0,3 – 0,4 l/ha		Čas uporabe
	izoksaflutol + tienkarbazon-metil	Adengo	0,44 l/ha		Čas uporabe
	S-metolaklor	Dual Gold 960 EC Efica 960 EC	1 – 1,5 l/ha 1 – 1,5 l/ha		Čas uporabe, 91 dni silažna k.; Prepovedan na VVOI.
Enoletni širokolistni pleveli.	Po vzniku koruze.	piridat	Onyx	1,5 l/ha	Čas uporabe
Enoletni in večletni širokolistni pleveli:	Po vzniku koruze in plevelov.	dikamba+tritosulfuron bentazon	Arrat Callam Basagran 480 Beni Banvel 480 S	0,2 kg/ha 0,3 kg/ha 1,5 – 2 l/ha 1 kg/ha 0,6 l/ha	Čas uporabe, za zeleno krmo 28 dni. Prepovedan na VVOI.
	dikamba	Kalimba Dicash Kamba 480 SL	0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 L/ha		Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
	dikamba + nikosulfuron + prosulfuron	Mural	0,6 – 0,75 l/ha		Čas uporabe, za zeleno krmo 28 dni. Prepovedan na VVOI.
2,4-D-2-EHE	Esteron	Spandis	0,4 kg/ha		Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.
2,4-D	Herbocid XL		1 l/ha		Čas uporabe
florasulam + 2,4-D 2-EHE	Mustang 306 SE		1,25 l/ha		Čas uporabe
klopíralid	Lontrel 100 -v uporabi do 30.4.2023		0,5-0,6 l/ha 1-1,2 l / ha		Čas uporabe
	Lontrel 72 SG		0,17 kg/ha		70 dni. Prepovedan na VVOI.
					Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.

		Clap	0,3 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
	fluorokspipir	Starane forte	0,54 l/ha	Čas uporabe
	tifensulfuron -metil	Harmony 50 SX	22,5 g/ha	Čas uporabe
	prosulfuron	Peak 75 WG	20 g/ha	Čas uporabe

INTEGRIRANO VARSTVO KORUZE

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabot!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA/OPOMBE
Enoletni in večletni širokolistni in ozkolistni pleveli:	Po vzniku koruze in plevelov:	nikosulfuron	Motivell Motivell extra 6 OD Kelvin OD Nicosh Samson extra 6 OD Samson 4 SC Milagro extra 6 OD Milagro 240 SC Entail Bandera Primer Talisman Kelvin max Stretch Victus OD dikamba + nikosulfuron nikosulfuron + rimsulfuron dikamba+nikosulfuron + rimsulfuron rimsulfuron	1 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 0,75 l/ha 0,17 l/ha 0,17 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1,125 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,8 l/ha 70 g/ha 350-440 g/ha 440 g/ha 40 – 60 g/ha 60 g/ha 60 g/ha 50 g/ha 1,15 – 2,25 l/ha 0,25 – 0,5 kg/ha 2 – 2,5 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. 60 dni; Prepovedan na VVOI. Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Čas uporabe; Prepovedan na VVOI. 63 dni za silažo, čas uporabe za zrnje. Prepovedan na VVOI. Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Čas uporabe Čas uporabe. Uporaba močila. Čas uporabe

	foramsulforun + tienkarbazon-metil tembotrión + tienkarbazon-metil cikloksidim	Monsoon active Capreno Focus ultra *A	0,75 – 2,0 l/ha 0,3 l/ha 1–4 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe Čas uporabe * A konuza odporna na cikloksidim in samo proti ozkolistnim plevelom Čas uporabe
Ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom ob zadostni talni vlažnosti oziroma po vzniku konuze do razvojne faze BBCH-14	ezotrión Callisto 480 SC Osorno Temsa SC Botiga Calaris Pro	0,15 – 0,3 l/ha 1,0 l/ha 1,0 l/ha 1 l/ha 2–2,3 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe. Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.
	mezotrión + S-metolafktor + terbutilazin	Lumax Lumax H 537.5 SE	3–4 l/ha 3–4 l/ha	Čas uporabe. Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.
	mezotrión + nikosulfuron	Elumis	1,5 l/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.
	mezotrión + nikosulfuron + rimsulfuron	Arigo	0,33 kg/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.
	petoksamid	Successor 600	2 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI. Varnostni pas do voda!
	petoksamid + terbutilazin	Koban TX	4 l/ha	Čas uporabe. Terbutilazin 1x na istem zemljišču vsako 3. leto. Prepovedan na VVOI.
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni pleveli;	Pred vznikom žit	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme) glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliku kalijeve soli	1,2 – 4,0 l/ha ^a	Čas uporabe odvisno od časa uporabe (pred ali po setvi)

12.3 INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

SKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Krompirjeva plesen <i>Phytophthora infestans</i>	Opis bolezni: Krompirjeva plesen je najbolj nevarna bolezen krompirja, ki se širi v hladnem in deževnem vremenu. Okužuje vse rastline in delce. Pomemben vir okužbe so posajeni okuženi semenski gomolji iz katerih zrastejo nove rastline, ki so že okužene s plesnijo. Znaki se pojavijo zelo zgodaj med rastjo, in sicer v obliki rijavih peg po steblu do rastnega vršička, ki navadno odmre. V vlažnih razmerah je viden sivo bel micočelj. Iz teh rastlin se plesen s trosvonki nato po zraku širi na sosednje rastline ter druge rastline v nasadu in okolicu. Na listih v začetni fazi okužbe opazimo majhne svetlo sive ali svetlo rjave pegje nepravilnih oblik, obkrožene s svetlo zelenim robom. Širjenje peg ni omejeno z listinimi žilami in v optimalnih razmerah hitro napreduje po vsei listni površini. V vlažnem vremenu se na spodnji strani lista na pegah izoblikujejo trosonosci s trosvoniki, ki jih vidimo kot sivo bele preyleke. Spodnji listi so običajno bolj prizadeti, saj so bolj občutljivi, hkrati so pri tleh tudi ugodnejše razmere za okužbo (večja zračna vlaga). Na steblu se bolezen najpogosteje pojavi v pazduhah listnih pecijev, kjer se voda najdije zadržuje. Na mestu okužbe stebia potemnijo. Ob ustreznih vremenskih razmerah lahko v nekaj dneh propadejo vsi nadzemni deli rastline, pokončna ostanejo le še stebla. Na gomoljih so okužbe sprva površinske, kasneje lanko prodrejo tudi nekaj centimetrov v globino. Obolelo tkivo je suho, rdečkasto rjave barve in daje zmat vtis, meja med zdravim tkivom pa ni povsem jasna. Običajno se po okužbi gomolji okužijo še z drugimi glivami in bakterijami, zato se videz prizadetih gomoljev lahko tudi spremeni.	cimoksaniil	Sacron 45 DG Cymbal Curzate partner	0,22 kg/ha 0,2 – 0,25 kg/ha 0,15 kg/ha	14 dni 7 dni 1 dan	Upoštevati je potrebno varnostni pas do voda (navodila za uporabo)	
Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcev			cimoksaniil + mandipropamid	Carial flex	0,6 kg/ha	7 dni	

- preprečevanje odlaganja odpadnega krompirja v naravo nakaljevanje zgodnih sort, da dozirjo pred pojavom plesni	cimoksani + bakrov hidro.	Copforce extra	2 kg/ha	14 dni
- sajenje manj občutljivih sort	oksaipiprolin + bentivalkarb-izopropil	Zorvec Endavia	0,4 l/ha	7 dni
- sajenje neokuženih gomoljev	cimoksani + propamokarb hidroklorid	Proxanil 450 SC Rival duo	2 - 2,5 l/ha 2,5 l/ha	14 dni 14 dni
- ustrezna gostota sajenja	cimoksani + zoksamid	Reboot	0,45 kg/ha	7 dni
- ustrezno osipanje, plast tal nad gomolji ob osipanju vsaj 5 cm, kar preprečuje izmanjšuje okužbe gomoljev z zoosporami redno pregledovanje nasadov na prisotnost plesni (primarne okužbe, ki se običajno najprej pojavijo na steblih in sekundarne okužbe, običajno na listih)	ameetoktradin + metiram	Enervin	2 kg/ha	7 dni
- izkop v primernih razmerah ob pravem času, da preprečimo okužbo gomoljev	ciazofamid	Ranman top	0,5 l/ha	7 dni
	dimetomorf + fluazinam	Banjo forte	1 l/ha	7 dni
	dimetomorf + ameetoktradin	Orvego	0,8 l/ha	7 dni
	fluazinam	Banjo	0,4 l/ha	7 dni
		Winby	0,4 l/ha	7 dni
		Frowncide	0,4 l/ha	7 dni
		Shirlan 500 SC	0,4 l / ha	7 dni
	fluopikolid+ propamokarb	Infinito	1,2 – 1,6 l/ha	7 dni
	mandipropamid	Revus	0,6 l/ha	3 dni
	mandipropamid + difenkonazol	Revus top	0,6 l/ha	3 dni
	metiram	Polyram DF	2 kg / ha	21 dni
	bakrov oksiklorid	Cuprablau Z 35WG	2,1 kg/ha	14 dni
	bakrov oksiklorid+ bakrov hidroksid	Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha	14 dni
	bakrov oksid	Badge WG	3 kg/ha	7 dni
	azoksistrobin + fluazinam	Nordox 75 WG	1 kg/ha	14 dni
		Zignal super	0,5 l/ha	7 dni

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

Tehnika zatiranja: Začetek škropiljenja in število škropiljenj je odvisno od občutljivosti sorte, roka sajenja, roka spravila ter vsakoletnih vremenskih razmer. Pri zgodnjih sortah v nekaterih letih zatiranje ni potrebno, ker se glavni razvoj krompirja zaključi preden se v naravi pojavi zelo dobrski pogoj za hiter razvoj glive. V zadnjih letih je pojav plesni vse bolj zgoden, zato je vse bolj pogosto potrebno opraviti tudi pri zgodnjih sortah. Pri srednjih poznih in poznih sortah, ki pri nas prevladujejo, je za preprečitev okužbe potrebno več škropiljenj s fungicidi. Prva škropiljenja običajno izvedemo v začetku zapiranja vrst s kontaktnimi (metiram) ali polsistemičnimi pripravki (dimetomorf, ...), če so razmere za razvoj plesni ugodne in to kaže tudi negativna prognoza pa je s škropiljenji potrebno prizeti tudi prej. Posebej je potrebno paziti, če so v bližini drugi okuženi posevki. Pri polsistemičnih in kontaktnih fungicidih moramo upoštevati, da z njimi ne moremo neposredno varovati gomojjev. Pozneje uporabljamo sistemične (propamokarb) ali polsistemične pripravke. Za vsako škropiljenje uporabimo drug pripravek. Sistemike uporabimo največ dvakrat zapored, nato pa naredimo presledek s kontaktnim pripravkom, z iprovalikarbom in propamokarbom. Enako sistemično ali polsistemično aktivno snov smemo v enem letu uporabiti največ dvakrat. Skupno letno sistemikov iz skupine acilalaninov in fenilamidov naj nebi uporabili več kot štirikrat. Če so razmere za razvoj bolezni ugodne že v polovici maja pričnemo sistemike uporabljati že pri prvem škropiljenju. Uporaba strobilurinskih pripravkov v obdobju najbolj bujne rasti in ob hkratnih zelo ugodnih razmerah za fitofitoro ni priporočljiva, ker se aktive snovi ne uspejo dovolj hitro porazdeljevati po rastlini. Smiseln je predvsem preventiven pristop, ker tudi najboljši sistemiki nimajo dobrega kurativnega delovanja. Posebej pomembno je to v letih, ko se fitofitora pojavi zgodaj. Pravih kritičnih števil za začetek škropiljenj in za nadaljnja škropiljenja ne poznamo. Ukrepati začnemo po napovedi prognostične službe ali, ko v času zapiranja vrst opazimo prve pege. Če v nasadu opazimo primarne okužbe plesni zrasle iz semenskih gomojjev, moramo take rastline čimprej odstraniti iz nasada, tako da ne širimo okužbe, okuženo mesto pa še posebej zaščititi s fungicidi. Nekateri pridelovalci pri nas prezgodaj prenemata proti plesni. Ob uničenju krompirjeve zaradi plesni, z izkopom počakamo vsaj 2 do 3 tedne, da zoospore plesni v tleh propadejo. Tako preprečimo okužbo gomojjev ob izkopu, ki se nato širi po pridelku v skladišcu. Za škropiljenje je traktor dobro opremiti s priročnimi odgrinjali, s katerimi vsaj delno odgremo krompirjevko, da je pri vožnji ne poškodujemo preveč. Uporabljamo od 300 do 500 litrov vode na hektar.

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Črna listna pegavost <i>Alternaria solani</i>	Opis bolezni: Na listju se ob dovolj toplem in vlažnem vremenu pričnejo pojavitati temne, v začetku vodorene razmehčane pege (2 do 5 mm). Ko se pege pričnejo sušiti v njihovi notranjosti opazimo koncentrične kroge. Listno tikivo ob pegan rumeni. Na gomoljih se pojavijo vdrite temne oplutene pege. Okuženi gomolji v skladisču hitro izgubljajo vago. Gliva se ohranja na ostankih in na okuženih gomoljih. Agrotehnični ukrepi so podobni, kot pri poslednjem zatirjanju krompirjeve plesni.		azoksistrobin	Chamane Mirador 250 SC Norios Ortiva	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha	Zagotovljena s časom uporabe 7 dni Zagotovljena s časom uporabe 7 dni Zagotovljena s časom uporabe 7 dni	
	Tehnika zatiranja: Črne listne pegasnosti na listju navadno ni potrebno zatirati s posebej izbranimi pripravki, ker večina pripravkov za zatiranje plesni deluje tudi na to bolezen, vendar ne vsi. V zelo suhem in vročem vremetu, ko ni nevarnosti za razvoj krompirjeve plesni, lahko uporabilo pripravke, ki delujejo le na črno listno pegasost. Gliva se prične bolj intenzivno razvijati ko temperature pesjejo 30 °C in je na voljo še dovolji vlage, kar se v zadnjih letih lahko zgodi že v maju ali juniju, običajno pa šele sredji poletja, ko se listje tudi nekoliko postara. Pri občutljivih sušnih razmerah in takrat lahko povzroči podobne izgube pridejka, kot plesen. S škropljenjem pričnemo, takojo ko so razmere za razvoj bolezni ugodne.		azoksistrobin + fluazinam difenokonazol difenokonazol + mandipropamid difenokonazol + fluksapiroksad fluopiram + protiokonazol bakrov oksiklorid	Zignal super Mavita 250 EC Score 250 EC Difcor 250 EC Revus top Sercadis plus Propulse Cuprablau Z 35 WP	0,5 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,5 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha 0,5 l/ha 3 kg/ha	7 dni 3 dni 3 dni 14 dni 3 dni 3 dni 21 dni 14 dni	
Bela noga krompirja	Opis bolezni:		azoksistrobin	Mirador 250 SC Ortiva	3 l/ha 3 l/ha	7 dni 7 dni	

<i>Rhyzoctonia solani</i>	<p>Vir kužila so črni sklerociji na gomoljih, sklerociji v tleh in na ostankih drugih gostiteljskih rastlin. Ob sajenju močno okuženih gomoljev propade veliko kalic, zato grmi vzniknejo zelo pozno in imajo majhno število stebel (pogosto le eno). Ta steba so običajno odebela, v pažuhah listov so vidni zračni gomoljčki, na vrhu steba so listi v vršičku zvit, rumenijo (tudi z vijoličnim obarvanjem) in predčasno zavjetijo. Stebla na prehodu iz zemlje počnijo, na njih se naredi bela plesniva prevleka. Gomolji so številčnejši, drobni, deformirani, z razpokami ali luknjami z znacičino mežasto kožico. Odpornih sort ni.</p> <p>Tehnika zatijanja: Proti beli nogi se borimo z ustreznim kolobarjem, s sajenjem neokuženih gomoljev. Z izboljševanjem strukture tal, da so tla zračna in prepustna za vodo. Pogosto rahljanje tal zmanjuje možnosti za razvoj glive. Gliva se najbolje razvija na težkih razmočenih slabih zračnih tleh. Gomolje lahko razkužujemo pred saditvijo v skladšču ali na sadilniku ob saditvi. Pri uporabi nekatih aktivnih snovi škropimo tla ob saditvi, saj nanašanje fungicida na gomolje vpliva na njihovo kalitev.</p>	Zaffra AZT 250 SC	3 l/ha	7 dni
	flutolanil	Monicut	200 mL/1 tono gomoljev	Zagotovljena s časom uporabe
	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i>) str. QST 713	Serenade ASO	5 l/ha	Ni potrebna
	fluksapiroksad	Sercadis	20 mL/100 kg oz. 0,8 L/ha	Zagotovljena s časom uporabe
	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,25 - 0,5 kg/l gomoljev oz. 2,5-5 g/10 kg gomoljev	1 dan oz. zagotovljena s časom uporabe
	<i>Pseudomonas</i> sp. sev DSMZ 13134	Proradix	2 g na 100 kg gomoljev oz. u 60 g na ha	Ni potrebna

<p>Črna noga krompirja <i>Pectobacterium carotovorum</i> subsp. <i>Brasiense</i>, <i>Pectobacterium wasabiae</i>, <i>Pectobacterium atrosepticum</i> <i>Dickeya solani</i>,</p>	<p>Opis bolezni: Različne vrste bakterij iz skupine črne noge povzročajo različne znake na rastlinah in mokro gnilobo na gomoljih. Okuženi gomlj pri vseh vrstah pogosto prapadejo že pred saditvijo ali v teh pred vznikom. <i>P. brasiliense</i> in <i>P. wassabiae</i> v različnih fazah rasti po vzniku povzročata venjenje in in hiter prapad rastlin, pri nekatrini sortah tudi rumenjenje rastlin. Stebla v spodnjem delu popolnoma prapadejo, razbarvanje ni tako intenzivno. <i>Dickeya solani</i> se kaže z znaki rjavjenja in prapada tkiva stebel po celotni rastlini, ki nato oveni in prapade. V ugodnih razmerah se hitro širijo na sosednje rastline v nasadu. Meso gomoljev se ob okužbi in širjenju na prizadetem delu razbrava in postane kašasto, tekoče ter smrdeče in v zelo kratkem času propade. V skladšču se se okužba z bakterijami izjemno hitro širi na sosednje gomolje in lahko povzroči prapad celotnega pridelka. <i>P. atrosepticum</i> povzroča značilno intenzivno rumenjenje rastlin, ki v kratkem času prapadejo. Stebla pri tleh izrazito počrnijo in propadejo. Okužba se po stolonih lahko razširi na mlade gomolje, ki na stolonovem delu počrnijo in prapadejo. V nasadu se v naših razmerah širi manj intenzivno.</p>	<p>Tehnika zatiranja: Neposredno kemično zatiranje teh bakterije ni možno. Osnovni vir kužila so okuženi gomolji in okužena tla (ki smo jih v prejšnjih letih okužili z okuženim semenom). V zadnjih 10 do 15 letih nove vrste bakterij preživijo v tleh tudi v naših razmerah, pred tem tega nismo opažali. Zato je težišče zatiranja te bolezni pri semenarjih, ki morajo pridelati neokužene ali čim manj okužene gomolje ter v izbiri neokuženih tal. Pomembno je obvladovanje mehaničnih poškodb in čim hitrejše sušenje gomoljev pri vseh fazah spravila, skladisčenja in priprave gomoljev. Pridelovalci morajo zagotoviti čim dajški kolobar (kar sicer ne prepreči okužbe, jo pa lahko omil) ter dovolj zgodaj izločati napadene rastline v nasadu. Če opazimo zelo zgoden napad prenehamo z mehaničnim zatiranjem plevelov (pred/sem česanjem), da bakterije ne raznašamo po nasadu z orodji.</p>	<p>Opis bolezni: Ob okužbi rastline venijo. Osnovni razpoznavni znak krompirjeve obročaste gnilobe je viden na prerezu okuženih gomoljev. Razpadajoči cevni povezki oblikujejo zdrizast obroč v obliki enega ali več kolobarjev.</p>
<p>Krompirjeva obročasta gniloba <i>Clavibacter sepedonicus</i></p> <p>Krompirjeva rjava gniloba <i>Ralstonia solanacearum</i></p>	<p>Opis bolezni: Ob okužbi rastline venijo. Osnovni razpoznavni znak krompirjeve obročaste gnilobe je viden na prerezu okuženih gomoljev. Razpadajoči cevni povezki oblikujejo zdrizast obroč v obliki enega ali več kolobarjev.</p> <p>Pri krompirjevi rjadi gnilobi bakterije najprej uničijo prevodna tkiva ob popku in očesih. Na tistem delu se začnejo v notranjost okrog prevodnih sistemov širiti rjava vlastni madeži. Grmi krompirja ali posamezna steba običasno ovenijo, po dežju pa ponovno dobijo turgor. Bakterija se pospešeno prenaša z ostanki krompirja, pri mehanični obdelavi in namakanju.</p>	<p>Tehnika zatiranja: Pomembno je, da ločimo znake črne noge in obeh omenjenih bolezni. Obe bolezni se prenašata z okuženimi gomolji, zato je pomembno, da sadimo neokužen semenski krompir.</p> <p>V primeru suma na krompirjevo obročasto ali rjava gnilobo, ki sta karantenski bolezni, je potrebno obvestiti UVH/VNR. V primeru potrditve okužbe se ukrepa v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1194 o uvedbi ukrepov za izkoreninjanje in preprečevanje širjenja <i>Clavibacter sepedonicus</i> ter izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1193 o uvedbi ukrepov za izkoreninjanje in preprečevanje širjenja bakterije <i>Ralstonia solanacearum</i>.</p>	

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Navadna krastavost <i>Streptomyces scabies</i> <i>Streptomyces acidiscabies</i> <i>Streptomyces turgidiscabies</i>	Opis bolezni: Navadna krastavost je bakterijska bolezen, ki na gomoljih povzroča različne oblike in globine krastavosti ter mežasto krastavost. Če kraste niso pregloboke, so gomolji primerni uporabo, le njihova tržna zanimivost je manjša. Navadna krastavost je vsepoljšno razširjena v teh.	Tehnika zatiranja: Različne sorte so različno občutljive na pojav navadne krastavosti in kažejo tudi razline znake, zato izbiramo manj občutljive sorte. Zagotoviti je potrebno čim širši kolobar. Navadno krastavost pospešuje obilno gnojenje z nefermentiranimi organskimi gnojili in kolobar z velikim deležem žit in travinja. Na bazičnih teh okužbe ublažimo z uporabo kislo delujučih mineralnih gnojil. Tal ne apnimo pred saditvijo krompirja, saj tako pospešujemo pojav navadne krastavosti. Z namakanjem (zagotavljanjem vlažnosti tal nad 85 % poljske kapacitete) v času enega meseca od začetka nastavljanja (iniciacije) gomoljev lahko pojav navadne krastavosti preprečimo ali močno omilimo. Bakterija se hrani na sladkomi peši in korenovkah. Malomarno spravilo teh poljščin omogoča dobre pogoje za ohranjanje te bakterije. Kemičnega zatiranja ne izvajamo.					
Prašnata krastavost <i>Spongospora subterranea</i>	Opis bolezni: Pri prašnati krastavosti nastanejo na kožici krompirja drobnii kraterički polni črnega prahu. Prašnata krastavost se pojavlja občasno. Pri manj občutljivih sortah so kraste plitve in ne povzročajo nastanka deformiranih gomoljev.	Tehnika zatiranja: Prašnata krastavost je pogosta v hladnih pesčenih tleh, posebej če v zgodnjem poletju pada veliko padavin. V začetku pogojih napade tudi korenine in stolone. Tla z reakcijo pod 5,2 nekoliko apnimo. Za sajenje izberemo neokužene gomolje. Ostankov okuženih gomoljev ne mečemo na gnoj.					
Srebrolikost gomoljev <i>Helminthosporium solani</i>	Opis bolezni: Srebrolikost je na pri nas pridelanem krompirju zelo pogosta bolezen. Zaradi okužb so gomolji manj tržno zanimivi in se slabše skladiščijo (pospešeno izgubljanje vlage). Pri srebrolikosti na površini gomoljev opazimo streljivo preyleko, ki se širi tudi v skladiščih.	Tehnika zatiranja: Glijva se pospešeno razvija šele po izkopu, če krompir ni ustrezno skladiščen, zato ima lahko priprava na skladiščenje večji pomen, kot razvoj glive na njivi. Pred skladiščenjem se morajo gomolji čim hitreje posušiti. Neposrednega zatiranja glive z razkuževanjem gomoljev pred sajenjem in skladiščenjem semena pri nas ni mogoča, saj ni registriranih priravkov. Uporaba razkužil za zatiranje bolezni pred skladiščenjem jedilnega krompirja pri nas ni dovoljena.					
Bela trohnoba krompirja <i>Fusarium solani</i> <i>Fusarium sp.</i>	Opis bolezni: Iz gomoljev okuženih z različnimi fuzarijskimi glivami nastanejo rjave trde mumije z votilino polno belkastih micelijskih bradavic. Po okužbah gomoljev z glivo povzročiteljico gangrene s začetku pojavijo podobni znaki, kot pri beli trohnobi, pozneje pa se razvijejo manjše votilne obdane z porjaveljim skorjastim mesom, ki se ostro loči od zdravega tkiva. V votilnah je svakast micelij v katerem nastajajo rdečkasto rjavkasta piknicijska zrnca.	Tehnika zatiranja: Spore gliv iz rodu <i>Fusarium</i> so vedno prisotne na gomoljih že ob izkopu pred skladiščenjem. Obseg poškodb gomoljev in klima v skladišču v največjem obsegu odločata o razvoju suhe fuzarijske trohnobe. Ukrepi na njivi nimajo velikega vpliva. Gliva povzročiteljica gangrene pri nas ni splošno razširjena, okužbe večinoma izvirajo iz uvoženega semenskega krompirja. Če ugotovimo, da je gliva uničila grme že na njivi, jih izločimo pred spravilom. S spravilom ne odlašamo predolgo, ker se gomolji okužijo s trosi, ki se sproščajo iz propadajoče krompirjeve. Za razvoj obeh gliv v skladišču so najbolj ugodne temperature med 4 in 8 °C in nizka vлага.					
Verticilijska ovelost <i>Verticillium sp.</i>	Opis bolezni: Verticilijsko in fuzarijsko ovelost navdano spregledamo in znake pripišemo drugim boleznim. Pri obeh so vir	Tehnika zatiranja: Glavni dejavnik pri zatiranju bolezni je sajenje neokuženih gomoljev. Spremljanje okužb v nasadih semenskega krompirja je zelo zahtevno. Kemično zatiranje daje omejene rezultate. Obe					

Fuzarijska ovelost <i>Fusarium oxyssprium</i>	kužila latentno okuženi gomolji in delno ostanki propadle krompirjevke in številnih drugih gostiteljskih rastlin. Značilno je sektorsko venenje posameznih stebel, posameznih listov na steblu ali celo posameznih lističev v sestavljenem listu. Grmi zaostajajo v rasti in zelo zgodaj se kažejo znaki zorenja krompirjevke. Na prerezu stebel ugotovimo potemnele cevne povezke.	glivi sta zelo polifagi in napadata tudi številne vrtnine in okrasne rastline. Za gnojenje krompirja ni priporočljivo uporabljati kompostov, ki jih pripravljajo na vrtnarjih iz ostankov občutljivih vrtnin (npr. paradiznik, paprika, rajčevce, fižol, hmelj, kumare, bučke, ...).
		Uporaba sredstev za preprečevanje odganjanja kalic v času skladiščenja krompirja je dovoljena v skladu z navodili za uporabo registriranih sredstev. Uporabimo jih le kadar je uporaba zares potrebna (pozne sorte, dolgotrajno skladiščenje). Uporaba fungicidov na uskladiščenem merkantilnem krompirju ni dovoljena.

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Črna pikavost gomoljev <i>Colletotrichum coccodes</i> <i>C. atramentarium</i>	Opis bolezni: Za bolezen je značilno, da se kaže v venenju posameznih stebel v grmu, ki se predčasno posušijo. Osnovni vir kužila so zelo drobni mikro-sklerociji, ki se držijo gomoljev in razpadajočih ostankih krompirja in drugih poljskih (buče, kapusnice, ...). Če je junij zelo moker ali ob peobilnem namakanju, se lahko intenzivno širi po nasadu. Okužene rastline kažejo zanke lokalne ovenosti, ki se pojavi v drugem delu razvoja krompirja. Korenine in pritehni deli steba pojavijo zunanja skorja odstopi od stržena, obdanega z belim micejiljem s svetlo vijoličnim pridihom, na katerem so vidni sklerociji (pod lupu vidimo okrogle sklerocije z bodicami). Nasadi prečasno dozorijo.	azoksiastrobin Norios Ortiva Zafra azt 250 SC Mirador 250 SC	Chamane Norios Ortiva Zafra azt 250 SC Mirador 250 SC	3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha 3 l/ha	Zagotovljena s časom uporabe Zagotovljena s časom uporabe 7 dni 7 dni 7 dni	Zagotovljena s časom uporabe Zagotovljena s časom uporabe 7 dni 7 dni 7 dni	
Krompirjev rak <i>Synchytrium endobioticum</i>	Opis bolezni: Predvsem na gomoljih se pojavijo bradavičaste novotvorbe. Gliva se ohrani v tleh v obliki trajnih spor za veliko let.			Tehnika zatiranja: V nasadih je ne moremo uspešno kemično zatirati. Nasadi se lahko predčasno posušijo, kar ima za posledico do 30 % zmanjšanje pridelka. V skladisču gomolji zaradi površinskih nekroz zelo hitro izgubljajo vlago. Občutljivih sort ne smemo saditi na lahka peščena in sušna tla, in na tla, kjer primanjkuje kalija.			Tehnika zatiranja: Saditev odpornih sort. Krompirjev rak je karantenska bolezen, ki ima omejene vendar upoštevanja vredne možnosti za pojavljanje pri nas. O pojavih sumljivih znamenj je potrebno obvestiti UVHVVVR. V primeru najdbe se ukrepa v skladu z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1195 o uvedbi ukrepov za izkoreninjenje in preprečevanje širjenja <i>Synchytrium endobioticum</i> .

VIRUSI <ul style="list-style-type: none"> - virus Y krompirja (PVY) - virus M krompirja (PVM) - virus zvijanja listov krompirja (PLRV) 	<p>Opis bolezni:</p> <p>Virus Y krompirja na rastlinah povzroča različna znamenja bolezni. Znamenja primarne okužbe, do katere pride pri okužbi s pomočjo prenašalca so različna od znamenj sekundarne okužbe, ko rastlina zrasle iz okuženega gomolja.</p> <p>Znamenja primarne okužbe so sprva vidna le na listu, kjer je prišlo do okužbe, v nekaj dneh pa se razširijo po rastlini. Znamenja se kažejo kot težki mozaiki in nekoze, listni peciji so krhki, zato listi odpadajo, na koncu se celo stebla posušijo. Značilno je, da se v grmu posuši le steblo, na katerem je prišlo do okužbe. Znamenja sekundarne okužbe so navadno vidna na vseh steblih v grmu. Na listih so pogosto različno močni mozaiki, pojavlja se nagubanost listnih ploskev med žilami ter listnih robov. Če se pojavijo žilne nekoze na listih povezane tudi z močno zakrneno rastjo govorimo o črtavosti in kodravosti rastlin. Rastline običajno zaostajajo v rasti, so svetlejše in šibkejše.</p> <p>Podobne zanke močnih mozaikov na listih kaže ob sistemični okužbi tudi virus M krompirja. Črtavost in kodravost je lahko posledica hkratne okužbe s kombinacijo virusov A in X krompirja.</p> <p>Pri okužbi s PVY pridevalce najbolj prizadenejo znamenja na gomoljih občutljivih sort, saj ti zato niso primerni za prodajo. Nekrotični obroči se običajno pojavljajo pri izolatih tipa PVY_{NTN}. Lahko pa jih povzročajo tudi drugi izolati. Obroči se najprej pojavi v obliku vodenih izboklin na gomoljih, ki kasnejše potemnijo, nekrotizirajo, postanejo rijave in se nato ugreznejo.</p> <p>Pri okužbi s PLRV se znamenja primame okužbe se kažejo kot zvijanje listov navzgor in včasih vijolično obvarvanje bazalnega dela mladih listov na vrhu rastline. Pri sekundarni okužbi se zvijajo starejši spodnji listi, ki so na otip krhki, ob pritisku počijo, mlajši listi pa so bolj pokončni in bledi.</p> <p>Celoten izgled rastline je bolj pokončen, podoben stožcu ali majhni smrečici. Pogosto so okužene rastline tudi manjše.</p>	<p>Agrotehnični ukrepi:</p> <p>Zelo učinkovit ukrep je saditev na PVY popolnoma odpornih sort (vse novejše slovenske in nekatere tuge sorte).</p> <p>Osnovni varovalni ukrep pred širjenjem virusnih bolezni krompirja je sajenje neokuženih gomoljev.</p> <p>V integrirani pridelavi si ne želimo sajenja krompirja, ki ni bil potrijen kot semensko blago, saj so ti nasadi lahko vir okužbe za zdrave okoliške nasade. Zatiranje listnih uši je v nasadih, kjer smo za sajenje uporabili kakovosten krompir skoraj nepotrebno, razen, če ocenimo, da so v bližini močno okuženi drugi nasadi. Pri manjšem pojavu virusov lahko okužene grme čim prej izločimo. Zatiranje listnih uši je pomembno v semenskih nasadih, kjer okužene rastline obvezno izločimo.</p>										
	<p>Strune</p> <p>Opis škodljivca:</p> <p>Talni škodljivci navadno ne morejo neposredno ogroziti krompirjevih rastlin do takšne stopnje, da bi te popolnoma propadle. Ličinke hroščev pokalic (strune) se v teh razvijajo 2 do 3 leta in v višjih razvojnih stadijih v drugem in tretjem letu lahko povzročajo velike škode zaradi naluknanja</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>cipermetrin</th> <th>Columbo 0,8 MG</th> <th>24 kg/ha</th> <th>Zagotovljena s časom uporabe</th> <th>Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, uporaba sredstva ni dovoljena.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>teflutrin</td> <td>Force evo</td> <td>16 kg/ha</td> <td>Zagotovljena s časom in načinom uporabe</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	cipermetrin	Columbo 0,8 MG	24 kg/ha	Zagotovljena s časom uporabe	Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, uporaba sredstva ni dovoljena.	teflutrin	Force evo	16 kg/ha	Zagotovljena s časom in načinom uporabe	
cipermetrin	Columbo 0,8 MG	24 kg/ha	Zagotovljena s časom uporabe	Brez primerne opreme za inkorporacijo granul, uporaba sredstva ni dovoljena.								
teflutrin	Force evo	16 kg/ha	Zagotovljena s časom in načinom uporabe									

	gomoljev, ki postanejo netržni. A gotehnični ukrepi: Na dolgi rok z ustreznim kolobarjem (ustrezena pokritost tal preko celega leta) poskusimo preprečiti zaledanje jajčec pokalic v tla. Prag škodljivosti pri strunah za krompir znaša 2 do 3 strune na m ² . Če so strune v teh prisotne, je najbolje, da take njive ne izberemo za pridelovanje krompirja. Če druge njive nimamo na voljo, je smiselno zatihanje talnih škodljivcev z uporabo insekticidov ob saditvi.	<i>Beauveria bassiana</i> , sev ATCC 74040	Naturalis	3 l/ha	Ni potrebna	Ob sajenju se pred zagrinjanjem tretira tla in gomolje v odmerku 2 L/ha in 1 L/ha pred osijanjem.	
	Sovke Majski hrošč Opis škodljivca: Mlade sovke zvečer in ponoči objedajo liste kromprijja, pozneje odgriznijo cela steba, ki ovenejo. Pozneje se v celoti preselijo v zemljo, kjer tako sovke kot tudi majski hrošči lahko povzročajo znatne poškodbe na gomoljih, saj se vanje zavrtajo.	lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	Zagotovljena s časom uporabe	Ročni nanos sredstva ni dovoljen. Dovoljena je le uporaba traktorskih sejalnic oz. sadilnikov. Sredstvo se nanaša ob setvi oziroma saditvi neposredno v vrste.	
	Siva breskova uš <i>Myzus persicae</i>	Opis škodljivca: Usi najbolj množično naselijo krompir v začetku junija, ko se preselijo z zimskih gostiteljev.	pirimikarb flonikamid	Pirimor 50 WG Afinto Teppeki	0,5 kg/ ha 0,16 kg/ha	7 dni 70 dni	Upoštevati je potrebno varnostni

Zelena krompirjeva uš <i>Aulacorthum solani</i>	Pri pridelavi jedilnega krompirja je njihov pomen manjši, saj ne povzročijo pomembne nepoštene škode. Tehnika zatiranja: V posevkih jedilnega krompirja uši navadno zatremo s pripravki, ki jih uporabimo proti koladoraskemu hrošču. Ločeno zatiranje izvedemo le izjemoma, če ugotovimo, da smo posadili veliko z virusi okuženih gomojev ali če smo hrošča pričeli zatirati z zaviralci razvoja, ki ne delujejo na uši.	acetamiprid	Mospilan 20 SG	0,2 kg/ha	14 dni	pas do voda (navodila za uporabo)
Velika krompirjeva uš <i>Macrospiphum euphorbiae</i>		lambda-chalotrin Parafinsko olje	Karate zeon 5 CS Ovitex	0,15 l/ha 15 l/ha	7 dni Ni potrebna	

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA
 VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Koloradski hrošč <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	<p>Opis škodljivca: Do 10 mm veliki oranžni hroščki z značilnimi progami na izbočenem hrbitu lahko v kratkem času požrejo veliko listov. Koloradski hrošč ima pri nas dve, v vročih letih tudi tri generacije letno. Prezimijo hrošči v tleh. Hrošči prve generacije polagoma prilezejo iz zemlje od začetka maja do druge polovice maja. Odlaganje oranžnih jajčec na spodnjem stran listov v lega po 30 jajčec se prične v zadnjem tednu maja in lahko traja ves junij. Rdeče oranžne ličinke s črnimi pikami na boku se razvijejo 6 do 10 dneh. Ličinke so prav tako pozneš kot hrošči in lahko v kratkem času popolnoma uničijo grme krompirja. Prva generacija zaključi razvoj do začetka julija. V juliju se pojavljajo ličinke druge generacije. Sredi avgusta se lahko pojavijo tudi ličinke tretje generacije. Odvisno od števila generacij se hrošči druge ali tretje generacije nato potikajo po nasadih vse do konca septembra. Kljub temu, da se hrošč v Evropi pojavlja že več kot 50 let še nima veliko naravnih sovražnikov, ki bi zares uspešno omejili njegov razvoj. Po doseđanjih raziskavah so najpomembnejše pleniliske stenice (ličinke), nekatere polonice (jajčeca), hrošči brzci (ličinke) in entomofagne glive, ki okužijo bube in hrošče v tleh (npr. glive rodu <i>Beauveria</i> sp.).</p> <p>Agrotehnični ukrepi: - preprečevanje razvoja samosevcov - ustrezni kolobar - preprečevanje možnosti za hranjenje hroščev na ostankih gomoljev in krompirjevke - ko so nasadi še majhni, je možno zatiranje hrošča s sesanjem odraslih hroščev in ličink (uporaba specjalnih strojev). Pri večkratnem obhodu posesamo skoraj vse ličinke in tako opravimo najbolj biotično zatiranje.</p>	azadirahitin A acetamiprid olje navadne ogrščice + piretrin spinosal (spinosin A+spinosin D) klorantraniliprol metaflumizon ciantraniliprol piretrin	Neemazal T/S Azatin EC Mospilan 20 SG Raptol koncentrat Laser 240 SC Laser plus Coragen ** Voliam ** Alverde Benevia Asset five*	2,5 l/ha 1,5 l/ha 0,1 kg/ha 8 l/ha 0,2 l/ha 0,04 l/ha 0,06 l/ha 0,06 l/ha 0,25 l/ha 0,125 l/ha 0,38 L v 600 L vode na ha oziroma v 0,064 % koncentraciji	4 dni 3 dni 14 dni 3 dni 7 dni 14 dni 14 dni 14 dni 14 dni 14 dni 3 dni	Upoštevati je potrebno varnostni pas do voda (navodila za uporabo). ** Prepovedan na VVOI. * Dovoljenje za nojnje primere

Krompirjeve ogorčice Bela krompirjeva ogorčica (<i>Globodera pallida</i>)	Opis škodljivca: Obre vrsti lahko zajedata okoli 90 vrst: gospiteljskih rastlin rodu razhudnikov (<i>Solanum</i>), nevarni pa sta predvsem za pridelavo krompirja, paradiznika in rajčevcev.	Pri krompirjevih ogorčicah poseben nadzor vsako leto izvaja Fitosanitarna inšpekcijska. V primeru najdbe določa ukrepe Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/. Rumena krompirjeva ogorčica bila prvič ugotovljena leta 1999 na Koroškem ter pozneje še v Trenti in na Gorenjskem, na drugih območjih v Sloveniji pa je dosegla nismo ugotovili. Leta 2011 je bila v občini Ivančna Gorica prvič potrjena najdba bele krompirjeve ogorčice.
Rumena krompirjeva ogorčica (<i>G. rostochiensis</i>)	Opis škodljivca: Pri začetnem napadu se na posevku pojavijo otoki z rastlinami slabše rasti, včasih se pojavi tudi rumenjenje, venjenje in odmiranje listja. Na koreninah lahko v drugi polovici junija opazimo večje število majhnih bradavičastih izraslikov (zrele samice), ki imajo velikost bučkinih glavic in proti koncu junija odpadejo s korenin (ciste). Za ugotavljanje navzočnosti cist je potreben laboratorijski pregled vzorca zemlje. Izgube pridelka pri krompirju so lahko tudi do 80%.	Več podatkov ukrepnih in razmejitevah je objavljenih na spletni strani UVH/VVR Pri nas je proti ogorčicam na krompirju registriran pripravek Velum prime (0,625 L/ha).

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

Osnovni pristopi pri zatiranju plevelov v krompirju:

Krompir ima srednjo dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom. V začetku razvoja mu lahko zelo uspešno pomagamo z mehaničnimi ukrepi, ki jih ne izvajamo zgolj zaradi zatiranja plevelov. Težave se pojavijo, če so krompirla okužena z boleznimi, ki povzročijo hitro propadanje listne mase ali celotnih grmov. V takšnih razmerah se pleveli prebjego skozi pokrov krompirjevek in jo zasenčijo. K povečani tekmovalni sposobnosti krompirja prispeva sajenje nakaljenih gomoljev. Globino sajenja in obliko grebena moramo ob sajenju prilagoditi načinu mehaničnega zatiranja, da čim bolj prizademo plevele in čim manj krompir. Pri izvajaju mehaničnega zatiranja moramo paziti na ustrezeno vlažnost – suhost tal, da ne uničujemo strukture in da se poškodovani pleveli ne vrastejo ponovno.

Tehnika zatiranja plevelov v krompirju je odvisna od obdobja sajenja, tehnike sajenja, števila predvidenih osipavanj in dognojevanj, tipa tal, vremenskih razmer in razpoložljivega strojnega parka. Želimo si, da bi zatiranje temeljilo na večkratnem mehaničnem zatiranju. Grebeene vsaj enkrat prečešemo s česali preden prične krompir vznikati in pozneje še enkrat do dvakrat, preden doseže fazo zapiranja vrst. Število herbicidov primernih za integrirano pridelavo krompirja je omejeno in za nekatere, predvsem trajne pleveli, nimamo ustreznih kemičnih rešitev (npr. njivski slak). Trajne pleveli moramo zato zatrepu v drugih poljsčinah ali na sturmčiščih. Tudi v krompirju se skušamo v največji možni meri izogniti uporabi talnih herbicidov. Talnim herbicidom se popolnoma odpovemo pri zgodnjih sortah in na lahlkih tipih zemljišč z malo organske snovi.

Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepo setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.

Pri zelo zgodnjem krompirju, ki ga pridelujemo pod prekrivno tkanino takoj po saditvi in tik pred pokrivanjem uporabimo herbicid z dovolj kratko karenco. Spremljamo, ali je bil ta učinkovit, da ne pride do morebitnega zapeveljenja pod prekrivno tkanino (pleveli se razvijejo še hitreje kot krompir) in pred osipanjem nasad odgrnemo. V tem času (koncem aprila) običajno ni več nevarnosti zmrlzali, zato nasada krompirja ne pokrivamo več. Če se izjemoma pojavi nevarnost zmrlzali, nasad le začenšo pokrijemo. Predolgo pokrivanje v maj ob višjih temperaturah povzroči zakastiščev in zmanjšanje pridelka.

Pripravek Stomp aqua (pendimetalin) uporabljamo zgolj pred vznikom. Ker se ne izpira v globino lahko z njim čakamo, do trenutka, tik preden krompir prične vznikati. Med sajenjem in uporabo pripravka Stomp aqua lahko izvedemo eno osipavanje. Z osipavanjem delovanje talnih herbicidov skoraj popolnoma izničimo. Pripravek Stallion Sync Tec uporabljamo čimprej po sajenju krompirja, vendar napozneje 7 dni pred vznikom. Pripravek Senior SC 600 (metribuzin) lahko uporabimo po sajenju pred vznikom krompirja ali po vzniku krompirja. Če smo uporabili talne herbicide je po njih pogosto potrebna le korekcija z graminicidi proti travam. To korekcijsko zatiranje trav opravimo po zadnjem osipavanju, preden krompir zapre vrste (možnost uspešnih zadetkov majhnih plevelov).

Plevele lahko uspešno zatremo tudi brez uporabe talnih herbicidov. V takšnih primerih zatiranje temelji na pripravkih Basagran 480 in Tarot 25 WG. Lahko ju uporabimo skupaj po zadnjem osipavanju ali skupaj med prvim in drugim (zadnjim osipavanjem). Krompir ne sme biti prevelik, ker sicer herbicida lahko povzročita poškodbe.

INTEGRIRANO VARSTVO KROMPIRJA
VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NAČIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA/OPOMBE
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom krompirja in plevelov	klomazon	Angelus	0,25 l/ha	Čas uporabe
	pendimetalin	Ciomatate	0,25 l/ha	Čas uporabe	
		Stomp Aqua	2,9 l/ha	Čas uporabe	
		Sharpen 33 EC	3 – 5 l/ha	Čas uporabe	
		Sharpen plus	2,5 – 4 l/ha	Čas uporabe	
	pendimetalin + klomazon	Stallion sync tec	3 l/ha	Čas uporabe	
	metobromuron	Proman	3 l/ha	Čas uporabe	
	klomazon + metobromuron	Sinopia	3 l/ha	Čas uporabe	
	klomazon + metribuzin	Metric	1 – 1,5 l/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
	metribuzin	Sencor SC 600	0,15 – 0,75 l/ha ^a	42 dni ^a odvisno od časa uporabe Prepovedan na VVOI.	
		Buzzin	0,75 kg/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
	flufenacet + metribuzin	Plateen WG 41,5	2 – 2,5 Kg/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
	prosulfokarb	Boxer	5 l/ha	Čas uporabe	
	aklonifen	Challenge	4 l/ha	90 dni	
		Challenge 600	4 l/ha	90 dni	
		Chanon	3 l/ha	Čas uporabe	
		Focus ultra	1 – 4 l/ha	Čas uporabe	
	cikloksidim	Fusilade forte	0,8 – 1,3 l / ha	90 dni	
	fluazifop – p – butil	Fusilade max	1,6 l/ha	90 dni	
		Agil 100 EC	0,75 – 1,5 l / ha	30 dni	
	propakvizafop	Zetrola	0,75 – 1,5 l / ha	30 dni	
		Targa Super	1,2 – 2 l/ha	45 dni	
	kvilazafop- p-butil	Select super	1 – 2,5 l/ha	56 dni	
		Tarot 25 WG	40 – 50 g/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
	kletodim	Rincon 25 SG	60 g/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
		Rim 25 WG	60 g/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
		Rimuron 25 WG	20 – 50 g/ha ^a	Čas uporabe a v enkratnem odmerku ali deljenem; Prepovedan na VVOI.	
		Basagran 480	1,5 – 2 l/ha	Čas uporabe; Prepovedan na VVOI.	
Enoletni in večletni ozkolistni pleveli:	Po vzniku krompirja in plevelov:	bentazon			
Enoletni in večletni širokolistni in ozkolistni pleveli:	Po vzniku krompirja in plevelov:				
Enoletni in večletni širokolistni pleveli:	Po vzniku krompirja in plevelov:				

Enoletni, dvodelni in večletni ozkolistni in širokolistni plevel	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliku kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit extreme)	1,2-4 L/ha	Čas uporabe
	Pred spravilom – sušenje cime	pelargonska kislina	Beloukha	16 l/ha	Čas uporabe

12.4 INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRŠČICE

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Bella zrnata gniloba ogrščice <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Opis bolezni: Koreninski vrat in steblo po okužbi najprej potemnita. Sčasoma se pojavijo razpoke in posledično venjenje rastlin. Steblo in korenine preprede bei micerij poln črnih sklerocijev. Agrotehnični ukrepi: - ustrezno kolobarjenje - na vlažnih legah sejemo redkeje - če imamo v kolobarju tudi sončnice, ogrščice ne uporabljamo za podorino.		tebulkonazol	Folicur EW 250 Ortus 25 EW Buzz Ultra DF Bounty	0,5 l/ha 1 l/ha 0,33 kg/ha 0,6 l/ha	56 dni 56 dni 56 dni 63 dni	Uporaba 2x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni.
			tebulkonazol + azoksistrobin	Mirador forte Custodia Ortiva	1,5 – 2 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	56 dni Čas uporabe 21 dni	Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni.
			azoksistrobin	Tazer 250 SC Zafira AZT 250 SC Mirador 250 SC Chamane	1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	66 dni 21 dni 21 dni 21 dni	Uporaba le 1x v sezoni.
				Velostar Norios	1 l/ha 1 l/ha	21 dni 21 dni	
			mandestrobin	Sisam	0,8 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 1x v sezoni.
			fluopiram +protiokonazol	Propulse	1 l/ha	56 dni	Uporaba 2x v sezoni.
			protiokonazol	Praktis Era (staro ime Tartaros 300 EC)	0,7 l/ha 0,6 l/ha	56 dni	Uporaba 2x v sezoni.
				Tartaros	0,6 l/ha	Čas uporabe	
				Protendo 300 SC	0,6 l/ha	56 dni	
				Pecari 300 EC	0,6 l/ha	56 dni	
				Procer 300 EC	0,6 l/ha	Čas uporabe	
				Promino 300 EC	0,6 l/ha	Čas uporabe	
			mefentriflukonazol	Reyyona	2 l/ha	53 dni	Uporaba 2x v sezoni.
			prokloraz + tebulkonazol	Zamir- v uporabi do 30.6.2023	1,5 l/ha	56 dni	Uporaba 2x v sezoni.
			izofetamid	Zenby	0,8 l/ha	Čas uporabe	Uporaba le 1x v sezoni.
			boskalid	Royalty	0,5 kg/ha	1 dan oz. čas(način) uporabe	Uporaba le 1x v sezoni.
			<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha		Uporaba 2-3x v sezoni.
			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Serenade ASO	2 l/ha	Ni potrebna	Uporaba 2x v sezoni.
			<i>Trichoderma asperellum</i>	Xilon T34	10 kg/ha	zagotovljena s časom uporabe	Čas uporabe. Sredstvo se aplicira v vrste, 2-5 cm globoko.

				Sredstvo se aplicira neposredno za semenom v odprt severni kanal izključno s sejalno opremo, ki ima dodatno nameščene aplikatorje za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.		
Tehnika zatiranja:	Glavno obdobje okužb je med cvetenjem in krmalu po cvetenju. Za velik razmah bolezni je potrebno dleževno vreme od sredine aprila do sredine maja. Na lažjih tipih tal zatiranje ni potrebno, ker gliva tam na površju tal oblikuje le malo plodišč. V jesenskem času bele gnilobe na naših razmerah ne zatiramo. Zatiranje opravimo pred tik pred cvetenjem ali takoj po njem, če opazimo začetne pojave trohnjenja spodnjih delov stebel pri več kot 5% rastlin. Pozno dognojevanje z duščnimi gnojili in poškodbe od mraza čez zimo značilno povečajo stopnjo napada. Apnenje ogriščice v suhem vremenu tik pred začetkom rasti spomladi zmanjša napad, ker apno omesti razvoj apotečiških plodišč na površini tal. Bolezni je pogostejša, če v posevkah nimamo urejenih voznih stez in ob vožnji veliko rastlin povozimo ter kadar se pojavi pomajkanje kalcija in bora.					
Suha trohnoba steba ogriščice <i>Phoma lingam</i>	Opis bolezni: Suha trohnoba pri nas ni splošno razširjena. Na ogrščici se lahko pojavi na njivah, kjer izvajajo intenzivno in pogosto pridelovanje zelja. Na steblu se malo pred cvetenjem pojavi sive razpkane pegan obdane z vijolčnim robom (okužbe že jeseni). Razpoke se poglobijo v trohnečo volino v kateri je belkasto siv micelij. Na stenah trohnečih votlin se z notranje in zunanje strani razvijejo drobna črna plodišča. Agrotehnični ukrepi so enaki kot pri beli gnilobi. Velik pomen ima kvalitetno začevanje ostankov stebel.	tebukonazol	Folicur EW 250 Orius 25 EW Tebusha 25% EW Mirador forte	0,5- 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1,5-2 l/ha	56 dni 56 dni 60 dni 56 dni	Uporaba 2x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni.
difenokonazol		Plexeo	1,2 l/ha	56 dni	Uporaba 2x v sezoni.	
azoksistrobin + tebukonazol		Caramba Sirena	1,2 l/ha 1,2 l/ha	56 dni 56 dni		
mefentriflukonazol		Score 250 EC	0,5 l/ha	3 dni	Uporaba 2x v sezoni.	
protiokonazol + fluopiram		Mavita 250 EC Zaffra AZT 250 SC Mirador 250 SC Ortiva Propulse	0,5 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	3 dni 21 dni 21 dni 21 dni 56 dni	Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni. Uporaba le 1x v sezoni.	
protiokonazol		Reyyona Era (staro ime Tartaros 300 EC)	1,5 l/ha 0,6 l/ha	53 dni	Uporaba 2x v sezoni.	
prokloraz + tebukonazol		Tartaros Protendo 300 EC* Pecari 300 EC Procer 300 EC Promino 300 EC Zamir- v uporabi do 30.6.2023	0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha 0,6 l/ha 1,5 l/ha	Čas uporabe 56 dni 56 dni Čas uporabe Čas uporabe 56 dni	Čas uporabe Uporaba 2x v sezoni. Uporaba 2x v sezoni. Uporaba 2x v sezoni.	

	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas (način uporabe	Uporaba 2x v sezoni.
Tehnika zatiranja: Osnovna oblika zatiranja bolezni je uporaba razkuženega semena. Če se bolezen pojavi v večjem obsegu moramo pridelovati križnic začasno ustaviti. Fungicidi, ki jih uporabimo proti beli zmati gnilobi imajo stranski učinek tudi na to bolezen. K zmanjšanju pojava bolezni prispeva poznejsa setev sort, ki so bolj robustne in odporne na zimsko poleganje in mraz. Zatiranje repičnega bolhača tudi vpliva k zmanjšani stopnji napada. V deževnih jesensih in ob zgodnjih dobro opaznih znakih uporabimo pripravke na podlagi tebukonazola. Največja potreba po varovanju se pojavi v semenskih posevkah, če imamo v kolobarju še veliko drugih križnic.					

INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRIŠČICE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE (vrsta bolezni)
Alternarijska črnoba, pegavost in gniloba ogrščice <i>Alternaria brassicae</i> spp.	Opis bolezni: Po cvetenju se na vseh nadzemnih organih razvijejo drobne črne pege. Ko se posušijo so na njih vidni koncentrični krogi in žametna prevleka trosov. Najnevarnejši je napad na luskih. Del zrn pod pegami zakrni, luski pričnejo predčasno pokati in zrna padajo na tla pred žetvijo.	fluopiram +protiokonazol boskalid	Propulse Royalty	1 l/ha 0,5 kg/ha	56 dni 3 dni	Čas uporabe	Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
		difenokonazol tebukonazol	Score 250 EC Mavita 250 EC Folicur EW 250	0,5 l/ha 0,5 l/ha 0,5 l/ha			Uporaba le 1x v sezoni. (alternarija)
		Orius 25 EW		1 l/ha	56 dni		Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
Siva plesen <i>Botritis cinerea</i>	Agrotehnični ukrepi: - hitro zaoravanje ostankov - preprečevanje razvoja samosevcov	azoksistrobin + tebukonazol	Mirador forte	1,5-2 l/ha	56 dni		Uporaba 2x v sezoni. (alternarija, siva plesen)
		azoksistrobin	Ortiva Tazer 250 SC Zafta AZT 250 SC Mirador 250 SC Chamane Velostar Norios	1 l/ha	21 dni 66 dni 21 dni 21 dni 21 dni 21 dni 21 dni		Uporaba le 1x v sezoni. (alternarija)
			Protendo 300 SC Pecati 300 EC Revyna	0,6 l/ha 0,6 l/ha 1,5 l/ha	56 dni 56 dni 53 dni		Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
		mefentrifukonazol	Zamir- v uporabi do 30.6.2023	1,5 l/ha	56 dni		Uporaba 2x v sezoni. (alternarija)
		prokloraz + tebukonazol	<i>Pythium oligandrum</i>	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas (način) uporabe		Uporaba 2x v sezoni. (alternarija, siva plesen)
			Tehnika zatiranja: Alternarijsko črnobo zatiramo hkrati z zatiranjem bele zrnate gnilobe. Primerno je škropiti tik po cvetenju, ker tako bolje obvarujemo luske, ki so najbolj pomembna točka varovanja. Gliva je izredno močno razširjena in je stalno prisotna. Težave z močnimi pojavi so v letih, ko imamo zelo deževen in topel začetek polejja. Hkrati z črnobo se v takšnih letih pojavi tudi siva plesen. Ta pri gostem sklopu napade steba, množično pa tudi luske, ki so bili poškodovani od škodljivcev.				

<p>Goščavost kapusnic <i>Plasmiodiophora brassicae</i></p> <p>Opis bolezni: Gliva napada vse križnice in se v posevkih ogrščice vedno pojavlja. Njen pojav je najbolj odvisen od kolobarja in od pedoloških lastnosti tal. Na pritličnem delu steba in na koreninah se naredijo oddebeljene bulaste golše, ki začnejo trohneti. Rastline ovenijo in poležejo.</p>	<p>Tehnika zatiranja: Goščavosti v ogrščici s kemičnimi metodami ne moremo zatirati. Na kisilih tleh skušamo popraviti prenizko reakcijo tal z apnenjem, ki ga delno izvedemo pred setvijo, deino pa spomladji pred začetkom rasti. Mnogo ostabljenih rastline ne propade popolnoma, zato okužbe nekaj odsotkov rastlin navadno ne vplivajo znatno na pridelek. Če pogosto pridelujemo druge križnice in se pojavijo težave zaradi povečanih okužb se moramo odločiti, katero križnico bomo vsaj za 4 do 5 let izločili iz kolobarja.</p>	
<p>Plesen križnic Ogrščica plesen <i>Peronospora parasitica</i> <i>Peronospora brassicae</i></p>	<p>Opis bolezni: Na listih mladih rastlinic kmalu po vzniku se naredijo oglate rumene pege omjejene z listnimi žilami. Na spodnji strani peg je bilo siva preyleka trsonocev. Preyleka iz trsonocev se razvije tudi na steblih in na luskah, na robu nekrotičnih razvodenih peg. V ugodnih pogojih lahko pregnijejo steba in rastline poležejo.</p>	<p>Tehnika zatiranja: V naših razmerah se plesen redno pojavi na posameznih rastlinah v jeseni in spomladji. Močni napadi so redki, zato zatiranje ni potrebno. Pri zgodnjih, preveč gostih setvah se gliva pojavi, če pada v septembru veliko dežja in so posevki ogrščice v neposredni bližini večjih njiv z zeljem. Napadeni listi odmrejo že jeseni nato pa se razvoj gliv s prihodom mraza ustavi. V nekaterih letih je plesen nevarna v preostalih semenskih posevkah, ker napade tudi luske. Velika nevarnost okužja po cvetenju obstaja, če je v posevku veliko divje redkve in gorušice, ki sta pomembni vir kužila. Pripravkov za kemično zatiranje te plesni pri nas nimamo.</p>
<p>Peperlasta plesen križnic <i>Erysiphhe communis</i> <i>Erysiphhe cruciferarum</i></p>	<p>Opis bolezni: Na listju se pojavijo svikaste pege nepravilnega oblik. Pege sestavlja površinski micelij, ki ga lahko obrisemo s prsti. Tkivo pod pegami na mladih listih počni in se prične sušiti. Večji pojav na luskah je redek.</p>	<p>Tehnika zatiranja: Zatiranje peperlaste plesni v naših razmerah ni potrebno. Kljub temu, da se jeseni redno pojavlja se spomladji v ustrezno gostih posevkah ne razvije v velikem obsegu. Če za zatiranje drugih bolezni uporabimo pripravke na podlagi tebulkonazota, lahko plesen uspešno kemično zatremo.</p>
<p>Bela rja križnic <i>Albugo candida</i></p>	<p>Opis bolezni: Na listju se pojavijo beli koncentrični kupčki prekriti z listno povrhnjico. Rastline napadene že jeseni, v času cvetenja oblikujejo zakrnela socvetija prerasti z belim micelijem.</p>	<p>Tehnika zatiranja: Te bolezni v naših razmerah ni potrebno zatirati. Delno lahko prizadene posevke gorušice in redkve.</p>
<p>Ciliadsporioza <i>Cylindrosporium concentricum</i></p> <p>Siva pegavost stebel <i>Pseudocercosporella capsellae</i></p> <p>Oglata pegavost križnic</p>	<p>Opis bolezni: Omenjene bolezni se v našem okolju ne pojavljajo v zaznavnem obsegu. Takšna ocena velja zaradi majhnega proučevanja bolezni ogrščice in zaradi precejšne podobnosti začetnih znakov okužb z znaki pri okužbi od peronospore in peronospore in peronospore.</p> <p>Opis bolezni: Bolezni, posebej pri pridelovanju ogrščice za seme. Sedanje strukturne spremembe v kolobarju bodo morda povzročile nekoliko povečan obseg pridelave ogrščice, kar bo povečalo možnosti za pojavljanje teh gliv.</p>	<p>Bolezni, posebej pri pridelovanju ogrščice za seme. Sedanje strukturne spremembe v kolobarju bodo morda povzročile nekoliko povečan obseg pridelave ogrščice, kar bo povečalo možnosti za pojavljanje teh gliv.</p> <p>Ciliadsporioza je bolezen severnejših območij, kjer v kolobarju pogosteje sejejo križnice. Na listju se pojavijo izrazito koncentrične bele pge iz belih kupčkov – trošišč. Listje napadenih rastlin je deformirano. Napad na steblih povzroči pokanje stebel. Napadene rastline razvijejo manj vitalno socvetje. Pri sivi pegavosti stebel so poleg ovalnih sivovrjavih peg, obdanih s temnim obročem, ki se razvijejo na listju, najznačilnejši znak podolgovate vijolične pge, ki hitro posivijo. Znaki močnega napada od sive pegavosti na steblih se zelo podobni znakom napada glive <i>Phoma lingam</i>. Po okužbi z glivo <i>M. Brassicaceae</i> se na listih razvijejo oglate pge, ki so najprej vijolične, nato posivijo in na kocu postanejo pergammentasto prizorne. Na pergammentastem</p>

<i>Micosphaerella brassicae</i>	<p>tkivu se razvijejo črna spermagonijska plodišča. Primarno je oglata peggost pomembna za zelja, ker pa se ogrščica pojavlja veliko bolj pogosto, predstavlja pomemben vir latentnega kužila za zelje.</p>
---------------------------------	---

INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRIŠČICE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Repični bolhač <i>Psylliodes chrysoccephala</i>	Opis škodljivca: Modro črni hroščki z oddebeljenimi stegni zadnjih nog so nevarni dokler so vznikajoče rastlinice v stadiju kljičnih listov, pozneje njihove poškodbe ne morejo več bistveno ogroziti razvoja rastlin. Nevarnejše so ličinke, ki se jeseni zavrtajo v stebla in jih čez zimo močno oslabijo. Zaradi poškodb od ličink napadene rastline slabše prezimijo, spomladti počasnejše rastejo ali pa celo popolnoma propadejo čez zimo. Ličinke dosežejo 8 mm dolžine. So sivo belkaste. Imajo temne pike iz katerih izraščajo drobne ščetine.	tau-fluvalinat deltametrin lambda-cihalotrin cipermetrin	Mavrik 240 Evure Decis 100 EC Decis 2,5 EC Karate zeon 5 CS	0,2 l/ha 0,2 l/ha 63 ml/ha 0,3 l/ha 0,15 l/ha	60 dni 60 dni 45 dni 45 dni 28 dni		
Tehnika zatiranja: Kljub temu, da so populacije repičnega bolhača pogosto velike, zatiranje ni vedno smiselno. Če ogrščico posejemo v ustrezarem terminu (dovolj zgodaj) in se rastline hitro razvijajo, hrošči z objedanjem ne morejo povzročiti toliko poškodb, da bi rastline zaradi tega propadle. Prag za zatiranje hroščev v stadiju kljičnih listov je presežen, če opazimo več kot 50% rastlin z več kot dvema izjedama na kljičnih listih. Nekoliko poznejše zatiranje hroščev je smiselno v topilini jesenih. Zatiranje bolhača skušamo združiti z zatiranjem repne grizlice. Z nekoliko poznejšim zatiranjem združimo zatiranje bolhača in gosenic sovk. Če zatreмо hrošče preprečimo odlaganje jačec in razvoj ličink, ki jih v oktobru veliko težje zatremo, kot hrošče.			Columbo 0,8 MG	12 kg/ha	Čas uporabe		
Repičar <i>Meligethes aeneus</i>	Opis škodljivca: Do 3 mm veliki črni ovalni hroščki z kovinsko modrim leskom se hranijo s cvetnim prahom ogrščice. Ker se na posevkah pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo smo na način, da raztrgajo cvetove. Bolj zgodaj, kot se pojavijo in bolj dolgo, kot traja razcvetanje ogrščice, večja je škoda. Ko se cvetovi odprejo, hrošči niso več škodljivi. Škoda povzročena od ličink, ki se prav tako hranijo z cvetnim prahom, je manjšega pomena.	lambda-cihalotrin deltametrin	Karate Zeon 5 CS Decis 2,5 EC Decis 100 EC Poleci Delux 050 CS Mavrik 240 Evure	0,15 l/ha 0,3 l/ha 0,075 l/ha 0,3 l/ha 0,1 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha	28 dni 45 dni 45 dni 56 dni 60 dni 60 dni		
	Insekticide uporabimo, ko so preseženi pragovi škodljivosti in ob napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Pri piretroidih upoštevamo pH škropilne brozge, ki naj okoli 6,5. Priporočamo, da poškropite v večerno nočnem času.						
	Agrotehnični ukrepi:	- vsi ukrepi, ki pospešujejo cveterje prispevajo k zmanjšanemu napadu škodljivca - izbira sort, ki zgodaj cvetijo.					

	<p>Tehnika zatiranja: Potrebo po zatiranju ugotovimo na podlagi pregleda velikosti populacije hroščev in na podlagi ocene dinamike odpiranja cvetov. Zatiranje izvedemo najpozneje tik pred začetkom cvetenja. Velikost populacije hroščev ugotovimo z ulovom v rumene posode napolnjene z vodo ali pa s štejem števila hroščev na posameznih vejah socvetja. Zatiranje ima stranski učinek na kljunotaj. Prag škodljivosti je presežen, kadar imamo povprečno na posameznih rastlinah 1-2 hrošča v času razpiranja brstov (brsti zavarovan z lističi), ali kadar imamo 2 – 3 hrošče na rastlino v času nabreklih cvetnih brstov ali 4 – 6 hroščev na rastlino v času nekaj dni pred razcvetanjem prvih cvetov. V času cvetenja postane repičar opraševalce. V času cvetenja ne uporabljamo insekticidov zaradi varovanja čebel.</p>
Kapusovi bolhači <i>Phylloreta sp.</i>	<p>Opis škodljivca: V fazi kličnih listov ogrščico napade veliko vrst kapusovih bolhačev. Nevarni so v sušnih poletjih in dokler rastline ne oblikujejo treh listov.</p>

INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRIŠČICE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Repični klijunataj <i>Ceutorhynchus napi</i>	Opis škodljivca: Samnice v času pred začetkom hitre rasti in razvoja socvetja odložijo jajčeca v vrhnje dele centralnega steba in zasnove stranskih vej. Lišnike se razvijejo v notranjosti steba. Stelo oslabi, se deformira in izgubi mehanično trdnost. Luski vezani na prizadeti del steba se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo. Agrotehnični ukrepi: - dobra oskrba, ki pospeši razvoj rastlin.		lambda-čihalotrin tau-fluvalimat deltametrin	Karate Zeon 5 CS Mavrik 240 Evure Decis 2,5 EC	0,15 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha	28 dni 60 dni 60 dni 45 dni	
	Tehnika zatiranja: Če se pojavijo velike populacije repičnega klijunotaja opraviti ločeno od zatiranja repičanja, sicer pa ne. V nekaterih letih je združeno zatiranje možno, v nekaterih pa ne. V času pred začetkom bujne rasti socvetja znaša kritično število povprečno dva vboda na posamezno rastlino ali 2 – 4 hroščki na 10 rastlin. Če hrošče lovimo z rumenimi posodami je prag zatiranja 5 hroščev/posodo na 3 dni.						
Semenski kapusov klijunataj <i>Ceutorhynchus assimilis</i>	Opis škodljivca: Samnice redkvinega klijunotaja odlagajo jajčeca v nedozorele luske. Ličinke se hrano z nedozorelimi semeni. V bodnina mesta od redkvinega klijunotaja izkoristi samica kapusove luskove hržice, ki prav tako odlaga svoja jajčeca v luske. V začetku cvetenja se na socvetjih razvijejo velike kolonije sivkastih usi obdanih z belim voščenim popphrom.		lambda-čihalotrin tau-fluvalimat deltametrin	Karate Zeon 5 CS Mavrik 240 - A Evure - A Decis 2,5 EC	0,15 l/ha 0,2 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha	28 dni 60 dni 60 dni 45 dni	A - registriran samo za zatiranje luskove hržice
Luskova hržica <i>Dasinera brassicae</i>							
Mokasta kapusova uš <i>Brevicorine brassicae</i>							
Brazdasti klijunataj <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i>	Opis škodljivca: Poletna rasa brazdastega klijunotaja prezimi v obliku ličinka, ki živijo v golšastih tvorbah na pritehnhem delu steba ogriščice. Goše so podobne tistim, kijih povzroča gliva iz rodu <i>Plasmiodiphora</i> . Zaradi golš rastline oslabijo in pomiznejo. Stebelni klijunataj povzroča spomladi pred cvetenjem poškodbe podobne, kot jih povzroča repični klijunataj, le da so deformacije stebelčnic manj očitne. Stebla se sušijo in lomijo.						
Stebelni klijunataj <i>Ceutorhynchus quadridens</i>							

Repna grizlica <i>Athalia rosae</i>	Opis škodljivca: 15 mm dolge črne pogosenice z belo sivo črto na boku in 8 pari zadkovih nog objedajo listje ogrščice vse od vznika do konca oktobra. Nevareme so v obdobju dokler ogrščica ne oblikuje 4 dobro razvite liste. Grizlica ima dve generaciji letno, pojav druge generacije, ki dela škodo na ogrščici, je odvisen od možnosti za razvoj prve generacije, ki dela škodo na številnih drugih križnicah.	Sredstva na osnovi: lambda-chalotrin (Karate Zeon 5 CS) in deltametrin (Decis 2,5 EC) v skladu z navodilom za uporabo. Tehnika zatiranja: Potreba po zatiranju je odvisna predvsem od skladnosti razvoja ogrščice in pojava pagosenic. Ob zgodnjem pojavu, ko ima ogrščica prva dva lista znaša prag 20 pagosenic na m ² , pozneje, ko ima ogrščica 4 dobro razvite liste znaša prag 1 pagosenica na rastlino. Če so v bližini posevkov ogrščice neobdelana strnišča na katerih raste veliko samosevcev ali divjih križnic (npr. fotočarke), lahko pričakujemo selitev pagosenic z njih na posevki ogrščice. Možno je tudi prehajanje s posevkov strniščne repe. Hkrati z zatiranjem grizlice opravimo zatiranje gosenic belinov (rumeno zelene gosenice).
Belini <i>Pieris brassicae</i> <i>Pieris rapae</i> <i>Pieris napi</i>		

INTEGRIRANO VARSTVO OLJNE OGRIŠČICE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NACIN UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE
Tehnika zatiranja plevelov v ozimni oljni ogrščici:					
					Vogrščici imamo dva obdobja zatiranja plevelov, jesensko in zgodnje spomladansko. V našem okolju prevladuje sistem zatiranja plevelov jeseni. Pogoji za prezimovanje ogrščice so pri nas dobrji, zato se spomladi v gostih posevkah pleveli ne morejo uspešno razvijati in vznikati. V primeru slabe prezimive imamo težave z okopavinskim pleveli. Plevelna flora ogrščičnih posevkov se ujema s floro ozimnih žit in tudi najpomembnejši pleveli so enaki kot v žitih (lakota, kamilice, slak, grašice, ...), izjema so diye kržnice, ki jih s herbicidi primerimi za uporabo v ogrščici ne zatrema. Ker sejemo ogrščico zgodaj lahko jesensko zimski pleveli povzročijo zatoj razvoja ogrščice že v jesenskem obdobju. Njivo za setev lahko pripravimo zgodaj in ne sejemo takoj, temveč jo pustimo, da pleveli vzniknejo in jih nato prebranamo (slepa setev). Tako izvedemo mehanično zatiranje plevelov. Na njivah z majhnim potencialom plevelov uporabljamo herbicidov splošni na potrebnata v optimalnih pogojih in jeseni nastopi zgodnji mraz. Tudi pri ogrščici je možno plevele zatirati mehanično po vzniku z uporabo česal. Setev mora biti opravljenam v vrsti. Pri nas izkušenj se temi postopki še nimamo. Z uporabo česal delno zatiramo tudi nekatere klijunotaje in gosenice škodljivih metuljev.
					Če se odločimo za zatiranje z uporabo napropamida, ju moramo pred setvijo plitvo vdelati (inkorporirati) v tla. Postopek inkorporacije izrabimo za mehanično zatiranje plevelov, kot je omenjeno zgoraj. Hkrati z inkorporacijo prispevamo k zatiranju tainih škodljivcev in tudi polzvev, ki radi napadejo vznikajoče posevke (npr. <i>Arion lusitanicus</i>). Aplikacijo izvedemo na ustrezno vlažna tla. Pri obeh pripravkih moramo upoštevati, da imata luknje v spektru delovanja in, da ne delujejo ustrezeno na samosevno pšenico in ječmen. Samosevci se v septembtru zelo hitro razvijajo in lahko močno zavrejo razvoj ogrščice. Po vzniku jih hkrati z drugimi nevarnimi travami (srakoperce, stoklase, pŕinica, ...) zatremo z graminicidi.
					Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrsti.
Sirokolistni in ozkolistni pleveli pred vznikom plevelov in ogrščice (možna uporaba tudi po vzniku ogrščice).					
					Pripravka Fuego in Butisan 400 SC se lahko uporablja samo po vzniku.
					Pripravek Lontrel se uporablja izključno po vzniku.
					Pripravek Beikar se uporablja po vzniku plevela in ogrščice (širokolistni pleveli).
					Cleranda in Cleravo se uporabljata v hibridih oljne ogrščice označene kot CLEARFIELD®
					Primeri uporabe herbicidov:
					Devrinol 45 FL
					Colzamid
					Teridox 500 EC
					Successor 600
					Lontrel 100 – v uporabi do 30.4.2023
					Lontrel 72 SG
					Clap (ozimna oljna ogrščica)
					Clap forte

	Major 300 SL	0,3 – 0,4 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na WOI. Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake tri leta.
klomazon	Centium 36 CS	0,25 l/ha	Čas uporabe.
	Cломате	0,33 l/ha	
	Цзар	0,25 l/ha	
	Ангелус	0,33 l/ha	
kvinmerak+imazamoks	Cleravo (v hibridih ojne ogrščice označene kot CLEARFIELD®)	1 l/ha	Čas uporabe.
halauksifen-metil+pikloram	Belkar	0,25-0,5 l/ha	Čas uporabe
halauksifen-metil+klopipralid	Korvetto – v uporabi do 31.3.2023	1 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na WOI.
fluazifop-p-butil		Fusilade forte	0,8 – 1,3 l / ha
		Fusilade max	1,6 l/ha
		Frequent	2 – 3 l/ha
propakvizafop	Agil 100 EC	0,75 – 1,5 l / ha	90 dni
cikloksidim	Zetrola	0,75 – 1,5 l / ha	90 dni
kvizalafo-p-etyl	Focus ultra	1 – 4 l / ha	Čas uporabe
	Quick 5 EC	1 – 2 l/ha	Čas uporabe
	Targa super	1,2 – 2,5 l/ha	90 dni
	Wish top	0,625 – 1,17 l/ha	90 dni
kletodim	Digator	0,6 – 1,0 l/ha	75 dni oz. čas uporabe
	Select super	1 l/ha	120 dni
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni pleveli.	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 - 4 l/ha	Čas oz. način uporabe
Pred ali po setvi, pred vznikom posevka.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli		

12.5 INTEGRIRANO VARSTVO KRMNE PESE

VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

SPOŠEN PRISTOP K VARSTVU KRMNE PESE PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Ker pri nas krmno peso sejemo večinoma le kot strniščni dosevek se tehnologija pridelovanja precej razlikuje od pridelovanja sladkorne pese. Pomem posameznih bolezni in škodljivcev je pri obeh vrstah pes različen. Od bolezni je pri krmni pesi običajno potrebno enkrat zatirati pesno listno pegasost, od škodljivcev pa predvsem uši, bolhača in morda gosenice sovk. V/ečna škodljivca sladkorne pese je pri krmni manj pomembna, ker imamo povsem drugačen termin zasnove posevka. Tehnološka navodila za pridelavo krmne pese so poenostavljena v primerjavi s sladkorno peso.

Insektilidi, ki se smejo uporabljati v krmni pesi so: lambda-cihalotrin (**Karate Zeon 5 CS** – za zatiranje listnih uši, bolhačev in drugih grizočih in sesajočih žuželk), in primikarb (**Pirimor 50 WG** – za zatiranje listnih uši). Za vlažno razkuževanje semena in s tem za zmanjševanje populacije strun krmne pese se lahko uporablja Force 20 CS. Sem se sme tretrirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Semse smejo tretrirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadrnic«.

Trenutno so za uporabo v krmni pesi registrirani naslednji fungicidi: **Ortiva, Mirador 250 SC, Zaftra AZT 250 SC** (azoksistrobin; zatiranje pepelovk, zmanjševanje okužb glivičnih listnih pegasosti in listne pegasosti), **Score 250 EC, Mavita 250 EC** (difenoconazol; zatiranje pesne listne pegasosti, pesne pepelovke in pesne rje), **Vertipin** (žvezpol; zmanjševanje okužb pesne pepelaste plesni).

INTEGRIRANO VARSTVO PRED PLEVELI:

Varstvo pred pleveli v krmni pesi temelji na kombiniraju in mehaničnih in kemičnih plevelov omajene.

Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.

Registrirani herbicidi, ki jih lahko uporabljamo v krmni pesi:

AKTIVNA SNOV:	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	Dovoljena skupna količina herbicida na ha ali maksimalen enkraten odmerek:	KARENCA (dni)	OPOMBE
metamitron	Goltix WG 90	1,3 kg/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.
klopirlid	Betrix flo	1-2 l/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.
	Metafol WG	1-2 kg/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.
	Finex 700 SC	1,65 l/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.
	Lontrel 100 - poraba zalog 30.4.2023	1-1,2 l / ha	42 dni	Prepovedan na VVOI.
	Lontrel 72SG	0,17 kg/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.
Graminicidi, ki jih uporabljamo po vzniku plevelov	Clap	0,4 l/ha	80 dni	Prepovedan na VVOI.
propakvizafop	Agil 100 EC	0,75-1,5 l/ha	60	
cikloksidim	Zetrola	0,75-1,5 l/ha	60	
fluazifop – p- butil	Focus ultra	1 - 4 l/ha	56	
Glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliku kalijeve soli	Fusilade forte	0,8 – 2,5 l/ha	56	
	Fusilade max	1-3 l/ha	56	
	Clinic xtreme (staro ime Credit extreme)	1,2 – 4,0 l/ha	Čas oz. način uporabe	Pred vznikom posevka

KLETOĐIN kvizalofop-p-etyl	Select super	1 – 2,5 /ha	56	Manjša uporaba			
	Wish top	0,6 – 1,1 /ha	90				
INTEGRIRANO VARNSTVO KRMNE PESI Wol- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!							
ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA (dni)	OPOMBE
Pesni bolhač <i>Chaetocnema tibialis</i>	Opis škodljivca: 1,5–2 mm veliki hroščki na kličnih in pravih listih izjedajajo zgornjo povrhnjico in del mezenhima, rezultat so značilne luknjice premera 1–2 mm. Najbolj so ogroženi posevki od vznika do štirih pravih listov. Več o škodljivcu si lahko preberete na: Pesni bolhač	Agrotehnični ukrepi: Posevke pese, repe in drugih gospoditeljskih rastlin zasnujemo čim dalej od starih, lanskoletnih posevkov. Zgodnjemu napadu škodljivca se lahko izognemo z zgodnejšo setvijo in izbiro zgodnjih sort, ki hitro razvijejo dovolj listne mase. Z izvajanjem ustreznih agrotehničnih ukrepov skrbimo za hiter mladostni razvoj rastlinic, da čim prej preidejo kritično fazo od kotiledona do razvoja prvih štirih pravih listov.	Lambda – cihalotrin	Karate Zeon CS	0,15 l/ha	15	
Kapusova sovka <i>Mamestra brasica</i>	Opis škodljivca: Gosenice listnih sovk so zelene do rjave barve. Pojavljajo se v juniju, juliju in od sredine avgusta do jeseni. Gosenice izjedajo pesno listje, listne pecle in glavo korenov. Za zaširanje gosenic listnih sovk so registrirani nekatere insekticidi, ki pa jih je potrebno uporabiti čimprej ob pojavu mladih gosenic, saj narjne najbolje učinkujejo v začetnih stopnjah razvoja.	Agrotehnični ukrepi: Gosenice imajo raje posevke z bujnim listjem kjer se dalj časa zadružuje vlaga, zato pretirano gnjetenje posevkov z N ni dopustino.	Lambda – cihalotrin	Karate Zeon CS	0,15 l/ha	15	
Zelenjadna sovka <i>Mamestra olaracea</i>							
Glagolka <i>Autographa gamma</i>							
Pesna muha <i>Pegomya hyoscyami</i>	Opis škodljivca: Pesna muha odlauga jajčeca na spodnjem stran listov. Rumene žerke vrtajo rove v listju, kasneje pa se epiderma mehurjasto napihne. Prezimi v stadiju bube v tleh, letno pa ima 2 do 3 generacije. Za kmnno peso je predvsem nevarna prva generacija na mladih rastlinah pese (4 do 8 listov). Napada tudi sladkorno peso in špinaco.	Agrotehnični ukrepi: upoštevanje širokega kolobarja.	Lambda – cihalotrin	Karate Zeon CS	0,15 l/ha	15	

	- škodljivost zmanjšamo z zgodnjo setvijo.				
Črna fižolova uš <i>Aphis fabae</i>	Opis škodljivca: Obe uši povzročata direktno škodo s sesanjem in indirektno ker prenašata virus, predvsem virus pesne rumenice. Kritično število: črno fižolova uš zatiramo, ko opazimo redke uši na 30 % rastlin, sivo breskovo pa, če najdemo 3 uši na 10 rastlin. Uporaba insekticidov: pri začetnem napadu je mogoče uspešno zatreći uši že s škropiljenjem robov, ko se razširijo upoštevamo kritično število.	lambda – cihalotrin	Karate Zeon	0,15 l/ha	15
Siva breskova uš <i>Myzus persicae</i>		pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,5 kg/ha	7

12.6 INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK A	KARENCA	OPOMBE
Ožig pesnih kalčkov (<i>Phytium</i> sp.)	Opis bolezni: Ožig pesnih kalčkov se pojavlja v fazi kultive, vznika in po vzniku pese. Če se bolezen pojavi po vzniku, se koreninica stanjša in počnri. Povzročajo ga talne glive. Ožig pesnih kalčkov je lahko tudi posledica neugodnih razmer za vznik in razvoj posevka, kot so npr.: <ul style="list-style-type: none"> - zbitna vlažna tla, - zaskorjenost tal, - pregloboka setev, - uporaba prevelike količine gnojil in fitofarmacevtskih sredstev spomladji ali ostanki herbicidov, uporabljeni v predposevku. Opis bolezni: Je najpogostejsa in najbolj nevarna bolezen sladkorne pese pri nas. Znamenja najprej opazimo kot drobne posamične sive okrogle 2-3 mm pege z rdeče-rjavim robom, ki se najprej pojavijo na starem listju. S širjenjem bolezni se pege spašajo in ko bolezen zajame 2/3 lista, se le ta posuši. Najbolj občutljive sorte pese lahko v najbolj ugodnih razmerah za razvoj bolezni ostanejo popolnoma brez listja. Na razvoj bolezni ugodno vplivata vlaga in toplota. Prve okužbe nastanejo pri več dnevnih temperaturah med 25 in 27°C in		Agrotehnični ukrep: - izvajanjem vseh ukrepov, ki pospešijo rast in razvoj mladih rastlinic, - redno okopavanje pese.				
Cerkospora ali pesna listna pegavost (<i>Cercospora beticola</i>)	Opis bolezni: Je najpogostejsa in najbolj nevarna bolezen sladkorne pese pri nas. Znamenja najprej opazimo kot drobne posamične sive okrogle 2-3 mm pege z rdeče-rjavim robom, ki se najprej pojavijo na starem listju. S širjenjem bolezni se pege spašajo in ko bolezen zajame 2/3 lista, se le ta posuši. Najbolj občutljive sorte pese lahko v najbolj ugodnih razmerah za razvoj bolezni ostanejo popolnoma brez listja. Na razvoj bolezni ugodno vplivata vlaga in toplota. Prve okužbe nastanejo pri več dnevnih temperaturah med 25 in 27°C in		Agrotehnični ukrep: - širok kolobar, - zmerno gnojenje z dušikom, - setev odpornejših sort, - globoko zaoravanje okuženih ostankov rastlin, - sladkome pese ne sejemo v bližino lanskih pesič ali območij, kjer se je pridelovala krmna ali rdeča pesa.	difenokonazol	Score 250 EC	0,4 l/ha	28 dni
				Mavita 250 EC	0,4 l/ha	28 dni	
				Reyona	1,5 l/ha	28 dni	
				mefentriflukonazol			
				terakonazol	Eminent 125 EW	0,8 l/ha	30 dni
							Uporaba le 1x v sezoni. Manjša uporaba.
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i>) str. QST 713subtilis	Serenade ASO	4 l/ha	Ni potrebna

relativni zračni vlagi 98 do 100%. Prva znamenja se običajno pojavljajo na listih v gostejših posevkih in v posevkah v bližini vodotokov, kjer je relativna zračna vlaga višja. Zaradi propadanja listne mase rastlina rezerve skladisčene v korenih troši za oblikovanje nove listne mase, kar privede do oblikovanja večjih glav korenja. Pridelek se lahko zniža za 20%, digestij pa za 20%. Pojavila se vsako leto v obdobju julij -september.	škropilimo dvakrat. Če si pesa pogosto sledi v kolobarju ter v ugodnih vremenskih razmerah za razvoj in širjenje bolezni (toplo vreme z obilnimi padavinami), so potrebna tri škropljenga.)			
Siva listna pegavost <i>(Ramularia beticola)</i>	<p>Opis bolezni: Boleznska znamenja se pojavljajo na starejšem in srednjem listju v oblik svetih – sivih peg nepravilnih oblik velikosti 4-10 mm in obrobijenih s svetlo rjavim robom. Znamenja lahko zamenjamo z znamenji pesne listne pegavosti. Siva listna pegavost se izrazi v letih z vlažnimi poletji in nižjimi temperaturami zraka.</p> <p>Agrotehnični ukrepi: glejte pesno listno pegavost</p> <p>Kemično varstvo: Pri močnejšem napadu peso varujemo z registriranimi fungicidi.</p>	mefentrifukonazol Revyna 1,5 l/ha 28 dni	tetraconazol Eminent 125 EW 0,8 l/ha 30 dni	Uporaba le 1x v sezoni. Manjša uporaba.

INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMIREK	KARENCA	OPOMBE
Rhizoctonia - gntje korenov <i>(Rhizoctonia solani)</i>	Opis bolezni: Gliva okuži pesne rastline sredi rastne dobe. Gnezda propadajočih rastlin običajno opazimo poleti. Starejši listi pričnejo veneti in odmirati. Koreni pričnejo propadati, gnetje se prične pri konici korenja. Pri močni okužbi korenji v celoti zgnijajo. Agrotehnični ukrepi: - pomemben je ustrezni, vsaj štiriletni kolobar, - bolezen lahko omilimo z odvajanjem vode, izboljšanjem strukture tal, setvijo stenskih dosevkov.	Kemično varstvo: Zatiranje bolezni s fungicidi ni učinkovito.	Žveplo 82,5% Žveplo 80%	Microthiol SC Microthiol special	5-7,5 l/ha 5-7,5 kg/ha	Čas uporabe	
Pesna pepelasta plesen (<i>Erysiphe betae</i>)	Opis bolezni: Na okuženih listih se oblikuje mokasto bela preyleka. V primeru močnejše okužbe listje rumeni in listi se posušijo. Na pojav bolezni ugodno vpliva vroče vreme oziroma spremenljiva obdobja s suhim in vlažnim obdobji oziroma pogosto rosenje. Težave lahko pričakujemo zlasti v letih z zgodnjim pojavom bolezni. Bolezen se redko pojavlja v takšnem obsegu, da bi jo bilo potrebno posebej zatirati.	Kemično varstvo: uporaba registriranih fungicidov	Polsulphur 80 WG Polsulphur 80 WP Azumo WG Microthiol disperss – poraba zalog 30.6.2024 Sulfar Žveplo 70 %	6-7,5 kg/ha 6-7,5 kg/ha 7,5 kg/ha 5-7,5 kg/ha 5 l/ha	10 dni 10 dni 14 dni Čas uporabe Uporaba 3x v sezoni.	Čas uporabe	
Pesna rja (<i>Uromyces betae</i>)	Opis bolezni: Pojavi se na koncu poletja. Na zgornji in spodnji strani listov se oblikujejo 1 mm velika rdeče oranžna do rjavkasta ležišča spor.	Kemično varstvo: uporaba registriranih fungicidov	mefentriflukonazol difenkonazol	Reyyona Score 250 EC Mavita 250 EC Reyyona Eminent 125 EW	1,5 l/ha 0,4 l/ha 0,4 l/ha 1,5 l/ha 0,8 l/ha	28 dni 28 dni 28 dni 30 dni Uporaba le 1x v sezoni. Manjša uporaba.	

	Na bolezen ugodno vpliva visoka zračna vlaga in temperature zraka med 10 in 20°C.			
Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)	Opis bolezni: Se ne pojavlja v takšnem obsegu, da bi jo bilo potrebno zatirati.			

Bradatost:

korenov pese - rizomanija
(Beet Necrotic Yellow Vein Virus)
Učinkovitih ukrepov zatiranja ne poznamo. Pomembno je upoštevanje širokega kolobarja (na površini, kjer se pojavi rizomanija je potrebno upoštevati vsaj 6-8 letni premor). Edina rešitev je setev odpornejših sort na okuženih območjih.

INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREP	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Talni škodljivci strune (Elateridae) ogrci različnih hroščev ličinke koščeninarjev (<i>Tipula</i> spp.)	Opis škodljivca: Objedene korenine, v korenem zavrtani rovi, obgrizeni koreninski vrat, rastline propadajo. Agrotehnični ukrepi: - izogibanje večletnemu travnjiku kot predposevku (priporočena je setev sladkorne pese šele 3 leta po preoravanju), - večkratna obdelava tal, (priporočena je obdelava v suhem vremenu), - optimalni roki seive in sajenja. Kemični ukrepi: Uporaba z insekticidi tretiranega semena Za zmanjševanje populacije strun sladkorne pese se lahko uporablja Force 20 CS. Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Seme smejo tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljskih in zelenjadnic«.						
Force Evo (manjše uporabe) v odmerku 12-16 kg/ha. ROČNO TRETIRANJE S SREDSTVOM NI DOVOLJENO! Tretiranje je dovoljeno samo v času setve oz. saditve s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na sadnik ozira na sejalnico in s katerimi se odmerja količina sredstva. Priporoča se, da se na troslinik pritrdi nastavitev shemo za odmerjanje (na voljo pri proizvajalcu stroja). Sredstvo se mora med setvijo/saditvijo temeljito zadelati v tla. Karenca je zagotovljena s časom in načinom uporabe. Columbo 0,8 MG – za zmanjšanje populacije strun, v odmerku 12 kg/ha. Karenca je zagotovljena s časom uporabe.	Opis škodljivca: 1,5-2 mm veliki hroščki na kličnih in pravih listih izjedajo zgornjo povrhnjico in del mezenhima, rezultat so značilne luknjice premera 1-2 mm. Najbolj so ogroženi posevki od	deltametin lambda-cihalotrin teflutrin	Decis 100 EC Karate zeon 5 CS Force evo	63 ml/ha 0,15 l/ha 12-16 kg/ha	30 dni 15 dni	Čas in način uporabe	Manjša uporab a

	<p>vznika do štirih pravih listov. Več o škodljivcu si lahko preberete na: Pesni bolhač</p> <p>Agrotehnični ukrepi: Posevke pese, repe in drugih gostiteljskih rastlin zasnujemo čim daje od starih, lanskoletnih posevkov. Zgodnjemu napadu škodljivca se lahko izognemo z zgodnejšo setijo in izbiro zgodnjih sort, ki hitro razvijajo dovolj listne mase. Z izvajanjem ustreznih agrotehničnih ukrepov skrbimo za hiter mladostni razvoj rastlinic, da čim prej preidejo kritično fazo od kotiledona do razvoja prvih štirih pravih listov.</p>	<p>Uporaba insekticidov: Samo ob izredno množičnem napadu ko je dosežen prag škodljivosti uporabimo insekticide po celji površini.</p> <p>Kritično število: Z vizualnim pregledovanjem rastlin na prisotnost pesnih bolhačev pričнемo takoj po vzniku posevka, pri čemer pregledamo najmanj 100 do 200 rastlin. V fazi kličnih listov je prag škodljivosti presežen, če v povprečju najdemo več kot 2 poškodbi na rastlino, ob razvoju prvega para pravih listov pa 3-4 poškodbe na list. Pojav škodljivca lahko spremlijamo tudi s pomočjo leplilnih plošč, ki jih ob rastlini postavimo takoj po vzniku. Hrošči so še posebej aktivni v toplih in sončnih dneh. Kritično število znaša 5 do 8 hroščev na dolžinski meter vrste posevka</p>								
Črna fižolova uš (<i>Aphis fabae</i>)	<p>Opis škodljivca: Oba uši povzročata direktno škodo s sesanjem in indirektno ker prenašata virus, predvsem virus pesne rumenice.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>lambda-cihalotin</th> <th>Karate zeon 5 CS</th> <th>0,15 l/ha</th> <th>15 dni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pirimikarb</td> <td>Pirimor 50 WG</td> <td>0,5 kg/ha</td> <td>7 dni</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kritično število: črno fižolova uš zatiramo, ko opazimo redke uši na 30 % rastlin, sivo breskovo pa, če najdemo 3 uši na 10 rastlin.</p> <p>Uporaba insekticidov: pri začetnem napadu je mogoče uspešno zatreći uši že s škopljjenjem robov, ko se razširijo upoštevamo kritično število.</p>	lambda-cihalotin	Karate zeon 5 CS	0,15 l/ha	15 dni	pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,5 kg/ha	7 dni
lambda-cihalotin	Karate zeon 5 CS	0,15 l/ha	15 dni							
pirimikarb	Pirimor 50 WG	0,5 kg/ha	7 dni							
Siva breskova uš (<i>Myzus persicae</i>)	<p>Opis škodljivca: Pojavlja se v aprilu, maju in začetku junija in lahko pese poškodujejo vse od vznika do razvojne faze 6-8 listov. Gosenice najprej izjedajo listje, pozneje pa tik pod površjem objedajo korenine. Gosenice lahko močno razredčijo ali celo uničijo posevek. Hranijo se ponoči. Večjo škodo povzročijo le v posameznih letih in napad je lokacijsko nekoliko omejen. Zatiranje je težavno.</p> <p>Agrotehnični ukrepi: število talnih sovk zmanjšujemo z večkratno obdelavo tal in temeljnim zatiranjem plevelov (pomembno je tudi zatiranje plevelov na strniščih).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>detametrin</th> <th>Decis 100 EC</th> <th>75 ml/ha</th> <th>30 dni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KRITIČNO STEVILLO:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kritično število za okopavine sta dve gosenici druge ali tretje razvojne stopnje na m².</p> <p>Kemično varstvo: v primeru preseganja kritičnega števila insekticide uporabimo zvečer oz. ponoči.</p>	detametrin	Decis 100 EC	75 ml/ha	30 dni	KRITIČNO STEVILLO:			
detametrin	Decis 100 EC	75 ml/ha	30 dni							
KRITIČNO STEVILLO:										

INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Veliki pesni rilčkar <i>(Bothynoderes punctiventris)</i>	Opis škodljivca: Hrošči so dolgi med 10 in 16 mm, so črno obarvani, telo pa je obdano s svimimi luskicami (na pokrovkah vidne proge iz pikčastih jamic, na zadnji tretjini pokrovka pa je temnejša prečna proga v obliki črke V). Prezimujejo hrošči na lanskih pesičih in ko se zemlja segreje na globini 10 cm na 8-10°C potujejo do novih pesič. Pri temperaturah zraka nad 19,5°C hrošči tudi letijo. Hrošči z obžiranjem poškodujejo mlaude rastline in kritično obdobje je od vznika do razvoja dveh oziroma treh parov pravih listov. Poškodovane rastline se pogosto popolnoma posušijo. Peso lahko poškodujejo tudi ličinke, ki se zavrtajo v korenne pese in napadeni korenji so lažji, v napadene korenje pa vdriajo tudi sekundarni paraziti (povzročitelji gnita). Manjša kot je pesa, večja je lahko škoda, še zlasti pa škodljivcu ustreza suho in toplo vreme. Škodljivcu za razmnoževanje zlasti ustrezajo leta, ko imamo v maju več kot 12 toplih dni, več kot 300 ur sonca in manj kot 50 mm padavin (nevarenost za prihodnjo sezono!). Škodljivec je zelo odporen na insekticide.	Agrotehnični ukrepi: <ul style="list-style-type: none"> - dosledno upoštevanje kolobarja, - če je le mogoče, naj bodo letošnji posevki sladkorne pese oddaljeni vsaj 1 km od lanskih, lanska pesiča pa naj bodo obdana z jarki, globokimi vsaj 30 cm (ravno dno, navpične stene), - izvajanjem vseh ukrepov, ki pomagajo rastlini, da hitro preide kritično obdobje razvoja, globoko jesensko oranje, - skrb za ohranjanje naravnih sovražnikov (ptic). Kemično varstvo: V Sloveniji za zatiranje tega škodljivca nismo registrirana nekatera insekticida.					
Mahovinar <i>(Atomaria linearis)</i>	Opis škodljivca: Mahovinar je hrošč dolg 1,2 do 1,8 mm, sploščenega telesa, svetljave do temnojavne, skoraj črne barve. Hrošči na koreninah ali koreninskem vratu pod kličnimi i listi naredijo do 2 mm velike luknjice. Luknjice se temno obarvajo, klice pa pogosto propadejo preden sploh vznikajo. Hrošči kasneje od roba ali v obliki i ukeni objedajo tudi lisje (v vlažnem in hladnem vremenu), ličinke se hranijo na drobnih koreninah, vendar povzročena škoda ni gospodarsko pomembna. Ob močnejših napadih lahko močno prizadene sklop rastlin. Nevaren je za rastline od seteve do stadija 2-3 parov pravih listov. Škodljivec napada tudi rdečo peso, špinaco, blitvo in nekatere plevele, hrani pa se tudi z glivnim micelijem in trosi. Prezimijo hrošči v rastlinskih ostankih ali v zemlji na njivah, kjer je bila preteklo leto pesa. V marcu in aprilu običajno zapuščajo prezimovališča in lezejo na letošnje posevke. Pri temperaturah zraka nad 10°C lahko tudi letijo.	KRITIČNO ŠTEVILLO: Kemično zatiranje je potrebno v primeru, da je v času od vznika pese do razvojnega stadija 8 listov pese napadenih več kot 20% rastlin.	lambda-cihalotrin teflutrin	Karate zeon 5 CS Force evo	0,15 l/ha 12-16 kg/ha	15 dni Čas in način uporabe	15 dni Manjša uporaba

Opis škodljivca:	Opis škodljivca:	deltametrin	Decis 100 EC	75 ml/ha	30 dni	
(Autographa gamma, Noctua spp.)	Gosenice listnih sovk so zelene do rjave barve. Pojavlajo se v juniju, juliju in od sredine avgusta do jeseni. Gosenice izjedajo pesno listje, listne pecile in glavo korenov. Za zatiranje gosenic listnih sovk so registrirani nekateri insekticidi, ki pa jih je potrebno uporabiti čimprej ob pojavu mladih gosenic, saj nanje najbolje učinkujejo v začetnih stopnjah razvoja.	lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 l/ha	15 dni	
Agrotehnični ukrepi: Gosenice imajo raje posevke z bujnim listjem kjer se dalj časa zadružuje vlaga, zato pretirano gnojenje posevkov z N ni dopustno.	Opis škodljivca: Pesna muha odlaga jajčeca na spodnjo stran listov. Rumene žerke vrtajo rove v listju, kasneje pa se epiderma mehuriasto napihlje. Prezimi v stadiju bube v tleh, letno pa ima 2 do 3 generacije. Za sladkomo peso je predvsem nevarna prva generacija, na mladih rastlinah pese (4 do 8 listov). Napada tudi kmuno peso in špinaco. Agrotehnični ukrepi: - upoštevanje širokega kolobarja, - škodljivost zmanjšamo z zgodnjim setvijo.	KRITIČNO ŠTEVILLO: - pesa v stadiju dveh pravnih listov: 2 jajčeci ali ličinki na rastlino, - pesa v stadiju štirih pravnih listov: 6 jajčec ali ličink na rastlino, - pesa v stadiju šestih listov: 10 jajčec ali ličink na rastlino. Kemično varstvo: Uporaba registriranih insekticidov.	lambda-cihalotrin	Karate zeon 5 CS	0,15 l/ha	15 dni
Pesna muha (<i>Pegomya betae</i>)						

INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE VVOI- najožje v vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE	
Pesni moj (<i>Scrobipalpa ocellatella</i>)	Opis škodljivca: Samice pesnega molja odlagajo jajčeca na najmlajše liste sladkorne pese. Škodo povzročajo sivo rumene ali sivozelene gosenice (doseže 10 do 12 mm dolžine), ki se hranno s temi najmlajšimi listi (zavrtajo se v liste in listne pecje), pozneje pa zapredajo srčne liste in jih objedajo. Nato objedajo rove v glavi korenina in v listnih pecijih. V "srcu" pese pustijo značilno vlažno snov izrebkov, kar pospeši gnite "srca" in glave korenina. Prezimuje v stadium odrasle gosenice ali bube v ostankih pese na polju ali v zemlji. Na leto ima 3 do 4 robove. Za škodljivca so zlasti ugodna topla in suha leta ter leta z zgodnjim poletjem in dolgo suho jesenjo.	Agrotehnični ukrepi: - upoštevanje širokega kolobarja, - uničevanje ostankov rastlin po spravilu pridelka, - jesenska globoka obdelava tal, - namakanje.		Lambda-cihalotrin Delta-metrin	Karate zeon 5 CS Decis 100 EC	0,15 l/ha 75 ml/ha	15 dni 30 dni	
Pesna ogorčica (<i>Heterodera schachtii</i>)	Opis škodljivca: Najpogosteje se pojavlja na površinah, kjer si pogosto sledi pridelava sladkorne pese. Škodo povzroča s sesanjem sokov na koreninah, kar povzroči izcrpanje rastline in le ta v pomanjkanju hrane in vode oblikuje številne koreninice, kar daje korenui videz bradatosti. Na koreninah so opazne belkaste do rjavkaste kroglice. Rastline so pritlikave, listi rumenasto obarvani in venijo. Posledično ima lahko glavni koren v času spravila zelo nizko vsebnost sladkorja, kar pomembno zniža višino pridelka. Napadene rastline pri močnejšem soncu in višji temperaturah proti koncu sezone kažejo znamenga pomanjkanja vode, venijo in polegajo po tleh (od daleč vidno kot manjše ali večje oaze). V primeru dežja ali močneže rose si listje začasno opomore.							
	Kritično število: Vsaj 70 % rastlin napadenih s povprečno 4-5 gosenicami na rastlino (zatiranje je potrebno, če ne pričakujemo dežja). V slabo razvitem posevku - 5 gosenic na rastlino na 50% rastlin (zatiranje je potrebno, če v naslednjih 10 dneh ne pričakujemo dežja).	Kemično varstvo: Uporaba insekticidov je potrebna zlasti poleti, saje je močnejši pojav škodljivca avgusta in septembra. Insekticide je potrebno uporabiti na začetku napada in aplikacijo izvesti z večjo količino vode						
Polži	Pripravek Votivo FS240 (<i>Bacillus firmus</i>) – za tretiranje semena. Polži objedajo listje in za sabo puščajo služaste sledi.			metaldehid	Metarex inov	4-5 kg/ha	Čas uporabe	

<i>Limacidae Gastropoda</i>	Agrotehnični ukrepi:	<ul style="list-style-type: none"> - čiščenje poti preko katerih prihajajo na parcelo in okolice njive, - kakovostna priprava setvenice, - obdelava tal v suhem poletnju, - jesensko preoravjanje površin, - zatiranje plevelov. <p>Kemično varstvo: uporaba limacidov. Več o tem škodljivcu lahko preberete na: Polž</p>	Gusto3 - Polžomor Plantella arion Ecometal	6 kg/ha 6 kg/ha 7 kg/ha	90 dni 90 dni Čas uporabe
	Železov (III) fosfat	Ironmax pro Ferramol Solabiol proti polžem Polžomor bio vaba za zatiranje polžev	7 kg/ha 50 kg/ha 50 kg/ha 50 kg/ha	Ni potrebna Ni potrebna Ni potrebna Ni potrebna	

V primeru aplikacije po celotni površini (5 kg/ha) se le ta opravi od 7 dni pred setvijo do stadja, ko imajo rastline razviti do 5 listov. Možna je tudi aplikacija sredstva v brazdo pred setvijo (4 kg/ha).

V primeru močnega napada se priporoča ponovitev aplikacije. Pri večkratnem tretiraju v eni rastni dobi najvišji skupni odmerek v eni rastni sezoni ne sme presegati 17,5 kg sredstva na hektar!

INTEGRIRANO VARSTVO SLADKORNE PESE
WOf- rajožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIV ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
INTEGRIRANO VARSTVA PRED PLEVELI:							
Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Že 10% pokrovnost tal s pleveli v stadiju 4-6 pravih listov sladkorne pese povzroči gospodarsko škodo na priedelku. Po sklenitvi vrst sladkorna pesa lahko konkuriра s pleveli z nižjim habitusom, slablo pa je konkurenčna z višjimi pleveli kot so npr. ščiri, metlike, dresni, navadna ambrozija, baržunasti oslej idr. Varstvo sladkorne pese pred pleveli soci med strokovno zahtevnejša opravila. Na rijuah, kjer imamo dovolj širok in pester kolobar in kjer redno in pravočasno izvajamo vse potrebne higieniske ukrepe zatiranja plevelov, bo zatiranje plevelov v sladkorni pesi manj zahtevno. Med postredne načine varovanja sladkorne pese pred pleveli spada kakovostna pripravata. Pri varstvu pred pleveli nam je lahko v precešnjem pomoč metoda slepe seteve (do seteve tla večkrat plitvo obdelamo), da spodbudimo kultiv enoletnih plevelov, ki jih s predsetenikom uničimo), med vegetacijo pa so pri zatiranju plevelov pomembni postopki mehanskega zatiranja z okopavanjem.							
Večletne – trajne plevelje je z uporabo nekemičnih postopkov varstva na večjih površinah zelo težko zatreći. V posevkah sladkorne pese večine trajnih plevelov (predvsem širokolistnih) tudi ni mogoče zadovoljivo kemično zatreći, zato jih je treba zatirati že v predposvetih ali na strnišču. Najbolje lahko razplevelimo njive trajnih plevelov z uporabo neselektivnih pripavkov na strnišču.							
Zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (steba setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.							
PRED ali PO SETVI, PRED VZNIKOM	PRIPRAVEK:	Dovoljena skupna količina herbicida na ha ali maksimalen enkraten odmerek:	KARENCA:	OPOMBE:			
glifosat v obliku izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme)	1,2 – 4,0 l/ha ^a	Čas uporabe	odvisno od časa uporabe (pred ali posetvi)			
glifosat v obliku izopropilamino soli	Bqm super	1,5 l/ha	Čas uporabe				
PO SETVI, PRED VZNIKOM	Dual gold 960 EC	0,8 – 1,2 l/ha ^a	Čas uporabe	odvisno od tal			
S-metotaklor	Efica 960 EC	0,8 – 1,2 l/ha ^a	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.			
PO SETVI, PRED VZNIKOM in PO VZNiku	Goltix WG 90	Največji skupni odmerek je 3,9 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.			
metamitron	Bettix flo	Največji skupni odmerek je 5 l/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	Čas uporabe				
PO VZNiku	Metafol WG	Največji skupni odmerek je 5 kg/ha, uporaba v split – deljeni aplikaciji.	Čas uporabe	Prepovedan na VVOI.			

	FineX 700 SC	Uporaba v deljenem odmerku: 3 krat po 1,65 l/ha	Čas uporabe	
klopiralid	Lontrel 100 – porabe zalog 30.4.2023	1 – 1,2 l/ha 0,17 kg/ha 0,4 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe 80 dni	Prepovedan na VVO! Na isti površini se priporoča uporaba sredstva vsake tri leta.
	Major 300 SL	0,3 – 0,4 l/ha ali deljen odmerek 3x 0,2 l/ha	Čas uporabe	
propakvizafop	Agil 100 EC	0,75 – 1,5 l/ha	60 dni	
cikloksidim	Zetrola	0,75 – 1,5 l/ha	60 dni	
fluazifop – p- butil	Focus ultra	1 – 4 l/ha	56 dni	
kvizalofop-p-etyl	Fusilade forte	0,8 – 2,5 l/ha	56 dni	
kletodim	Fusilade max	1-3 l/ha	56 dni	
	Trepach	1,8-2,5 l/ha	110 dni	
	Targa super	1,2 – 2,5 l/ha	60 dni	
	Digator	0,6 l/ha	87 dni	
	Zamzar	1,8-2,5 l/ha	110 dni	
dimetenamid-P	Frontier X2	0,7 – 0,8 l/ha	Čas uporabe	Prepovedan na VVO!
	Select super	1 – 2,5 l/ha	56 dni	

12.7 INTEGRIRANO VARSTVO OLJNIH BUČ

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Peplenasta plesen buč <i>Erysiphe polypagina, Kumarična pepelasta Sphaerotheca fuliginea, Plesen, pepelovka bučnic Erysiphe cichoracearum, Pepelovka bučnic Golovinomyces orontii</i>	Opis bolezni: Pojavlja se najpogosteje. Že konec julija lahko močno pospeši propadanje listja. Pepelovke povzročajo slabo polniljenje semen pri plodovih razvitih iz bolj pozno oplojenih cvetov. Splošno razširjena pepelasta plesen lahko že konec julija močno pospeši propadanje listja. Za zatiranje priporočamo uporabo žvezpla, omejujoč dejavnik možnosti vožnje s traktorjem. Z vožnjo po posevku naredimo veliko škodo na vrežah, ki bi morda celo presegla škodo od pepelovke.		<i>Ampelomyces quisqualis</i> sev AQ10 Žvezpl	AQ-10 Biotip sulfo 800 SC	35 g/ha 5-7.5 l/ha	1 dan 3 dni	Manjša uporab.
Plesen bučnic <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Opis bolezni: Na oljnih bučah spoznamo okužbo s <i>Peronospora cubensis</i> po tem, da listno tkivo rumeni in nato porjavlji. Okuženi deli listov so od zdravih delov razmejeni z listnimi žilami, zato izgledajo robovi peg oglastasti. Pege so sprva razmeroma majhne, po večini velike le nekaj mm. Če se ugodne razmere nadaljujejo, se pege zlivajo med seboj v večje ploskve listnega tkiva, ki se suši. Tudi za oljne buče velja, da se na spodnj strani listov oblikuje gostota črno-vijolična prevleka trosoncev in trosovnikov.						Agrotehnični ukrepi: - setev odpornih sort - zagotoviti zračnost posevka - upoštevanje širokega kolobarja
Virusi: -virus rumenega mozaika bučke ZYMV, -virus mozaika kumare CMV, virus mozaika lubenice WMV -newdelhi virus kodravosti listov paradižnika ToLCNDV	Opis bolezni: Virusni simptomi na oljnih bučah so vidni kot nekroze na listih, razbarvani listi, listi so bili pogosto nagubani, deformirani plodovi, slabta rast rastlin. Virus se lahko prenaša mehansko s sokom iz okuženih rastlin in z listnimi ušmi... Virus kumanega mozaika je pri nas splošno razširjen in najbolj pomemben virus, ki ogroža buče. Je dobro prenosljiv z ušmi in delno s semenom. Na listju se pojavijo mehurasti mozaični vzorci, na delno deformiranih plodovih pa bulaste izbokline. Najbolj nevšečni učinek okužbe je slabše cvetenje in abortiranje cvetov. Pogosto so okužene okrasne rastline, paradiznik in paprika. Če je možen obsežen prelet uši med temi rastlinami so posevki buč lahko močno okuženi.						Agrotehnični ukrepi: Spremjam pojav uši in jih po potrebi zatiram. Čiščenje, razkuževanje orodja in strojev. Zatiranje plevela na in v okolici njive ter odstranitev rastlin, ki kažejo tipične simptome virusov. Uporaba zdравega razmnoževalnega materiala (kakovostno seme). ToLCNDV spada med karantenske škodljive organizme. V primeru suma na nivočnost je treba obvestiti UVHVVR.

Bakterijski ožig bučnic <i>Pseudomonas lachrymans</i>	Opis bolezni: Pri nas občasno pojaviti v deževnih letih na njivah v bližini večjih vrntrij.	ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Listna pegavost bučnic <i>Septoria cucurbitacearum</i> Fuzarijska uvelost in nožna trohnoba buč <i>Fusarium oxysporum</i> spp., <i>Fusarium solani</i> spp. Kumarna bakterijska uvelost na bučah <i>Erwinia tracheiphilla</i> Bela zrnata griloba bučnih vrež <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Opis bolezni: Septorijska pegavost buč se pri nas pojavlja, vendar nima vpliva na pridelek. Kumarna bakterijska uvelost pri nas na bučah še nismo potrdili, obstajajo pa možnosti za pojavljanje. V slabih rastnih pogojih ob vzniku in kmalu po njem buč napadejo nekatere talne glive (<i>Phytiuum</i> , <i>Sclerotinia</i> , <i>Rhyzoctonia</i> , ...). V integrirani pridelavi uporabljamo razkuženo seme. Obseg okužb ob vzniku zmanjšamo če ob predsetveni pripravi ta ustvarimo rahlo strukturo in če obilno gnojimo z organskimi gnaji. To velja tudi za venjenje in trohnobu vrež povzročeno od gliv iz rodu Fusarium in Sclerotinia. Komposti narejeni iz ostankov stebel paradižnika, paprike, jajčevcev, kumaric in fižola niso primerni za grojenje buč. Fuzarioze – Maxim quattro (Azoksistrobin + fludiokszonil + metalaksil-M + tiabendazol) – za tretiranje semena								
Listne uši: Bombaževčeva uš (<i>Aphis gossypii</i>) Crna fižolova uš (<i>Aphis fabae</i>)		flonikamid	Afinto Teppeki		0,1 kg/ha		3 dni 3 dni	Uporablja se 2 x v sezoni.	
Strune (<i>Agriothes</i> spp.) Talne sovke (<i>Agrotis</i> spp.)		Lambda-cihalotrin	Trika expert		15 kg/ha		Čas uporabe		
Rastlinjakov ščitkar (<i>Trialetirodes vaporariaeum</i>) Navadna fižolova pršica (<i>Tetranychus urticae</i>) Razni bolhači (<i>Phylloptreta</i> sp.)									

Opis škodljivca:

Napad večine omenjenih škodljivcev za buče ni tako škodljiv, da bi zaradi tega prišlo do zaznavne redukcije pridelkov in se je navadno uporabi insekticidov možno izogniti. Setev semen, ki so bila obdelana z insekticidi s strani semenarskih organizacij je dovoljena.

**INTEGRIRANO VARSTVO OLJNIH BUČ
VVOI-najožje vodovarstveno območje.** Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	UKREPI	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA	OPOMBE
Integrirano zatiranje plevelov v bučah:							
Buče imajo dokaj slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom tako v začetku razvoja, kot tudi v drugem delu rastne dobe. So šibek člen kolobarja in lahko pomembno vplivajo k povečanju zaplevljenosti rjiv, posebej če dolgo čakamo s spravilom. Osredotočiti se je potreben na čim večji obseg mehaničnega zatiranja plevelov, tako strojno kot ročno. Preden se odločimo za prioritetno zatiranje buč moramo nujne razplevelit v drugih poljsčinah. Ker buče sejemo razmeroma pozno se lahko pred setvijo poslužujemo tehniko izčrpavanja zalog plevelnih semen- izvedba slepe setve. Njivo na grobo poravnano že v začetku aprila. S tem vzbudimo kalitev plevelov. Tri tedne po prvi pripravi opravimo branjanje s katerim prizadene možemo že vznikle plevele. Potem rjivo ponovno pustimo pri miru kakšnih 14 dni, nato pa izvedemo pravo predsetveno pripravo. Sejemo nakajeno seme buč, da čim bolj pospešimo vznik. Zato, da si olajšamo mehanično zatiranje moramo uskladiti način setve – sajenja in način uporabe okopalnikov ali drugih orodij za mehanično zatiranje. Pri setvi s sejalnicami za koruzo so medvrstne razdalje večkratniksi razdalje 0,7 m. Takšne razdalje se ujemajo z okopalnikki za koruzo, ki jih nekoliko priredimo. Dovrstna setev je že manj primerna za strojno okopavanje. Možno je enovrstna setev v sistemu šahovnice tako, da lahko buče okopavamo v dveh smereh, pravokotno eno na drugo. Ročno zatiranje plevelov v bučah je navadno potrebno in se običajno stroškovno gledano tudi obrestuje.							
Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.							
Širokolistni in ozkolistni pleveli pred vznikom plevelov in buč.	kłomazon	Centium 36 CS Clomate	0,25 l/ha 0,25 l/ha	Čas uporabe	Čas uporabe	Manjše uporabe	Manjše uporabe
Ozkolistni pleveli po vzniku plevelov in buč	fluazifop-p-butil	petoksamid Fusilade forte Fusilade max	Successor 600 0,8 – 1,3 l/ha 1 – 1,5 l/ha	2 l/ha	Čas uporabe	Čas uporabe	Čas uporabe
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli.	napropamid	Devrinol 45 FL Colzamid	2 – 2,5 l/ha 2 – 2,5 l/ha	Čas uporabe	Čas uporabe	Manjše uporabe. Pred setvijo se plitko zadela v tla	Manjše uporabe
Enoletni širokolistni pleveli Po setvi pred vznikom buč in plevelov	izoksaben	Flexidor	največ 0,75 l/ha	114 dni	114 dni	Manjše uporabe	Manjše uporabe

12.8 INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC

VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS IN TEHNIKA ZATIRANJA	AKTIVNA SNOV	KARENCA	OPOMBE
SPOLOŠNO O PRISTOPU K VARSTVU PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI				

Sončnice v Sloveniji pridelujemo na razmeroma ekstenziven način, zato pridelovalci navadno ne izvedejo vseh pridelovalnih ukrepov, ki jih predvideva intenzivna pridelava. Ta tehnološka navdila so oblikovana za srednje intenzivno pridelovanje.

Če bomo sončnice pričeli pridelovati bolj pogosto bo potrebo pretehtana strategija pridelovanja in kolobarjenja, kot jo izvajamo sedaj. Trenutno nam za pridelovanje manjkajo informacije glede izbora hibridov, nimamo ustrezne mehanizacije za aplikacijo FFS in tudi pri spravilu so težave. Ker nimamo ustreznih škropilnic ne moremo opravljati poznejših škropiljenj s fungicidi, ki so predvidena za varstvo koškov v običajnih škropilnih programih za intenzivno pridelavo. Z običajno škropilno tehniko (traktorji) lahko opravimo le zgodnja škropiljenja, ko dosegač rastline višino do 90 cm. Zaradi tega so za pridelovanje primerno najti hibridi pri katerih je še možna vozinja v začetku razvoja cvetnih popkov, ko je primeren čas za aplikacijo fungicidov. Dodatno izberemo bolj zgodnje hibride, klijub manjšim pridelkom zato, ker so lahko pri poznejh hibridih izgube zaradi bolezni koškov, v letih z deževnim koncem avgusta in začetkom septembra, zelo velike. Potencialno je možno sončnico dobro izrabiti kot stniščni posevek po spravilu zgodnjega ječmena, bodisi za same, predvsem pa za zeleno gnojenje.

Trenutni kužni potencial nekatereh za sončnice škodljivih gliv in bakterij je dokaj majhen, zaradi česar je potreba po uporabi fungicidov zmerno velika. Če se bomo v primeru povečanega obsegga pridelovanja držali vsaj štiriletnega kolobarja bo bolezni potencial pri nas še nekaj časa dokač nizek. V trenutnih razmerah sta najbolj pomembni glivični bolezni bela gnijoba in siva plesen. Mnoge druge glivične bolezni povzročene o dgl iz rodov *Puccinia*, *Altemaria*, *Fusarium*, *Erysiphe*, *Spahaerothecea*, *Verticillium*, *Sclerotium*, *Albugo*, *Phomopsis in Phoma* se pri nas trenutno pojavljajo redko in le v manjšem obsegu. O zatiranju teh v tem besedilu ni navodil, ker je njihov trenutni gospodarski pomen v Sloveniji zelo majhen. Omeniti je potrebno, da večji napad bolezni lahko pričakujemo v primeru pridelave na hmeljščih ali med njimi in v kolobarnih sistemih, kjer sejemo veliko ogrščice in metuljnic, ker nekatere bolezni lahko prehajajo med omenjenimi rastlinami. S stalisača kolobarja je potrebno upoštevati predvsem časovne presiedke do ogrščice, ki je pomembna gostiteljica znate gnijobe, ki pri sončnicah povzroča velike izgube pridelka. Pred preoravanjem ostankov po žetvi je le dobro zmleti na čim bolj drobne koščike, da pospešimo preperevanje stebel, ki ne preperujejo hitro. Glede na trenutno intenzivnost pridelovanja navadno uporabimo fungicide le enkrat, ko imajo rastline 70 do 80 cm (začetek razvoja socvetja).

Večkrat opazimo, da nekateri sončnice zaradi napak v pridelavi ali pomanjkljivih dogоворov o spravilu in odkupu kar pustijo propadati pozno v jesen. S tem izrazito povečajo potencial bolezni, ki se nemoteno razvijajo na propadajočem posevku. Osnovno varstvo pred boleznimi predstavlja uporaba razkuženega semena. Če kupujemo semе je navadno vedno ustrezno razkuženo. Razkuževanja nikoli ne izvajamo sami.

Povečajoče se populacije plevelov (*Helianthus tuberosus*, *Xanthium sp.*, *Rudbeckia laciniata* in *R. hirta*) za enkrat še ne igrajo pomembne vloge v epidemiologiji bolezni sončnice. V okoljih, kjer imajo v bodočem namen sončnice pridelovati v večjem obsegu je priporočljivo zgodnjeomejevanje širjenja populacij omenjenih plevelov. Od škodljivcev so trenutno najbolj škodljive strune. Za zatiranje škodljivcev med rastno dobo (uši, stenice, ...) pri nas trenutno nimamo registriranih pripravkov. Kot odvráčalo za divjad se lahko v sončnici uporablja sredstvo Trico (15 l/ha olje na osnovi ovčje maščobe).

**INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!**

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS IN TEHNIKA ZATIRANJA	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA
Bela gniloba <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Opis bolezni: Gnila povzročiteljica bele gnilobe je splošno razširjena gnila, ki se ohranja v tleh v obliku sklerocijev. Na sklerocijih na površju tal ali tik pod njimi nastanejo spomladi askospore, ki se sprostijo iz apotecijskih plodišč. Te okužijo nadzemne in podzemne organe mladih rastlin sončnice. Gnila lahko uniči že mlade rastline, katerim propadejo korenin ali koreninski vrat, lahko pa se latentno razvija do obdobja razvoja koškov in prehraste cvetlišče. Na košku se pojavijo velike krate zrnate sklerotične tvorbe obdane z belim micelijem. Zgodaj napadene rastline uvenejo in se posušijo. Rastline napadene sredi poleja poležejo ali pa se jih prelomi steblo. Za zatiranje bele gnilobe uporabimo fungicide enkrat do dvakrat. Enkrat pri mladih rastlinah in enkrat pozneje, ko je še možna vožnja po posevku. Pomemben ukrep je smiselno kolobarjenje, da imamo čim daljši presledek med kriznicami, metuljniciami in sončnico.	piraklostrobin fluopiram + protoikonazol	Retengo Propulse	0,5 – 1 l/ha 1,0 l/ha	21 dni 28 dni
Siva plesen <i>Botrytis cinerea</i>	Opis bolezni: Siva plesen se na organe sončnice lahko naseli v vseh stadijih razvoja. Napadeni organi se obdajo z gosto sivo prevleko drevesastih trosonoscev in pričnejo veneti. Največ težav lahko pričakujemo v letih z veliko padavinami in pogostimi neurji. Fungicide proti sivi plesi pri intervallini pridelavi uporabimo do dvakrat. Prvo aplikacijo je namenjena zmanjšanju potenciala glive pred cvetenjem, druga v času cvetenja.	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. čas uporabe oz. način uporabe
Sončnična rja <i>Puccinia helianthi</i>	Opis bolezni: Sončnična rja, ki povzroča uničenje listne površine, se pri nas pojavi občasno v večjem obsegu v drugem delu poletja pri bolj poznih hibridih. Če uporabimo priravke na podlagi tebukonazola proti beli gnilobi ločena aplikacija fungicidov proti rji ni potrebna. Na listju se pojavijo enostavno prepoznavni rjavi kupčki (trosiča uredospor in televitospor).	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe
Sončnična plesen <i>Plasmopara halstedii</i>	Opis bolezni: Ker pri nas sončnice pridelujemo le občasno so populacije glive povzročiteljice plesni dokaj majhne in se bolezen le redko pojavi v velikem osetu. Posamične obolete rastline lahko najdemo v vseh posevkih. Zatiranje trenutno ni potrebno in tudi registriranih priravkov nimamo na voljo. Uporabni so skoraj vsi sistemski fungicidi proti glivam plesnikam. Sodobni hibridi so dokaj odporni. Zgodaj okužene rastline spoznamo po obšutrem zastaju v rasti (kržljavost pri sistemični okužbi) in po beli plesnivi prevlekki iz trosonoscev na spodnji strani listov. Okužene rastline navadno ne razvijejo oplojenih koškov. Potrebitna je setev				

	<p>razkuženega semena in uporaba sistemčnih fungicidov v zgodnjih stadijih razvoja posevka. <i>P. halstedii</i> spada med karantenske škodljive organizme. Seme navadne sončnice ne sme biti okuženo s to glivo.</p> <p>Opis bolezni: O pojavljanju sive pegavosti pri nas trenutno ni natančnih podatkov. Izvorno območje pojava bolezni je nekdaj Jugoslavija tako, da obstaja možnost za pojavljanje pri nas. Bolezzen prepoznamo po zelo hitrem sušenju celotnih listov in velikih sivih pegah na steblu na mestu, kjer izraščajo listni pecji posušenih listov. Tkivo pod pegami se zmehta in pojavi se trohnenje zaradi česa se steblo na tistem mestu prelomi. Na sivi pegini opazimo črna izbočena piknidijstra plodišča. Vir kužila za okužbe listov so askospore sproščene iz peritecijskih plodišč, ki se nahajajo v ostankih razpadajočega drobirja stebel sončnic iz prejšnjih rastnih dob. Fungicidi, ki jih navadno uporabljamo proti beli zrnati gnilobi delujejo tudi proti tej bolezni.</p>												
Siva pegavost in trohnoba steba sončnic <i>Diaporthe</i> (<i>Phomopsis</i>) <i>hellianthi</i>	<table border="1"> <tr> <td>piraklostrobin fluopiram + protoikonazol</td><td>Retengo Propulse</td><td>0,5 – 1 l/ha 1,0 l/ha</td><td>21 dni 28 dni</td></tr> <tr> <td>mefentrifukonazol</td><td>Revyona</td><td>1,5 l/ha</td><td>Čas uporabe</td></tr> <tr> <td><i>Pythium oligandrum</i></td><td>Polyversum</td><td>0,1 kg/ha</td><td>1 dan oz. ČU oz. način uporabe</td></tr> </table>	piraklostrobin fluopiram + protoikonazol	Retengo Propulse	0,5 – 1 l/ha 1,0 l/ha	21 dni 28 dni	mefentrifukonazol	Revyona	1,5 l/ha	Čas uporabe	<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe
piraklostrobin fluopiram + protoikonazol	Retengo Propulse	0,5 – 1 l/ha 1,0 l/ha	21 dni 28 dni										
mefentrifukonazol	Revyona	1,5 l/ha	Čas uporabe										
<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe										

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE
strune (Agriotes spp.)	Korenine obgrizene, rastline propadajo, koreninski vrat in prizemno listje obgrzeno. Agrotehnični ukrepi: <ul style="list-style-type: none">- izogibanje večletnemu travnjku kot predposeku- večkratna obdelava tal- optimalni roki setve in sajenja. Kemični ukrepi: uporaba granuliranih insekticidov v vrste pri sajenju na preorano deteljišče ali travnik.	teflutrin Teflix	Force 1,5 G 7 kg/ha 7 kg/ha	Čas uporabe Tretira se v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla Čas uporabe Tretira se v času setve, tako da se sredstvo skupaj s semenom vnaša v tla	
goli polži, požari lazarij (Arión sp.) in slinarji (Deroceras sp.) ter rjavega polža (Helix aspersa) in belega vrtnega polža (Theba pisana)	Izjedajo kaliče, mlaude rastline, listje, včasih tudi plodove. Agrotehnični ukrepi: <ul style="list-style-type: none">- uničevanje plelevov in košnja zarasti, postavitev vab in mehanično zatiranje,- trošenje apna in pepela v trakovih na mestih prihoda polžev na posevek	železov (III) fosfat	Ferramol Polžomor bio vaba za zatiranje polžev Solabiol proti polžem	5 g/m ² (50 kg/ha) 5 g/m ² (50 kg/ha) 5 g/m ² (50 kg/ha)	Karenca ni potrebna. Sredstvo se enakomerno potrosi po tleh v okolici gojenih rastlin, med vrstami ali ob robovih njiv in gred okoli rastlin.
talne sovke (Agrotis spp.) in strune (Agriotes spp.)	Korenine obgrizene, rastline propadajo, koreninski vrat in prizemno listje obgrzeno.	lambdadichalotrin	Trika expert	15 kg/ha	Čas uporabe. Se uporablja na prostem ob setvi oz. sajenju za zatiranje ščitnik nekaterih škodljivih organizmov
vse vrste lazarijev (Arion sp.) in slinarjev (Derocera sp.)	Izjedajo kaliče, mlaude rastline, listje, včasih tudi plodove. Agrotehnični ukrepi: <ul style="list-style-type: none">- uničevanje plelevov in košnja zarasti, postavitev vab in mehanično zatiranje,- trošenje apna in pepela v trakovih na mestih prihoda polžev na posevek	metaldehid	Gusto 3 – Polžomor Plantella arion	6 kg/ha 6 kg/ha	Čas uporabe Od setve do faze, ko je razvitih devet listov (BBCH 00-19)

INTEGRIRANO VARSTVO SONČNIC
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NACIN UPORABE	AKTIVNA SNOV: RASTLIN	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA
Splošno o zatiranju plevelov v posevkah sončnic.					
Za zatiranje plevelov v sončnicah imamo na voljo precejšnje število talnih herbicidov za uporabo po setvi pred vznikom, nismo pa na voljo herbicidov za zatiranje širokolistnih plevelov po vzniku. Iz tega razloga je pomembna kvalitetna priprava zemljišča za setev, da imajo talni herbicidi dobre razmere za delovanje. Trajnih širokolistnih plevelov s talnimi herbicidi ni možno zatreti, zato jih vsaj delno zatremo z okopavanjem ali pa njivo razplevelimo v predhodnem kolobarnem členu. Pri talnih herbicidih je smotreno uporabiti mešanice dveh pripravkov tako, da pokrijemo čim širši spekter plevelov. Pri izbiiri upoštevamo tip tal in sestavo plevelne populacije. Trave zatremo po vzniku s graminicidi. Pri težjih tleh uporabljamo kombinacije S-metolaklora z linuronom in flurokloridonom. Če izvedemo le enkratno okopavanje z njim ne pričnemo prezgodaj, da ohranimo delovanje talnega herbicidnega filma čim dlje časa.					
Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.					
Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli	Pred vznikom sončnic in plevelov	pendimetalin	Stomp Aqua Sharpen 33 EC Sharpen plus	2,9 l/ha 3 - 5 l/ha 2,5 - 4 l/ha	Čas uporabe
aklonifen		Challenge Challenge 600 PT	Challenge Chanon	4 l/ha 4 l/ha 3 l/ha	90 dni 90 dni ČU
s-metolaklor		Dual Gold 960 EC Efica 960 EC	Dual Gold 960 EC Efica 960 EC	1 - 1,3 l/ha 1 - 1,3 l/ha	ČU Ni dovoljen na VVO 1 ČU Ni dovoljen na VVO 1
metobromuron		Proman	Focus ultra	3 l/ha 1 - 4 l / ha ^a	ČU
cikloksidim		fluazifop - p - butil	Fusilade forte Fusilade max	0,8 – 2,5 l / ha 1-3 l/ha	ČU ^a oddvisno od vrste in razvojne faze plevela 90 dni 90 dni
kvizalakop-p-etyl		Quick 5 EC	Wish top	1- 2 l/ha 0,625 – 1,17 l/ha	ČU 90 dni
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni pleveli (graminicidi):	Po vzniku sončnic in plevelov:	Clinic extreme		1,2-4 l/ha	ČU
Enoletni, dvoletni in večletni ozkolistni in širokolistni plevel	Pred ali po setvi, pred vznikom posevka	glifosat v obliku izopropilamino soli + glifosat v obliku kalijeve soli			
Kemično sušenje rastlin s herbicidi pred spravilom v integrirani pridelavi ni dovoljeno.					

12.9 INTEGRIRANO VARSTVO KRMNEGA GRAHA

VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

Spošošo o zatiranju bolezni in škodljivcev krmnega graha.

Krmni grah je zanimiva kрма rastlina za živinorejske kmetije, ki se uporablja za obogatitev krmnih obrokov in za reševanje zagat s preozkim kolobarjem. Izbor pripravkov za varovanje pred boleznimi, škodljivci in plevelji je pri nas zelo skromen. Glavna težava je majhno število registriranih FFS.

Uporaba česal je v posevkih graha možna. Zahteva veliko izkušenj za določanje optimalnega termina za prečesavanje, ker prečesavanje ob neustreznih terminih zelo prizadene razvoj graha in pospeši razvoj nožnih bolezni. Navadno izvedemo prečesavanje prvič, ko so rastline visoke 4-5 cm. **Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepá setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.**

Potencial bolezni zmanjšamo s setvijo kakovostnega razkuženega semena v optimalno pripravljeno setvišče, na katerem ne sme zastajati voda. Grah sejemo na isto površino v pelletnih presledkih.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	ČAS UPORABE	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA
Enoletni ozkolisti in širokolistni pleveli	Po setvi in pred vznikom posevka	klomazon + pendimetalin pendimetalin	Stalilion Sync Tec Stomp Aqua	3 l/ha 2,9 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe Čas uporabe
Enoletni in večletni ozkolisti in pleveli	Po vzniku gojenih rastlin	propakvizafop propakvizafop	Boxer Agil 100 EC	5 l/ha 0,75 - 1,5 l/ha	Čas uporabe Čas uporabe 60 dni
Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli	Po vzniku plevela	bentazon	Zetrola	0,75 - 1,5 l/ha	60 dni
Enoletni širokolistni in ozkolistični pleveli	Po setvi in pred vznikom posevka	aklonifen	Basagran 480	1,5 - 2 l/ha	Čas uporabe. VVOI. Čas uporabe
Enoletni širokolistni in ozkolistični pleveli	Po setvi in pred vznikom posevka	klomazon	Cломate - grah za zrnje	0,25 l/ha	Čas uporabe
Enoletni in večletni ozkolistični pleveli	Po vzniku graha in plevelov	cikloksidim	Focus ultra - grah za zrnje	1 - 4 l / ha	56 dni
Enoletni in večletni ozkolistični pleveli	Po vzniku graha in plevelov	fluazifop-P-butil	Frequent - grah za zrnje Fusilade super - grah za zrnje Fusilade max - grah za zrnje	2 - 3 l/ha 0,8 - 1,3 l/ha 1,6 l/ha	42 dni 35 dni 35 dni
Enoletni in večletni ozkolistični pleveli	Po vzniku graha in plevelov	kvizalofop-p-etyl	Wish top	0,625-1,17 L/ha	50 dni

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE	
Siva plesen (<i>Botrytis cinerea</i>)	Opis bolezni: Na obolenih rastlinah se oblikuje siva plesniva prepleka. Siva plesniva prepleka lahko ob močnih okužbah prekrije celo rastlino, tako da ta v celoti propade.Ustrezajo ji vlažne razmere, višje temperature in dobra prehranjenost, predvsem z dušikom. Rja: Na okuženih rastlinah se spomladi med cvetenjem ali oblikovanjem strokov, na listih in steblih pojavijo rijavi prashnati kupčki.	pirimetaniil <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (former <i>subtilis</i>) str. QST <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sev FZB24	Avalon Serenade ASO – grah za zrnje Taegro– grah za zrnje ciprodimil+fluidioksoni l	1,5 l/ha 8 l/ha 0,185- 0,37 kg/ha 1 kg/ha	28 dni Ni potrebna 1 dan 28 dni	
grahova rja (<i>Uromyces pisii</i>), grahova pepelovka (<i>Erysiphe pisii</i>), grahova pegavost (<i>Mycosphaerella pinodes</i>), grahova plesen (<i>Peronospora viciae f. sp. pisii</i>) in grahova pegavost (<i>Ascochyta pisii</i>)		azoksistrobin	Chamane Mirador 250 SC Norios Ortiva Zafra azt 250 SC Zoxis 250 SC – grah za zrnje	1 l/ha Dovoljeni sta največ dve tretiranj v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 7 dni.	35 dni Dovoljeni sta največ dve tretiranj v eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme biti krajši od 7 dni.	
grahova plesen (<i>Peronospora viciae f. sp. pisii</i>)		<i>Pythium oligandrum</i>	Polyversum – grah za zrnje	0,1 kg/ha	1 dan oz. ČU oz. način uporabe	
pepelovke iz družine <i>Erysiphaceae</i>	Pepelevka: Drobne a razvlečene neobarvane pege na zgornji strani starejših listov so prvi bolezenski znaki, ki jih lahko opazimo pri grahovi pepelovki. Na teh pegeh se oblikuje sivo bela plesniva prepleka, ki postopoma preraste celoten list, listno tkivo pod njem pa se obarva vijoličasto. Na sivi prepleki	COS-OGA Žveplo	Fytosave	1g/3-4 L vode/100 m ² Rebus – grah za zrnje Cuprablau Z 35 WG – grah za zrnje Cuprablau Z 35 WP – grah za zrnje Cuproxat – grah za zrnje	14 dni 0,6 L/ha 0,66-1,5 kg/ha 3 dni 0,8-1,5 kg/ha 3 dni 5,3 l/ha 2 l/ha	Karenca ni potrebna. Prvo tretiranje se opravi preventivno, pred pojavom okužbe. S sredstvom se lahko na istem zemljишču oz. zaščitenem prostoru tretira največ 5 krat v eni rastni sezoni, med tretiranjji naj preteče vsaj 7 dni.
				Biotip sulfo 800 SC – grah za zrnje Cosan – grah za zrnje Microthiol SC – grah za zrnje	4 – 5 l/ha 4 – 5 kg /ha 5 l/ha	7 dni 7 dni 7 dni

	se oblikujejo okroglasta črna trošiča kleisiotecij.		Pepelin – grah za zrnje Vindex 80 WG – grah za zrnje	4 – 5 kg /ha 4 – 5 kg /ha	7 dni 7 dni
grahova pegavost (Ascochyta pisii)	Opis bolezni: Na vseh delih rastlin – steblih, listih in strokih se lahko pojavijo rjave do vijolične oz. črne pege, kjer se lahko oblikujejo črna trošiča. Pege na strokih so rahlo uleknjene. Agrotehnični ukrepi: setev zdravega (certificiranega) semena oz. razkuženega semena, mulčenje in globoko zaoravanje rastlinskih ostankov takoj po pobiranju pridelka.	boskalid + piraklostrobin	Signum	1 kg/ha	21 dni Tretira se od začetka cvetenja v časovnih intervalih 2 - 4 tedne, odvisno od pritiska bolezni. Na istem zemljишču sta dovoljeni 2 tretiranj v eni rastni dobi.

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE
Listne uši Aphidiidae	Opis škodljivca: Listne uši povzročajo neposredno škodo s sesanjem na rastlinah. Napadene rastline zaostajajo v rasti, listi rumenijo in se zvijajo. Ob močnem napadu rastline izgubijo vigor. Pomembnejša je posredna škoda, ki jo uši povzročajo s prenašanjem rastlinskih virusov	flonikamid lambda-čihalotrin pirimikarb	Afinto – grah za zrnje Teppeki – grah za zrnje Karate zeon 5 CS – grah za zrnje Pirimor 50 WG – grah za zrnje	0,14 kg/ha 0,15 l/ha 0,75 kg/ha	14 dni 7 dni 14 dni
grahov zavijač (Cydia nigricana)	Opis škodljivca:	deltametrin	Decis 100 EC – grah za zrnje	63 ml/h	7 dni

	<i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>Kurstak</i>	Lepinox plus – grah za zrnje	1 kg/ha	Ni potrebna
Poškodbe povzročajo gosenice, ki se po izleganju zavrtajo v strok. Običajno je v enem stroku prisotna ena gosenica. Ta se hrani z razvijajočim se zrnjem, običajno izje 3 do 4 zrna. Zaradi izločanja svile in iztrebkov so tudi preostala zrna v stroku onesnažena in neprimerna za uporabo. Spvra je škodo težko opaziti, saj je vstopna odpritina gosenice majhna in se nahaja tik ob žili. Povzročeno škodo običajno opazimo šele v času zorenja, ko gosenica izje večjo izhodno odpertino iz stroka.				

12.10 INTEGRIRANO VARSTVO NAVADNE SOJE

VVOI- najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

Spošošo o zatiranju bolezni in škodljivcev navadne soje

Zaradi zelo omejenega obsegja pridelovanja ocenjujemo, da je trenutni naravni kužni potencial večine od mnogih bolezni soje dokaj majhen. Ločimo bolezni, ki sojo prizadenejo v zgodnjih stadijih razvoja in so odvisne od stopnje okužb semena in ugodnosti ali neugodnosti razmer za vznikanje in razvoj mladih rastlinic, bolezni, ki se razvijejo na listni masi in steblih med rastno dobo in bolezni socvetja ter strokov.

Nožne bolezni se pojavijo pri pridelovanju na težjih tipih tal v deževnih pomladih, ko rastline propadejo zaradi talnih gliv (*Fusarium*, *Sclerotinia*, *Phoma*, *Rhyzoctonia*, *Phytiuum*, ...). Rok setve in kakovost izvedbe setve ima velik vpliv na pojav teh bolezni. S fungicidi tretirano semo imamo le omejeno zatiralo delovanje proti njim. Zgodnejša setev v težja tla sicer omogoča večje pridelke, vendar le pod pogojem, da razmere za razvoj bolezni niso ugodne.

Deževen maj in junij sta ugodna za razvoj sojine plesni (*Peronospora manshurica*), ki jo kot druge plesni prepoznamo po belih prevleka na hitro sušečih se in grijajočih listih. V običajnih letih s toplim majem in junijem brez daljših deževnih obdobjij s plesnijo ni težav. V naših razmerah je glavni vir kužila za to bolezen okuženo semo. Tudi druge bolezni soje, ki se običajno pričnejo razvijati na mladih rastlinicah in pozneje postopoma preidejo na stroke dozorevajoče rastline so pri nas zaradi zelo omejenega obsega pridelovanja odvisne predvsem od kakovosti semena in ne od inokuluma iz ostankov rastlin iz predhodnih posevkov. Takšne, trenutno le sporadično pojavljajoče se bolezni so na primer črna pegavost stebla (*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae*), vijoličasta pegavost (*Cercospora kikuchi*), sojin ožig (*Colletotrichum truncatum*) in siva trohoba in razpokanost zrnja soje (*Phomopsis longicolla*). Vse omenjene bolezni so v regijah nekdanje Jugoslavije, kjer sojo pogosto pridelujejo, pojavljajo v vedno večjem obsegu. Najiveč težav je pri pridelovanju semenske soje, ker seme ne sme biti okuženo s temi glivami. Ker pri nas sojo v glavnem pridelujemo za živilsko kimo so te bolezni manj pomembne, kot pri pridelavi za uporabo v ljudske prehrani. Pogosto so odločiljen dejavnik kakovostnih kriterijev ob odkupu. Težava torej ni zgolj v izgubah pridelka, temveč tudi v občutnem znižanju kakovostnega razreda in posledično dosežene cene za zrnje. Vse kaže, da lahko imajo pri pojavu teh bolezni precejšen pomen tudi nekateri pleveli (npr. *Abutilon theophrasti* in *Xanthium strumarium*). Obe vrsti plevelov sta zelo konkurenčni za posevke soje in se pojavljata vedno bolj pogosto. Pridelovalci soje ju morajo temeljito zatirati tudi zaradi onejevanja pojava glivičnih bolezni. Dokler bomo sojo pridelovali v tako majhnem obsegu kot doslej in predvsem za živilsko prehrano je glavni način zatiranja teh bolezni setev kakovostnega neokuženega semena.

Pri nas so pogosto ugodne razmere tudi za bakterijske bolezni (predvsem za pegavost povzročeno od bakterije *Pseudomonas syringae* pv. *glycinae*). V deževnih letih sta pri nas večkrat v večjem obsegu razvijeta bela zrnata gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*) in siva plesen na strokih (*Botrytis cinerea*). Njun gospodarski pomen je trenutno večji od prej omenjenih gliv. Od obeh lahko v večjem obsegu propadejo tudi mlajše rastline v začetnih stadijih razvoja. Večje težave z belo gnilobo pričakujemo, če imamo v kolobarju veliko križnic, sončnice, krompir, fižol in vrtnine plodovke.

Izmed škodljivcev je pri nas najpomembnejša koprivova pršica (*Tetranychus urticae*). Strune (*Agriotes* sp.) po dosedanjih izkušnjah niso posebej nevarne, razen če sezemo sojo po preoravanju relativnega travinja. Kot pomemben škodljivec se kažejo tudi polži. Zatiranje s posipavanjem moluskicidnim granulatov po večjih površinah je predrago. Uporaba česal v medvrstrem prostoru lahko precej zmanjša populacije polžev. Z ogorčicami in fižolovo muho pri nas v posevkah soje trenutno še ni težav. Kot odvračalo za divjad se lahko v soji uporablja sredstvo Trico (15 l/ha olje na osnovi ovježje maščobe).

INTEGRIRANO VARSTVO NAVADNE SOJE
VVOI-najožje vodovarstveno območje. Pri sredstvih je potrebno upoštevati varnostni pas do voda – glej navodila za uporabo!

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	NACIN UPORABE	AKTIVNA SNOV RASTLIN	REDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA
Splošno o zatiranju plevelov v posevkah soje.					
Posevki soje imajo slabo tekmovanljivo sposobnost proti plevelom. Ker je soja v svetovnem merilu ena najpomembnejših poljskih so za zatiranje plevelov v njej razvili preko 20 herbicidov. Večina na našem trgu FFS- ni dostopna. Izbor pripravkov za uporabo pred vznikom je še kar dober, manjkajo pa nam pripravki za zatiranje širokolistnih plevelov po vzniku. Strategijo uporabe herbicidov je potrebno ustrezeno prilagoditi skromnemu izboru dostopnih pripravkov. Najbolj zanesljiva taktika je uporaba kombinacije dveh talnih herbicidov po setvi pred vznikom in enkratna korekcija s kombinacijo bentazona z enim od graminicidov (cikloksidim, kvizalofop-p-etyl). Če so njive močno zaplevljene z večletnimi travami, baržunastim oslezom, ambrozijo, bodičem, mrkačem in dresevini korenčnic (ali klomazona in metobromuronoma) izberemo glede na tip tal in glede na najbolj nevarne plevele. Na najbolj peščenih zemljiščih izberemo herbicida (npr. S-metolaklor in pendimetalin, ali klomazona in metobromuron) in dobro uporabiti tehniko slepe setve, nivoj priporočljivo, ker je zelo občutljiva za poškodbe. Večkratno prečesavanje medvrsnega prostora je priporočljivo.					
Pri nas je soja najbolj ogrožena od bele metlike, ščirov, dresev in kostrebe, baržunsatega osleza, ambrozije in trajnih plevelov. Običajno jo vsaj enkrat okopijemo. S stališča tekmovanljosti proti plevelom je bolje sejati na ožje medvrsne razdalje (npr. na 45 cm).					
Za zatiranje plevelov je v integrirani pridelavi treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepá setevá, uporaba česála, okopávanje, termično zatiranje plevelov-plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste.					
Enoletni ozkolisti in širokolistni pleveli	Pred vznikom soje in plevelov	pendimetalin	Sharpen 33 EC Sharpen plus Stomp Aqua	3-5 l/ha 2,5 -4 l/ha 2,6 l/ha	Čas uporabe
S-metolaklor		Dual Gold 960 EC		1 -1,3 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
		Efica 960 EC		1 -1,3 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
klomazon		Centium 36 CS manjše up. Clomite – manjše uporaba	0,25 l/ha 0,25 l/ha	Čas uporabe.	Čas uporabe.
		metobromuron ciklksidim	Proman Focus ultra	3 l/ha 1 – 4 l / ha	Čas uporabe.
Enoletni in večletni ozkolisti pleveli:	Po vzniku soje in plevelov:	bentazon	Basagran 480	1,5 – 2 l/ha	Čas uporabe. Prepovedan na VVOI.
Enoletni in večletni širokolistni pleveli:	Po vzniku soje in plevelov:	tifensulfuron-metil	Harmony 50 SX	2x 7,5 g/ha split	Čas uporabe. Karenca za sojo, ki je namenjena zeleni krmni, ie 14 dni.
Enoletni ozkolisti pleveli	V razvojni fazí od dveh do osmih listov (BBCH 12-18).	kvizalofop-p-etyl	Wish top	0,625-1,17 l/ha	90 dni
Kemično sušenje rastlin s herbicidi pred spravilom glede na trenutni koncept integrirane pridevate ni dovoljeno.					

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMIREK	KARENCA, OPOMBE
Gosenice škodljivih metuljev (<i>Lepidoptera spp.</i>)	Opis škodljivca: <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>Aizawai</i> Listi soje so obječeni. Pod rastlinami ali v pazduhah listov so pogosto okroglasti iztrebki.		Agree WG	1 kg/ha	Karenca ni potrebna. Prvo tretrjanje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev (od BBCH 09). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.
Talni škodljivci: pesni bolhač (<i>Chaetocnema tibialis</i>), ličinke pokalic – strune (<i>Agriotes spp.</i>), talne sovke (<i>Agrotis spp.</i>) in druge škodljive talne žuželke	Opis škode: Korenine obgrizene, rastline propadajo, koreninski vrat in prizerno listje obgrizeno.	teflutrin	Force EVO	12-16 kg/ha	Čas uporabe. Sredstvo FORCE EVO se odmerja s pomočjo posebnih dozirnih naprav (dozatorjev), ki se jih namesti na oziroma na sejalnico.
talne sovke (<i>Agrotis spp.</i>) in strune (<i>Agriotes spp.</i>).	Opis škode: Korenine obgrizene, rastline propadajo, koreninski vrat in prizerno listje obgrizeno.	lambda-cihalotrin	Trika expert	15 kg/ha	Čas uporabe. Ob setvi oziroma sajenju

ŠKODLJIVI ORGANIZEM	OPIS	AKTIVNA SNOV	SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN	ODMEREK	KARENCA, OPOMBE
bela gniloba (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Opis bolezni: Gniloba povzročiteljica bele gnilobe je splošno razširjena gliva, ki se hranja v tleh v obliku sklerocijev. Na sklerocijih na površju tal ali tik pod njimi nastanejo spomladni askospore, ki se sprostijo iz apotecijskih plodišč. Te okužijo nadzemne in podzemne organe mladih rastlin sončnice. Gliva lahko uniči že mlade rastline, katerim propadejo korenin ali koreninski vrat, lahko pa se latentno razvija do obdobja razvoja koškov in prerasle cvetišče. Na košku se pojavijo velike krpatе zrnate sklerotične tvorbe obdane z belim micelijem. Zgodaj napadene rastline uvereno in se posusijo. Rastline napadene sredi poletja poležejo ali pa se jim prelomi steblo. Za zatiranje bele gnilobe uporabimo fungicide enkrat do olvakrat. Enkrat pri mladih rastlinah in enkrat pozneje, ko je še možna vozinja po posevku. Pomemben ukrep je smiselno kolobarjenje, da imamo čim daljši presledek med križnicami, metuljnicami in sončnico.	Fluopiram Protikonazol	Propulse	1 l/ha	28 dni Tretja se od feno faze prvih vidnih cvetnih brstih do faze, ko vsi stroki dosežejo končno velikost (BBCH 51-79).
sive plesni (<i>Botryotinia fuckeliana</i>) bela gniloba solate (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	<i>Trichoderma asperellum T34</i>	Xilon	10 kg/ha	Čas uporabe. Sredstvo se aplikira v vrste, 2-5 cm globoko. Sredstvo se aplikira neposredno za semenom v odprt setveni kanal izključno s sejalno opremo, ki ima dodatno nameščene aplikatorje za zadelavo (inkorporacijo) mikrogranul na ustrezno globino.	Karenca ni potrebna. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest tretrjanj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12-89).

13. INFO-TOČKA – INTEGRIRANA PRIDELAVA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Spletno mesto:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/