

Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravila: Iva Imperl, e-pošta: ivica.imperl@kgzs-zavodnm.si

ISSN

št. 01

Datum: 24. februar 2026

VARSTVO BRESKEV, NEKTARIN IN MARELIC

Brsti breskev, nektarin in marelic so v JV Sloveniji močno nabrekli. Vidne so svetlo rjave luske (51 po lestvici BBCH).

V nasadih marelic svetujemo v naslednjih dneh izvedbo preventivne zaščite proti *listni luknjičavosti koščičarjev*. Za varstvo uporabite pripravke na osnovi bakra: **BADGE WG** (3,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha) ali **CUPRABLAU Z 35 WP** (2,0 kg/ha).

Poskrbite za kvaliteten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves.

Nasade breskev in nektarin je v trenutnih razmerah smiselno zaščititi pred *breskovo kodravostjo*. Nevarnost okužb se bo pojavila z naslednjimi padavinami. Za prvo tretiranje priporočamo **pripravke na osnovi bakra**, ki varujejo tudi pred *listno luknjičavostjo koščičarjev* in *bakterijskimi okužbami*: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **BADGE WG** (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti).

Nanos opravite v toplejšem delu dneva in brezvetrju. Poskrbite za primerno omočenost in kvaliteten nanos tudi na vrhove.

Upoštevajte, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

V tem obdobju pride v poštev tudi **beljenje debel z apnenim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**. S tem postopkom poskrbimo za odboj močnejših sončnih žarkov in ublažimo morebitno pregrevanje debel.

VARSTVO JABLAN

V nasadih, kjer so v preteklem letu *jabolčni* in *druge vrste zavijačev* povzročili opaznejšo črvičnost pridelka, je za zmanjševanje njihovega potenciala smiselno opraviti dodatno tretiranje z **entomopatogenimi ogorčicami**. Uporabite lahko **NEMAPOM** (odmerek 3 vrečke s po 500 mio/ha) s *Steinernema feltiae* ali **NEMOPAK SC** (50 mio v pakiranju; 50 mio/300m²), oz. **NEMOPAK SC 500** (500 mio v pakiranju) s *Steinernema carpocapsae*, ki so domorodni organizmi za namene biotičnega varstva rastlin. Delovanje ogorčic je usmerjeno na prezimitelni stadij zavijačev, zmanjšuje njihovo številčnost ter pripomore k lažjemu varstvu nasadov v naslednji rastni dobi. Ogorčice so živ organizem, ki potrebujejo za delovanje ter obstoj razmere z visoko vlago (megleno in deževno vreme) in temperature ozračja vsaj nekaj ur dnevno višja od 8 – 10 °C. Najugodnejši so deževni dnevi z nizko intenzivnostjo padavin. Zaželeno je, da so deli tretiranih rastlin omočeni vsaj nekaj ur, kratkotrajen padec temperature pa na učinkovitost nima vpliva.

Za pravičen nanos uporabite šobe z večjim premerom (vsaj 1 mm), obvezno odstranite filtre finejše od 1 mm ter zmanjšajte pritisk na največ 10-15 bar. Potrebna je velika poraba vode (1.500 – 2.000 l/ha) in odprte le



MKGP-UVHVVR

KGZS-Zavod Novo mesto

spodnje 2 do 3 šobe, ki bodo pokrile debla dreves do prvih ogrodnih vej, korenski vrat in tla pod krošnjo. Poskrbite za stalno mešanje škropilne suspenzije.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

